47 Mus. N. 47. a

Path. 895-3

Handbuch

der

Heilkunst

von

Christian Friedrich Oberreich.

BIBLIOTHECA
MONASTERII

Drei Bände.

Dritter Theil.

Riga,
in der Hartmannschen Buchhandlung.
1806.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Sr. Wohlgeborn,

dem

Herrn

Gottlob Friedrich Oberreich

hochachtungsvoll gewidmet.

Vorrede.

Mit diesem Theile ist nun das Handbuch der Heilkunst beendigt.

Da die Anzahl der Formen des Übelbefindens zu grofs ist, als dafs sie in drei kleinen Bänden vollständig könne abgehandelt werden, so habe ich mich hier bei der Bearbeitung derselben nur kurz gefafst, und werde hingegen in Zukunft ein gröfseres Werk darüber ausarbeiten.

Alle Krankheiten, denen jedes einzelne Organ ausgesetzt seyn kann, hier abzuhandeln, würde für ein Handbuch zu weitläuftig seyn, daher ich hier auch nur die gewöhnlichsten berührt habe, und zwar diejenigen, welche in unserm Himmelsstriche, d. i. in Deutschland, vorkommen.

Was die, fremden Nationen eigenthümliche, Krankheiten betrifft, so habe ich hier nur einige davon abgehandelt, wie das gelbe Fieber und die Himbeerwarzen der Amerikaner, den Weichselzopf der Polen, den Haarwurm der Afrikaner, das *Pelagra* der Italiener, u. s. w.

Was sogenannte äufserliche Krankheiten, als Wunden, Brüche, Vorfälle, Beinbrüche, Verrenkungen, Verwachsungen, u. s. w. anbelangt, so habe ich dieselben nur oberflächlich und kurz abgehandelt, weil ich mehr auf sogenannte innerliche Krankheiten Rücksicht nahm. Doch macht hiervon die Abhandlung der Geschwüre, Polypen, Pulsadergeschwülste, Blutadergeschwülste, u. a. m. eine Ausnahme.

Inhalt

des dritten Theiles

dieses Handbuches der Heilkunst.

Krankheiten einzelner Theile.

§. 1963 — 1964. Einleitung — Seite 3

§. 1965. — Krankheiten der Hautorgane — 3

§. 1966. — Himbeerwarze — 5

§. 1967. — *Pelagra* — 6

§. 1968. — *Sirones* — 6

§. 1969. — Honigflecken — 6

§. 1970 — 1972. Jucken der Haut — 7

§. 1973 — 1974. Hautschrunden — 7

§. 1975 — 1978. Wundwerden — 8

§. 1979 — 1981. Muttermal — 9

§. 1982 — 1984. Hautröthe — 9

§. 1985 — 1992. Heftiger Schweifs — 10

§. 1993. — Krankheiten der Drüsen — 11

§. 1994. — Krankheiten der Gelenke — 12

§. 1995 — 2002. Gelenkgeschwulst — 12

§. 2003. — Gelenkwassersucht — 14

§. 2004. — Knorplichte Auswüchse im Kniegelenke Seite 14
§. 2005—2009. Steifigkeit der Gelenke — 15
§. 2010. — Krankheiten der Blutgefäfse — 16
§. 2011. — Verletzung der Pulsadern und Blutadern — 16
§. 2012. — Krankheiten der Nerven — 17
§. 2013. — Krankheiten der Knochen — 17
§. 2014—2022. Knochengeschwulst — 17
§. 2023—2028. Weichwerden der Knochen — 19
§. 2029. — Knochenschmerz — 21
§. 2030—2031. Krankheiten des Kopfes — 21
§. 2032—2040. Kopfschmerz — 21
§. 2041. — Krankheiten der Kopfbedeckungen — 24
§. 2042. — Kopfwunden — 24
§. 2043. — Zweikopf — 25
§. 2044. — Kopfwindsucht — 25
§. 2045—2055. Weichselzopf — 25
§. 2056. — Krankheiten der Haare — 27
§. 2057. — Krankheiten der Hirnschale — 28
§. 2058—2063. Krankheiten der Hirnhäute — 28
§. 2064. — Schwamm der harten Hirnhaut — 31

§. 2065. — Krankheiten des Gehirns Seite 31
§. 2066 — 2067. Hirnbruch, Hirnschwamm — 32
§. 2068. — Krankheiten des Angesichts — 33
§. 2069. — Kupferhandel — 33
§. 2070. — Insecten in den Stirnhölen — 34
§. 2071. — Krankheiten der Gehörorgane — 34
§. 2072. — Ohrenbrausen — 35
§. 2073 — 2083. Taubheit — 35
§. 2084 — 2089. Krankheiten der Augen — 37
§. 2090. — *Trichiasis* — 41
§. 2091. — Zusammenwachsen der Augenlieder — 41
§. 2092. — *Ectropium*, *Entropium* — 42
§. 2093. — Jucken der Augenlieder — 43
§. 2094. — *Blepharoptosis* — 43
§. 2095. — Hasenauge — 44
§. 2096. — Gerstenkorn — 44
§. 2097 — 2098. Wasserbläschen und Lähmung der Augenlieder — 45
§. 2099. — Augenblinzen — 45
§. 2100. — Blutauge — 45
§. 2101. — Augenkrebs — 45
§. 2102. — Augenwassersucht — 46
§. 2103. — Vorfall des Augapfels — 46
§. 2104. — Geschwulst der Thränencarunkel — 47
§. 2105. — Thränenfluſs — 47

§. 2106. — Vorfall der Regenbogenhaut Seite 48
§. 2107 — 2110. Geschwür der Hornhaut — 48
§. 2111 — 2120. Flecken der Hornhaut — 49
§. 2121. — *Mydriasis* — 52
§. 2122. — *Myosis* — 52
§. 2123 — 2131. Fehlerhaftes Sehen — 53
§. 2132 — 2143. Grauer Staar — 55
§. 2144. — Grüner Staar — 58
§. 2145 — 2152. Schwarzer Staar — 58
§. 2153. — Krankheiten der Thränenwege — 60
§. 2154 — 2156. Thränenfistel — 60
§. 2157. — Krankheiten der Ohrdrüse — 61
§. 2158 — 2161. Krankheiten der Nase — 61
§. 2162. — Krankheiten der Nasenknochen — 62
§. 2163 — 2164. Krankheiten der Kinnlade — 63
§. 2165. — Verrenkung der Unterkinnlade — 63
§. 2166 — 2167. Krankheiten des Mundes — 64
§. 2168. — Mundfäule — 65
§. 2169. — Geschwulst des Mundes vom Insectenstich — 65
§. 2170 — 2171. Krankheiten der Lippen — 65
§. 2172. Hasenscharte — 66

§. 2173.	—	Knoten an den Lippen	Seite 66
§. 2174.	—	Krankheiten der Zähne	— 67
§. 2175.	—	Zahnschmerz	— 67
§. 2176.	—	Weinstein an den Zähnen	— 68
§. 2177.	—	Verrenkung der Zähne	— 69
§. 2178.	—	Stumpfwerden der Zähne	— 69
§. 2179 — 2180.		Beinfrafs der Zähne	— 69
§. 2181.	—	Zahnfistel	— 70
§. 2182 — 2185.		Krankheiten des Zahnfleisches	— 70
§. 2186.	—	Krankheiten der Speicheldrüsen	— 72
§. 2187.	—	Speichelfluſs	— 72
§. 2188.	—	Speichelfistel	— 72
§. 2189.	—	Krankheiten der Zunge	— 73
§. 2190.	—	Zungenkrebs	— 74
§. 2191.	—	Lähmung der Zunge	— 74
§. 2192.	—	Verschiebung des Zungenbeins	— 74
§. 2193.	—	Krankheiten des Gaumens	— 74
§. 2194.	—	Krankheiten des Zapfens	— 75
§. 2195 — 2196.		Krankheiten der Mandeln	— 75
§. 2197 — 2199.		Krankheiten des Rachens	— 75
§. 2200.	—	Gehindertes Schlingen	— 76
§. 2201 — 2202.		Krankheiten des Halses	— 77

§. 2203. — Steifer Hals — Seite 77
§. 2204. — Kropf — — 78
§. 2205. — Krankheiten der Luftröhre — 79
§. 2206. — Krankheiten der Speiseröhre — 79
§. 2207—2209. Krankheiten der Brust — 80
§. 2210. — Blutergiefsung in die Brusthöle — 80
§. 2211. — Krankheiten der Respirationsorgane — 81
§. 2212. — Angst — 81
§. 2213. — Niesen — — 82
§. 2214. — Alp — — 82
§. 2215. — Heiserkeit — — 82
§. 2216. — Schluchzen — — 83
§. 2217. — Stickflufs — — 83
§. 2218. — Husten — — 83
§. 2219. — Engbrüstigkeit — 84
§. 2220—2221. Krankheiten des Brustbeins — 86
§. 2222—2223. Krankheiten der Rippen — 86
§. 2224. — Krankheiten der Brüste — 87
§. 2225. — Krankheiten der Lunge — 87
§. 2226. — Krankheiten des Herzbeutels — 88
§. 2227. — Krankheiten des Herzens — 88

§. 2228. — Herzpolyp — Seite 88
§. 2229. — Herzklopfen — — 88
§. 2230. — Krankheiten des Zwergfells — — 89
§. 2231. — Krankheiten des Rückgrats — — 89
§. 2232 — 2234. Verrenkung der Wirbelbeine — — 90
§. 2235. — Buckel — — 91
§. 2236. — Beinfrafs der Wirbelbeine — — 91
§. 2237. — Rückengewächs — — 92
§. 2238 — 2243. Krankheiten des Unterleibes — — 92
§. 2244 — 2246. Krankheiten des Magens — — 95
§. 2247. — Magenschwäche — — 96
§. 2248 — 2250. Magenverhärtung — — 96
§ 2251. — Sodbrennen — — 97
§. 2252. — Magenblähungen — — 98
§. 2253. — Unverdaulichkeit — — 98
§. 2254. — Schwache Verdauung — — 98
§. 2255. — Mangel an Appetit — — 99
§. 2256. — Gefräfsigkeit — — 99
§. 2257. — Verdorbener Appetit — — 100
§ 2258 — 2263. Magenkrampf — — 100
§. 2264 — 2271. Erbrechen — — 101
§. 2272. — Krankheiten des Darmkanals — — 103
§. 2273 — 2274. Kothfistel — — 104
§ 2275. — Wunden der Gedärme — — 105
§. 2276. — Blähungen — — 105

§. 2277. — Ineinanderschiebung der Gedärme — Seite 106
§. 2278. — Schwarze Krankheit — — 106
§. 2279 — 2281. Bauchflüsse — 107
§. 2282 — 2302. Würmer — 108
§. 2303 — 2310. Colik — 114
§. 2311 — 2319. Kothbrechen — 116
§. 2320 — 2325. Krankheiten des Mastdarms — 118
§. 2326. — Mastdarmvorfall — 120
§. 2327 — 2328. Schmerz des Mastdarms — 120
§. 2329 — 2339. Mastdarmfistel — 121
§. 2340 — 2345. Stuhlzwang — 124
§. 2346 — 2354. Verstopfung des Stuhlganges — 125
§. 2355 — 2356. Krankheiten der Leber — 127
§. 2357. — Leberabscefs — 127
§. 2358 — 2362. Lebergeschwulst — 128
§. 2363. — Krankheiten der Gallenblase — 129
§. 2364. — Gallenblasenfistel — 129
§. 2365. — Wunden der Gallenblase — 129
§. 2366 — 2372. Gallenblasensteine — 130
§. 2373. — Krankheiten der Milz — 131
§. 2374. — Milzeiterung — 131
§. 2375. — Milzgeschwulst — 131
§. 2376 — 2378. Krankheiten der Nieren — 132
§. 2379. — Nierenabscefs — 133
§. 2380. — Nierenschmerz — 133

§. 2381 — 2387. Nierenstein Seite 133
§. 2388 — 2390. Krankheiten der Urinblase — 135
§. 2391. — Harnblasenvorfall — 136
§. 2392. — Wunden der Urinblase — 136
§. 2393. — Harnbrennen — 136
§. 2394 — 2400. Urinblasensteine — 136
§. 2401 — 2411. Urinverhaltung — 138
§. 2412 — 2421. Unwillkührlicher Urinabfluſs — 141
§. 2422 — 2428. Krankheiten der Harnröhre — 143
§. 2429. — Urinfistel — 145
§. 2430 — 2431. Krankheiten des Mittelfleisches — 145
§. 2432. — Krankheiten der Zeugungstheile — 146
§. 2433. — Krankheiten der männlichen Zeugungstheile — 146
§. 2434 — 2436. Krankheiten der männlichen Ruthe — 146
§. 2437. — Krystallblasen — 148
§. 2438. — Galanteriebeulen — 148
§. 2439 — 2445. Pollution — 148
§. 2446 — 2458. Tripper — 149
§. 2459 — 2464. Wollustkrampf — 152
§. 2465 — 2471. Männliches Unvermögen — 153
§. 2472 — 2480. Verengerung der Vorhaut — 154
§. 2481 — 2487. Spanischer Kragen — 156
§. 2488. — Krankheiten der Vorsteherdrüse — 157

§. 2489. — Verhärtung der Vorsteherdrüse Seite 158
§. 2490. — Krankheiten der Hoden — — 158
§. 2491—2498. Hodengeschwulst — — 158
§. 2499—2503. Krankheiten des Hodensacks — — 161
§. 2504. — Hodensackkrebs — — 163
§. 2505. — Hodensackwassersucht — — 163
§. 2506. — Wasserdarmbruch — — 164
§. 2507. — Blutgeschwulst des Hodensacks — — 164
§. 2508—2509. Krankheiten der weiblichen Zeugungstheile — — 164
§. 2510. — Krankheiten des Kitzlers — — 165
§. 2511. — Krankheiten der Schamlippen — 165
§. 2512. — Schamlippenentzündung — — 165
§. 2513—2515. Krankheiten der Mutterscheide — — 166
§. 2516. — Krankheiten der Gebärmutter — 167
§. 2517. — Eiterung der Gebärmutter — 167
§. 2518. — *Mola* — 167
§. 2519—2520. Gebärmuttervorfall — 168
§. 2521. — Wassersucht der Gebärmutter — 168
§. 2522—2528. Gebärmutterkrebs — — 169

§. 2529 — 2532. Mutterpolyp Seite 170
§. 2533 — 2539. Mutterblutsturz — 172
§. 2540. — Krankheiten der Eierstöcke — 173
§. 2541. — Wassersucht des Eierstocks — 173
§. 2542. — Krankheiten der äussern Gliedmafsen — 174
§. 2543. — Krankheiten der Haut — 174
§. 2544. — Schwielen an Händen — 174
§. 2545 — 2546. Krankheiten der Finger — 175
§. 2547. — Krankheiten der Nägel — 175
§. 2548. — Abfallen der Nägel — 176
§. 2549. — Nietnagel — 176
§. 2550. — Krankheiten der Füfse — 176
§. 2551 — 2552. Krümmung der Füfse — 177
§. 2553. — Zerreifsung der Achillessehne — 177
§. 2554. — Krankheiten der Zehen — 178
§. 2555. — Örtliche Absterbung der Zehen — 178
§. 2556. — Beinbrüche und Verrenkungen der Extremitäten — 179
§. 2557. — Beinbruch des Schlüsselbeins — 179
§. 2558 — 2559. Beinbrüche der obern Extremitäten — 179
§. 2560. — Verrenkung des Oberarms — 180

§. 2561. — Verrenkung des Unterarms Seite 180
§. 2562. — Beinbrüche der untern Extremitäten — 180
§. 2563. — Verrenkung des Schenkels — 181
§. 2564. — Verrenkungen der untern Extremitäten — 182

Krankheiten des weiblichen Geschlechts.

§. 2565 — 2568. Einleitung — 185
§. 2569 — 2572. Krankheiten des weiblichen Geschlechts überhaupt — 186
§. 2573 — 2584. Hysterie — 187
§. 2585 — 2589. Kränkliches Monatliche — 189
§. 2590 — 2596. Verhaltenes Monatliche — 192
§. 2597 — 2602. Unterdrücktes Monatliche — 193
§. 2603 — 2606. Übermäfsig fliefsendes Monatliche — 194
§. 2607 — 2616. Weifser Flufs — 194
§. 2617 — 2620. Mutterwuth — 197
§. 2621 — 2623. Unfruchtbarkeit — 197
§. 2624 — 2634. Krankheiten der Schwangern — 198
§. 2635 — 2636. Mutterblutflüsse — 201
§. 2637 — 2646. Mifsgebären — 201
§. 2647 — 2648. Krankheiten der Gebärenden — 203

§. 2649—2653. Falsche Wehen Seite 204
§. 2654—2658. Schwere Geburt — 204
§. 2659—2662. Umkehrung der Gebärmutter — 206
§. 2663—2681. Krankheiten der Kindbetterinnen — 206
— — Gebärmutterentzündung — 210
§. 2682—2685. Kindbetterinnfluſs — 211
§. 2686—2692. Unterdrückter Kindbetterinnfluſs — 212
§. 2693—2698. Übermäſsig flieſsender Kindbetterinnfluſs — 213
§. 2699—2706. Kindbetterinnfieber — 214
§. 2707—2716. Krankheiten der Säugenden — 216
§. 2717—2720. Milchausfluſs — 218
§. 2721. — Milchanhäufung — 219
§. 2722—2727. Milchmangel — 219
§. 2728—2729. Milchknoten — 220
§. 2730—2731. Entzündung der Brüste — 220
§. 2732—2733. Abscefs der Brüste — 221
§. 2734. — Aufspringen der Brustwarzen — 221
§. 2735. — Zu kurze Brustwarzen — 222

Krankheiten der Kinder.

§. 2736—2752. Einleitung — 225
§. 2753—2758. Behandlung der Neugebornen — 228
— — Scheintod — 229

§. 2759. — Schwäche neugeborner Kinder Seite 229
— — — Erdrückung der Kinder — 230
§. 2760 — 2761. Vorkopf — 230
§. 2762. — Zusammendrückung des Kopfes — 230
§. 2763 — 2766. Gehirnbruch — 230
§. 2767. — Verwachsung gewöhnlicher Öffnungen — 231
§. 2768 — 2771. Kinnbackenkrampf — 231
§. 2772 — 2775. Augenentzündung — 232
§. 2776 — 2778. Schälblasen — 233
§. 2779 — Schluchzen — 233
§. 2780 — 2791. Behandlung der säugenden Kinder — 234
§. 2792 — 2793. Behandlung der Kinderkrankheiten — 236
§. 2794 — 2799. Verhärtung des Zellgewebes — 236
§. 2800 — 2808. Schwämmchen — 237
§. 2809 — 2816. Ausgeschlagener Kopf — 240
§. 2817 — 2818. Wachsgrind — 242
§. 2819 — 2826. Milchkruste — 242
§. 2827 — 2831. Mitesser — 244
§. 2832 — 2833. Wundwerden — 245
§. 2834 — 2847. Beschwerliches Zahnen — 246

§. 2848 — 2858. Englische Krankheit Seite 249
§. 2859 — 2864. *Paedarthrocace* — 252
§. 2865 — 2874. Darrsucht — 253
§. 2875. — Würmer — 255
§. 2876 — 2879. Lustseuche — 255
§. 2880 — 2884. Zuckungen — 256
§. 2885 — 2891. Leibesschmerzen — 257
§. 2892 — 2894. Erbrechen — 258
§. 2895 — 2896. Durchfall — 258
§. 2897. — Nächtlicher Urinabgang — 259
§. 2898. — Nabelbruch — 259
§. 2899 — 2905. Stickfluſs — 259
§. 2906 — 2916. Keichhusten — 261
§. 2917 — 2923. Häutige Bräune — 264
§. 2924 — 2925. Angewachsene Zunge — 265
§. 2926 — 2927. Zungengeschwür — 266
§. 2928 — 2931. Fröschleingeschwulst — 266
§. 2932 — 2933. Lippengeschwulst — 267
§. 2934. — Höcker — 267
§. 2935 — 2936. Wasserkopf — 268
§. 2937 — 2945. Äuſserer Wasserkopf — 268
§. 2946 — 2957. Innerer Wasserkopf — 270
§. 2958 — 2966. Gehirnwassersucht — 272
§. 2967 — 2973. Rückgratswassersucht — 273

Inhalt.

Krankheiten der Greise.

§. 2974 — 2979. Einleitung Seite 277

§. 2980 — 2982. Abzehrung der Greise — 278

§. 2983 — 2989. Örtliche Absterbung der Zehen — 278

§. 2990 — 2991. Triefaugen — 279

§. 2992. — Schwerhörigkeit — 280

§. 2993. — Beschwerliches Urinlassen — 280

Arzeneiformel N. 35. — 280

Krankheiten

einzelner Theile.

§. 1963.

Da ich in den ersten zwei Bänden von den Krankheiten überhaupt gehandelt habe, so will ich jetzt zu den Krankheiten einzelner Theile übergehen.

§. 1964.

Zuerst will ich daher von den Krankheiten der Haut, Drüsen, Gelenke, Blutgefäfse, Nerven und Knochen handeln, und dann zu den Krankheiten des Kopfes, des Halses, der Brust, des Unterleibes und der Extremitäten übergehen.

Krankheiten der Hautorgane.

§. 1965.

Unter die Krankheiten, denen die Hautorgane ausgesetzt sind, gehören:

1) Ausschläge (§. 755.) und zwar:

a) fieberhafte Ausschläge (§. 756.), als Pocken (§. 759.), Masern (§. 772.), Rötheln (§. 781.), Scharlach (§. 785.), Friesel (§. 794.), Nesselausschlag (§. 804.), Porzellänе (§. 811.), Blasen-

ausschlag (§. 812.) und Gürtel. Von den Schwämmchen s. Krankheiten der Kinder.

b) Fieberlose Ausschläge (§. 824.), als Krätze (§. 830.), Flechten (§. 844.), Zittermaal (§. 857.), Aussatz (§. 858.), Grind (§. 867.), Kleiengrind (§. 876.), Todtenbruch (§. 877.). Von dem Ansprunge, ausgeschlagenem Kopfe und Wachsgrinde s. Krankh. der Kinder. Ferner Yaws (§. 1966.), Pelagra (§. 1967.). Hierzu gehören noch:

α) Ausfahren der Haut (§. 879.), als Finnen (§. 880.), Hitzblätterchen (§. 880.), Hundsblattern (§. 880.), Nachtblattern (§. 880) und Sirones (§. 1968.).

β) Hautflecken (§. 882.), als Sommersprossen (§. 882.), Mutterflecken (§. 1979.), Honigflekken (§. 1969.), u. a. m.

2) Geschwülste, und zwar Balggeschwülste (§. 1548.), Polypen (§. 1558.), Warzen (1572.), Hüneraugе (§. 1587.), Hautwassersucht (§. 1605.) und Windgeschwulst (§. 1648.).

3) Hautröthe (§. 1982.), wozu auch der Kupfer (§. 2069.) gehört.

4) Trockenheit der Haut.

5) Gänsehaut (*Phricasmus*), Schwiele (*Callus*).

6) Jucken (§. 1970).

7) Aufspringen der Haut oder Schrunden (§. 1973.), und Wundwerden (§. 1975.).

8) Gefühllosigkeit (*Insensibilitas cutis*).

9) Zu starker Schweifs (§. 1985.).

10) Abschuppung der Oberhaut (*Desquammatio cutis*).

11) Haarwurm (§. 1947).

12) Verhärtung des Zellgewebes bei Kindern, s. Krankh. d. Kinder.

13) Wunden (§. 1740.).

14) Muttermäler (§. 1979.).

15) Mitesser, s. Krankh. d. Kind.

16) Weichsehopf (§. 2045.).

17) Blutschwären (§. 723.) und Brandbeule (§. 730.).

Hautausschläge.

§. 1966.

Himbeerwarzen (*Framboesia*), auf Englisch *Yaws*, und auf Französisch *Pians*, ist eine Hautkrankheit, welche in Africa und Westindien, vorzüglich unter den Negern, herrscht.

Der Ausschlag hat die Gröfse der gewöhnlichen Blattern, und die Farbe und Gestalt einer Himbeere oder Maulbeere. Er kömmt gemeiniglich unter dem Kinne, in der Achselhöhle und an den Schamtheilen vor.

Er befällt den Menschen in seinem Leben nur einmal, und kömmt jederzeit von Ansteckung her.

Mit der Lustseuche sowohl, als mit den Pocken hat der Ausschlag viel Ähnlichkeit; doch unterscheidet er sich von beiden durch den Verlauf.

Der Natur überlassen, verursacht der Ausschlag keine Beschwerden, von unrechter Behandlungsart entstehen aber bedenkliche Zufälle, als Abzehrung, nächtliche Schmerzen, Knochengeschwülste, üble Geschwüre, u. d. gl.

Die Dauer ist unbestimmt, öfters einen Monat, zuweilen aber auch Jahre lang.

§. 1967.

Pelagra ist eine Hautkrankheit, welche in Italien vorkömmt, und in rosenartigen Flecken auf der Hand, dem Rücken und den Füfsen besteht, welche sich abschuppen.

Im Winter verschwindet der Ausschlag, im Frühling kommt er aber wiederum unter starkem Brennen zum Vorscheine.

§. 1968.

Sirones sind Blätterchen, welche in heifsen Sommertagen in der flachen Hand und an den Fufssohlen angetroffen werden, und ein heftiges Jucken und Brennen verursachen.

§. 1969.

Honigflecken oder Sonnenbrand (*Pannus*) sind grofse, breite, oft von der Gröfse einer Hand,

gelblichte oder braune Flecken auf der Haut, die im Gesichte erscheinen, und vorzüglich bei Frauenzimmern vorkommen.

Jucken der Haut.

§. 1970.

Das Jucken (*Pruritus*) kömmt bei mancherlei Formen des Übelbefindens, vorzüglich bei der Gelbsucht und Hautausschlägen, vor.

Übrigens entsteht es auch von Trockenheit und Rigidität der Haut, nach vorhergegangenem Insectenstich, u. s. w.

§. 1971.

Ursache. Diese besteht in einem Fehler der Mischung und der Form.

§. 1972.

Curplan. Bei Rigidität und Trockenheit der Haut sind Einreibungen von fetten Ölen, laue Bäder und Kräuterbäder (§. 178.) anzuwenden.

Schrunden.

§. 1973.

Hautschrunden, Aufspringen der Haut, oder Hautspalten (*Rhagades, Fissurae*) sind trocken und tief, entstehen von schneller Abwechselung der Wärme und Kälte, und kommen vorzüglich in der flachen Hand und Fufssohle und an den Lippen vor.

§. 1974.

Curplan. Dieser besteht äufserlich in dem Waschen mit Branntwein, Wein oder Seifenspiritus, und in dem Gebrauch des Eieröls, Quittenschleims, Milchrahms oder warmen Unschlitts.

Wundwerden.

§. 1975.

Wundwerden der Haut, Frattsein oder Wolf (*Intertrigo*, *Excoriatio*, *Attritus*) besteht in einer Absonderung der Oberhaut von der dicken Haut, so dafs die letztere entblöfst, sehr empfindlich und schmerzhaft ist.

§. 1976.

Ursächliche Momente. Starkes Reiben, scharfe und ätzende Dinge, scharfer Urin, weifser Flufs, heftiger Schnupfen, u. s. w.

§. 1977.

Curplan. Dieser besteht in dem äufserlichen Gebrauch zusammenziehender Mittel.

§. 1978.

Vorzüglich sind hier äufserlich Bleiwasser, Kalkwasser, Bleicerat, Zinksalbe, Tutiensalbe, Eichenrindendecoct, verdünnter Branntwein oder Seifenspiritus, und Hexenmehl (*semen l. farina Lycopodii*) zu gebrauchen.

Muttermal.

§. 1979.

Muttermäler (*Naevi materni*) sind theils Flekken (Mutterflecken, *Maculae maternae*), theils Auswüchse (*Excrescentiae maternae*), welche von den Kindern mit auf die Welt gebracht werden.

Sie befallen die äufsere Haut, sind von verschiedener Gestalt und Farbe, und können an verschiedenen Stellen des Körpers vorkommen.

§. 1980.

Prognosis. Die Mutterflecken sind mehrentheils unheilbar; die Mutterauswüchse können zuweilen durch die Unterbindung ausgerottet werden.

§. 1981.

Curplan. Dieser besteht in dem äufserlichen Gebrauch ätzender Mittel, z. B. einer Sublimatauflösung, des Salmiakgeistes, u. d. gl.

Hautröthe.

§. 1982.

Hautröthe (*Erythema*) besteht in einer vorübergehenden Röthe der Haut. Fieber ist hier nicht vorhanden.

§. 1983.

Ursächliche Momente. Insectenstich, Reiben, Berührung der Brennnesseln, *Rhus toxicodendron*, Verbrennung, Einwirken der Kälte, u. s. w.

§. 1984.

Curplan. Äufserlich kann man Altheensalbe, Unschlitt, ungesalzene Butter, Bleiwasser, Bleicerat, u. d. gl. anwenden.

Heftiger Schweifs.

§. 1985.

Der **Schweifs** (*sudor*) besteht in einer sehr vermehrten Ausdünstung der Haut. Er kann sehr heftig werden (*Hidrosis*), so dafs er zuweilen blutig wird (blutiger Schweifs), oder, mit heftigem Fieber verbunden, in kurzem den Tod verursacht (Schwitzfieber, englischer Schweifs, *Elodes*, *sudor anglicus*).

§. 1986.

Der Schweifs ist entweder allgemein oder örtlich, z. B. an der Stirn, an der Brust, blofs an Füfsen, u. s. w. er ist warm oder kalt.

§. 1987.

Ursache. Diese besteht in Schwäche und Erschlaffung der Hautorgane.

§. 1988.

Ursächliche Momente. Zu starke Bewegung des Körpers, Tanzen, schnelles Reiten, grofse Hitze, starke Bedeckung von Kleidern oder Betten, stark reizende Arzeneimittel, warme Getränke, u. s. w.

§. 1989.

Starker Schweifs gesellt sich auch zu vielen For-

men des Übelbefindens, vorzüglich zu dem Typhus und den hectischen Fiebern.

§. 1990.

Curplan. Dieser ist reizend.

§. 1991.

Innerlich sind bittere Extracte, Colombo, Quaſsie, Simarube, Salbei, Schafgarbe, u. d. gl. anzuwenden.

Äuſserlich sind Kräuterbäder (§. 178.), Waschen mit einem Salbei- oder Schafgarbenaufguſs, Eichenrinden- oder Weidenrindecoct, und Reiben mit gewürzhaften Kräutern, z. B. der Pfeffer- und Krausemünze, Polei, Lavendel, Melisse, Majoran, Rosmarin, Chamille, Salbei u. d. gl. zu empfehlen.

§. 1992.

Mit dem äuſserlichen Gebrauch des Bleiwassers oder Bleicerats muſs man hier vorsichtig seyn.

Krankheiten der Drüsen.

§. 1993.

Die Krankheiten, welchen die Drüsen sind ausgesetzt, sind:

1) Drüsenentzündung (§. 702.).
2) Eiterung der Drüsen (§. 708.).
3) Verhärtung der Drüsen (§. 1017.).
4) Scropheln (§. 1003.).
5) Scirrhus und Krebs (§. 930.).

Krankheiten der Gelenke.

§. 1994.

Zu den Krankheiten, denen die Gelenke unterworfen sind, gehören:

1) Entzündung der Gelenke.
2) Abscefs der Gelenke.
3) Gelenkgeschwür.
4) Gelenkgeschwülste (§. 1995.).
5) Wunden der Gelenke.
6) Quetschung der Gelenke.
7) Verrenkung (§. 1777.).
8) Unbeweglichkeit der Gelenke (§. 2005.).
9) Gelenkwassersucht (§. 2003.).
10) Gelenkschmerz (§. 1147.).
11) Knorpelichte Auswüchse im Kniegelenke (§. 2004.).

Gelenkgeschwulst.

§. 1995.

Gelenkgeschwulst (*Tumor Articulorum*) wird auch weifse Geschwulst (*Tumor albus*) oder Gliedschwamm (*Fungus Articulorum*) genennt, und befällt am häufigsten das Knie.

§. 1996.

Diagnosis. Schmerzhafte Geschwulst am Gelenke.

Die Geschwulst ist entweder schon gleich anfangs stark, dabei schmerzhaft, der Schmerz durch das ganze Gelenk verbreitet, und die Gelenkbänder leiden zuerst, die Knochen aber erst in der Folge, welches man folglich rheumatischen Gliedschwamm nennt.

Oder die Geschwulst ist anfangs gering, und wird erst in der Folge merklich, dabei sehr schmerzhaft, und der Schmerz ist nicht durch das ganze Gelenk verbreitet, sondern nur an einer Stelle, gemeiniglich mitten im Gelenke, die Knochen leiden zuerst, und die weichen Theile des Gelenks aber erst in der Folge, welches man, obgleich mit Unrecht, scrophulösen Gliedschwamm nennt.

§. 1997.

Ursache. Diese besteht in einem Fehler der Mischung und der Erregbarkeit, und zwar in Asthenie.

§. 1998.

Ursächliche Momente. Quetschung, Verrenkung, u. s. w.

§. 1999.

Prognosis. Die Dauer ist unbestimmt. Die Gefahr ist jederzeit beträchtlich. Oft verursachen sie bösartige Geschwüre. Gemeiniglich erfolgt endlich Abzehrung. Die Heilung ist beschwerlich und langsam.

§. 2000.

Curplan. Dieser ist reizend.

§. 2001.

Äuſserlich sind flüchtige Linimente (s. Form. N. 7. 8.) und das Reiben mit gewürzhaften Kräutern (§. 71.) zu empfehlen.

Überdieſs lobt man äuſserlich noch eine Auflösung des Geigenharzes in Weingeist, *emplastrum de Ammoniaco l. de Galbano crocatum l. Oxycroceum*, Meerzwiebelessig, u. a. m.

§. 2002.

Die Amputation findet hier auch bei gewissen Fällen statt.

Gelenkwassersucht.

§. 2003.

Gelenkwassersucht (*Hydrops articulorum, Hydarthrus*) ist eine Anhäufung wäſsriger Feuchtigkeiten in der Gelenkkapsel.

Hier ist Geschwulst am Gelenke, am öftersten am Kniegelenke, und Beschwerlichkeit bei der Bewegung des leidenden Theiles vorhanden.

Sonst gehört die Gelenkwassersucht zur Gelenkgeschwulst, und erfordert auch die nemliche Behandlung (§. 2001). Auch sind hier Einschnitte, um das Wasser herauszulassen, von Nutzen.

Knorplichte Auswüchse im Kniegelenke.

§. 2004.

In den Gelenken, am häufigsten aber in dem Kniegelenke, werden zuweilen kleine Stückchen

Knorpel, gewöhnlich von der Gröfse einer kleinen Bohne, gefunden.

Hier kann blofs die Operation Hülfe verschaffen.

Steifigkeit der Gelenke.

§. 2005.

Steifigkeit oder Unbeweglichkeit der Gelenke (*Anchylosis, Anchyle*) wird getheilt:

1) in vollkommene (*Anchylosis perfecta*), gewöhnlich wahre (*Anchylosis vera*) genannt, wo die Knochen in den Gelenken mit einander ganz verwachsen sind.

2) in unvollkommene (*Anchylosis imperfecta*), gewöhnlich falsche (*Anchylosis spuria*) genannt, wo die Bewegung zweier Knochen im Gelenke zum Theil verloren ist.

§. 2006.

Ursache. Diese besteht in einem Fehler der Mischung und Form.

§. 2007.

Ursächliche Momente. Geschwülste, Verrenkung, Knochenbruch, u. s. w.

§. 2008.

Curplan. Dieser besteht in dem äufserlichen Gebrauch erweichender Mittel.

§. 2009.

Äufserlich sind hier fette Öle, Altheensalbe,

laue Bäder, Gänse - oder Schweinefett, *emplastrum de Ammoniaco l. de Galbano*, anzuwenden.

Krankheiten der Blutgefäfse.

§. 2010.

Die Krankheiten, denen die Blutgefäfse sind ausgesetzt, sind:

1) Pulsadergeschwulst (§. 1669.).

2) Blutadergeschwulst (§. 1678.).

3) Krampfschlagadergeschwulst (§. 1691.).

4) Verknöcherung.

5) Wunden (§. 2011.).

§. 2011.

Verletzung einer Pulsader erkennt man, wenn das Blut mit starker Gewalt, hellroth und sprungweise hervorkömmt.

Verletzung einer Blutader erkennt man, wenn das Blut dunkelroth, langsamer und ununterbrochen hervorströmt.

Verletzungen grofser Pulsadern in inneren Theilen sind wegen dem Blutverluste, indem es nicht möglich ist, den Blutfluſs hier zu stillen, gemeiniglich tödlich.

Verletzungen der Pulsadern sind weit gefährlicher, als die der Blutadern.

Curplan s. §. 1393.

Krankheiten der Nerven.

§. 2012.

Die Nerven werden öfters verletzt, wodurch heftiger Schmerz entsteht, welcher durch den Gebrauch des Mohnsafts gehoben werden muſs.

Krankheiten der Knochen.

§. 2013.

Die Knochen sind folgenden Krankheiten unterworfen:

1) Knochenentzündung (§. 697.).
2) Beinfraſs (§. 956.).
3) Knochengeschwulst (§. 2014.).
4) Winddorn (§. 960.).
5) Necrose (§. 432. 960. 972.).
6) *Paedarthrocace*, s. Krankh. d. Kind.
7) Englische Krankheit, s. Krankh. d. Kind.
8) Buckel.
9) Beinbruch (§. 1760.).
10) Verrenkung (§. 1773.).
11) Knochenschmerzen (§. 2029).
12) Weichwerden der Knochen (§. 2029.).

Knochengeschwulst.

§. 2014.

Die Knochengeschwülste (*Exostosis, Hyperostosis*) theilt man ein:

1) in Knochenauswuchs, oder Beingeschwulst (*Exostosis*); ist sie hart, so heifst sie *exostosis*; hat sie die Gestalt eines Knotens, so nennt man sie *nodus*; ist sie beträchtlich weicher, so wird sie *tophus* genennt; und ist sie sehr weich, so heifst sie *gummi*.

2) in Knochenspeckgeschwulst (*Osteosteatoma*), wenn die Geschwulst aus Knochentheilen und einer speckigten Masse besteht.

3) in Krebsschwamm über oder unter dem Handgelenke (*Fungus osseus*), wenn die Geschwulst sehr langsam wächst und endlich in Krebs übergeht.

4) in Knochenwassersucht (*Hydrosteon*), wenn in der Geschwulst eine wäfsrige Jauche befindlich ist.

§. 2015.

Die Knochengeschwülste theilt man überdiefs noch in gutartige und bösartige, harte und weiche, schmerzhafte und unschmerzhafte, wahre und falsche.

§. 2016.

Geschwülste der Beinhaut kommen bisweilen den Knochenauswüchsen an Härte gleich; man nennt sie dann gemeiniglich falsche Knochenauswüchse (*exostosis spuria*).

§. 2017.

Ursache. Diese besteht in Fehlern der Mischung und Form der Knochen.

§. 2018.

Ursächliche Momente. Quetschung, Lustseuche, u. s. w.

§. 2019.

Prognosis. Die Gefahr ist unbestimmt. Oft gesellt sich Beinfrafs und Abzehrung hinzu. Gemeiniglich kann blofs die Operation Nutzen schaffen.

§. 2020.

Curplan. Dieser besteht in dem innerlichen und äufserlichen Gebrauch der Reizmittel und der Ätzmittel, und in der Operation.

§. 2021.

Äufserlich sind Bleiwasser, Salmiakgeist, Campherspiritus, Bähungen von gewürzhaften Kräutern (§. 179.), eine Sublimatauflösung, Melissen-Lavendel - Rosmarin - und Münzengeist und flüchtige Linimente anzuwenden.

§. 2022.

Doch richtet man mit dem Gebrauch äufserlich angewendeter Arzeneimittel selten etwas aus, sondern gemeiniglich mufs die Geschwulst vermittelst der Operation entfernt werden.

Weichwerden der Knochen.

§. 2023.

Weichwerden der Knochen (*Osteomalacia*, *Osteosarcosis*, *Mollities ossium*) fängt gemeinig-

lich mit Schmerzen in irgend einem Knochen an, worauf derselbe weich, gekrümmt und verkürzt wird.

Dieses erstreckt sich dann über mehrere Knochen, ja zuletzt über alle.

Die Glieder werden dabei öfters so empfindlich, dafs die geringste Berührung schmerzhaft ist.

Während dem ganzen Verlauf der Krankheit geht ein dicker Urin mit einem kalkartigen Bodensatze ab.

Die Knochen werden endlich auch mürbe und zerbrechlich.

§. 2024.

Ursache. Diese besteht in einem Fehler der Mischung und Form der Knochen.

§. 2025.

Ursächliche Momente. Das Weichwerden der Knochen ist gemeiniglich Folge anderer Formen des Übelbefindens, als der Englischen Krankheit, des Scorbuts, der Lustseuche, der Gicht, u. a. m.

§. 2026.

Prognosis. Die Gefahr ist hier sehr grofs, und gemeiniglich gesellt sich ein auszehrendes Fieber hinzu.

§. 2027.

Curplan. Dieser besteht in dem Gebrauch der Reizmittel und Ätzmittel.

§. 2028.

Da man in neueren Zeiten das Weichwerden der

Knochen als eine Folge des Überflusses von Phosphorsäure betrachtet, so empfiehlt man daher dagegen Laugensalze, Kalkwasser, u. d. gl.

Knochenschmerz.

§. 2029.

Der Knochenschmerz (*Osteocopus*) ist gemeiniglich ein Symptom der Knochengeschwülste, des Nachts am heftigsten, und erfordert den innerlichen Gebrauch der Ätzmittel, welche dann mit Reizmitteln zu verbinden sind.

Krankheiten des Kopfes.

§. 2030.

Da der Kopf aus mehreren Theilen besteht, als aus der Hirnschale, Kopfbedeckungen, Hirnhäuten, Gehirn, Gesichte, Ohren, Augen, Nase, Kinnlade, Munde, u. a. m. so werde ich hier dieselben einzeln betrachten, und die Krankheiten derselben anführen.

§. 2031.

Ehe ich aber zu den Krankheiten der einzelnen Theile des Kopfes übergehe, so will ich vorher erst den Kopfschmerz abhandeln.

Kopfschmerz.

§. 2032.

Kopfschmerz, oder Kopfweh (*Cephalalgia*)

erstreckt sich entweder über den ganzen Kopf, oder nur über einen Theil desselben.

§. 2033.

Den Kopfschmerz theilt man ein:

1) in *Cephalalgia*, gewöhnlichen Kopfschmerz.

2) in *Cephalaea*, wenn der Kopfschmerz heftig und anhaltend ist.

3) in *Hemicrania* (halbseitiges Kopfweh, *Migraine*), wenn der Schmerz nur eine Hälfte des Kopfes einnimmt.

4) in *Calvus*, wenn der Schmerz nur eine kleine Stelle des Kopfes einnimmt, und dabei sehr heftig ist.

§. 2034.

Überdiefs theilt man den Kopfschmerz noch ein n periodischen, idiopathischen, symptomatischen und sympathischen, u. s. w.

§. 2035.

Das Kopfweh gesellt sich oft zu andern Formen des Übelbefindens, als zu Krankheiten des Gehirns, Hirnentzündung, Gehirnwassersucht, Fieber, Typhus, Ohrenentzündung, Zungenentzündung, Lungenentzündung, Catarrh, fieberhaften Ausschlägen, Hysterie, u. a. m.

§. 2036.

Ursache. Diese besteht in Fehlern der Erregbarheit, und zwar gemeiniglich in Asthenie, selten in Hypersthenie.

§. 2037.

Ursächliche Momente. Anhäufung wäfsriger Feuchtigkeiten oder Geschwüre im Gehirn, Beinfrafs des Hirnschädels, Würmer in den Stirnhöhlen, Lustseuche, Mifsbrauch geistiger Getränke, des Mohnsaftes, der Tollkirsche, u. d. gl. hysterische Disposition, schädliche Dämpfe und Dünste, zu starke Ausleerungen der Säfte, Erkältung, Vollblütigkeit, Schwangerschaft, Ärger, u. s. w.

§. 2038.

Prognosis. Die Dauer sowohl, als die Gefahr des Übelbefindens ist unbestimmt. Gemeiniglich ist es ohne Gefahr, doch zuweilen ist es doch bedenklich.

§. 2039.

Curplan. Dieser besteht gemeiniglich in dem Gebrauch der Reizmittel; selten sind asthenische Mittel angezeigt.

§. 2040.

Innerlich sind Naphte, versüfster Vitriol- Salpeter - und Salzgeist, Mohnsaft, Caffee, Baldrian, u. a. m. anzuwenden.

Äufserlich sind Kräutersäckchen (§. 181.), flüchtige Linimente (s. Form. N. 7. 8.), u. s. w. zu empfehlen.

Krankheiten der Kopfbedeckungen.

§. 2041.

Zu den Krankheiten der äufsern Kopfbedeckungen oder der behaarten Theile des Kopfes gehören:

1) Kopfwunden (§. 2042.).

2) Quetschung der Kopfbedeckungen (§. 2042.).

3) Kopfgrind (§. 867. 876.), *Achores* und *Favus*, s. Krankh. d. Kinder.

4) Weichselzopf (§. 2045.).

5) Balggeschwülste, und zwar Maulwurfsgeschwulst (§. 1549.), Schildkrötengeschwulst (§. 1549.), und Zweikopf (§. 2043.).

6) Kopfwindsucht (§. 2044.).

7) äufserer Wasserkopf (§. 2063.).

§. 2042.

Verletzungen und Quetschungen der äufsern Bedeckungen des Kopfes sind immer bedenklich, vorzüglich wenn die Aponeurosis und das Pericranium mit leiden.

Die Folgen sind Fieber und Schmerz; und bei einer beträchtlichen Verletzung erfolgt Entzündung und Eiterung der Häute, Raserei, Schlafsucht, heftiges Fieber, u. s. w.

Die Behandlung s. §. 1750. 1758. 1759.

§. 2043.

Zweikopf (*Bicephalium*) ist eine Balggeschwulst am Kopfe, von der Beschaffenheit einer Fleischgeschwulst oder Fettgeschwulst, welche die Gestalt und Gröfse eines doppelten Kopfes hat.

§. 2044.

Kopfwindsucht (*Physocephalus*) ist eine Windgeschwulst der äufsern Bedeckungen des Kopfes.

Weichselzopf.

§. 2045.

Weichselzopf (*Plica polonica*, *Trichoma*) ist eine Krankheit der behaarten Theile des Kopfes, wobei eine besondere klebrige Feuchtigkeit aus denselben ausschwitzt, wodurch die Haare zusammenkleben, und gleichsam Stricke, die oft von bedeutender Länge sind, bilden.

§. 2046.

Die Haare kleben hier so zusammen, dafs sie gar nicht mehr aus einander gebracht werden können. Die Stricke sind oft Ellen lang. Zuweilen gehen sie um den Kopf herum, und bilden eine dicke Rolle.

§. 2047.

Das Übel ist ansteckend, herrscht vorzüglich in der Gegend des Weichselflusses, und ist Polen, Russen und Tartarn eigen.

§. 2048.

Der Weichselzopf bildet sich oft ohne die geringsten vorhergegangenen Beschwerden, oft gehen aber vor der Entstehung desselben allerhand kränkliche Zufälle vorher.

§. 2049.

Dem Ausbruche gehen oft Schmerzen des Kopfes und der Glieder, Mattigkeit, Schwindel, u. d. gl. vorher.

Hierauf entstebt ein klebriger übelriechender Schweifs am Kopfe, worauf die Haare, alles Kämmens und Puderns ungeachtet, zusammenkleben.

Nach der völligen Bildung des Weichselzopfes hören die demselben vorhergegangenen kränklichen Zufälle auf.

§. 2050.

Überdiefs sind die mit dem Weichselzopfe Behafteten gröfstentheils gesund; öfters leiden sie aber doch an klebrigen Schweifsen, hectischem Fieber, Knochenschmerzen, u. s. w.

§. 2051.

Bei verhindertem Ausbruche oder von unvorsichtiger Abschneidung des Weichselzopfes entstehen bedenkliche Zufälle, als bösartige Geschwüre, vorzüglich der Nägel, Zuckungen, Schlägflüsse, Irrereden, Blindheit, u. a. m.

§. 2052.

Ursache. Diese besteht in einem Fehler der

Mischung und Form der Haare und der behaarten Theile des Kopfes.

§. 2053.

Ursächliches Moment. Dieſs ist ein besonderer Ansteckungsstoff, dessen Wirkung noch durch Unreinlichkeit, Erkältung, Ärger, u. d. gl. verstärkt wird.

§. 2054.

Prognosis. Die Dauer ist unbestimmt. Gemeiniglich währt das Übel Monate lang. Die Gefahr ist unbedeutend, wenn der Ausbruch nicht gestört wird. Bedenklich wird aber das Übel, sobald der Ausbruch gestört oder der Weichselzopf unvorsichtiger Weise abgeschnitten wird. Leicht erfolgen Rückfälle.

§. 2055.

Curplan. Das Übel ist unheilbar, folglich ist auch an keine Hülfe zu denken. Nur muſs man nicht schaden, wo man nicht helfen kann. Der Zopf darf nicht abgeschnitten werden, er müſste denn ganz trocken und ohne stinkenden Geruch seyn.

Innerlich kann man Spiesglanzmittel anwenden, und äuſserlich Hexenmehl (*semen Lycopodii*) auf den Kopf streuen lassen.

Krankheiten der Haare.

§. 2056.

Die Krankheiten, denen die Haare sind ausgesetzt, sind:

1) Haarausfallen (*Alopecia*). Dieſs ist oft die Folge heftiger Fieber, der Lustseuche, hectischer Fieber, u. s. w.

2) Aufspringen und Spalten der Haare. Hier ist das Abschneiden der Haare, und dann der äufsere Gebrauch fettiger Substanzen von Nutzen.

3) Weichselzopf (§. 2045.).

Krankheiten der Hirnschale.

§. 2057.

Die Hirnschale ist folgenden Krankheiten unterworfen:

1) Quetschung, Eindruck, Fissur und Fractur des Hirnschädels.

2) Beinfrafs des Hirnschädels. Dieser erfordert die Entfernung des angegriffenen Knochenstückes vermittelst des Trepans.

Krankheiten der Hirnhäute.

§. 2058.

Die Hirnhäute sind folgenden Krankheiten unterworfen:

1) Entzündung der Gehirnhäute (§. 2060.).

2) Wunden der Gehirnhäute (§. 2059.).

3) Extravasation unter dem Hirnschädel (§. 2060.).

4) innerer Wasserkopf (§. 2063.).

5) Schwamm der harten Hirnhaut (§. 2064.).

§. 2059.

Verletzungen der Hirnhäute und des Gehirns sind jederzeit gefährlich. Die Folgen derselben sind Entzündung und Eiterung des Gehirns und der Häute desselben, Erschütterung des Gehirns, Extravasation, u. d. gl. ferner Fieber, Raserei, Lähmung, Zuckungen, Schlafsucht, u. s. w.

§. 2060.

Die Entzündung und Eiterung des Gehirns und der Hirnhäute, die Extravasation unter dem Hirnschädel, die Erschütterung des Gehirns und die Hirnschaleneindrücke erkennt man aus ihren Folgen, nemlich aus der Betäubung, Schlafsucht und Lähmung.

Um diese aber gehörig von einander unterscheiden zu können, so mufs man auf folgendes Rücksicht nehmen.

Bei der Entzündung ist mehr oder weniget heftiges Fieber (§. 444.). Eiterung setzt vorhergegangene Entzündung voraus. Die Erschütterung erzeugt sogleich heftige Zufälle. Die Extravasation erregt nicht sogleich heftige Zufälle, sondern erst späterhin. Die Hirnschaleneindrücke erregen sogleich heftige Zufälle; auch kann man sie sehen und fühlen.

§. 2061.

Krankheiten der Hirnhäute und des Gehirns sind jederzeit bedenklich, und endigen sich gemeiniglich mit dem Tode. Die Erschütterung des Gehirns ist meistentheils sogleich tödlich. Die Extravasation

unter dem Hirnschädel erzeugt auch zuweilen sogleich den Tod.

§. 2062.

Die Behandlung der Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute s. §. 449.

Bei Erschütterung des Gehirns findet der Gebrauch der Reizmittel statt.

Bei der Extravasation oder Ergiefsung von Feuchtigkeiten unter dem Hirnschädel ist öfters die Trepanation angezeigt.

Bei Hirnschaleneindrücken mufs die niedergedrückte Stelle vermittelst des Trepans wieder in die Höhe gehoben werden.

§. 2063.

Eine Anhäufung wäfsriger Feuchtigkeiten zwischen den äufsern Kopfbedeckungen, welche sich durch Geschwulst zu erkennen giebt, heifst äufserer Wasserkopf.

Ist das Wasser innerhalb der Hirnschale befindlich, so heifst die Krankheit innerer Wasserkopf, wenn sich wäfsrige Feuchtigkeiten zwischen den Hirnhäuten, oder zwischen ihnen und der Hirnschale angehäuft haben; und Gehirnwassersucht, wenn sich das Wasser in den Hirnkammern angesammelt hat. Bei ersterem ist die Hirnschale ausgedehnt, bei letzterer aber nicht.

Bei der Wassersucht des Gehirns oder der Hirnhäute ist Betäubung, Schlafsucht, Lähmung, Erbrechen, u. s. w. vorhanden.

Von diesen drei Arten der Wassersucht s. Krankheiten d. Kinder.

§. 2064.

Der Schwamm der harten Hirnhaut ist ein Fleischgewächs, welches von der harten Hirnhaut seinen Ursprung nimmt, den überliegenden Hirnschalknochen allmählig durchbohrt, und innerhalb der äufsern Kopfbedeckungen eine unschmerzhafte Geschwulst erzeugt. Beim Zurückdrücken der Geschwulst fühlt man deutlich den Rand der Öffnung im Knochen. Ein starkes Zurückdrücken der Geschwulst verursacht Betäubung, Lähmung und Schlafsucht.

Hier sind zuerst Einschnitte in die äufsern Bedeckungen und wiederholte Trepanationen anzuwenden, wodurch die ganze Geschwulst entblöfst wird. Dann sind entweder Ätzmittel, als gebrannter Alaun oder Kupfervitriol, anzuwenden, oder, im Fall, dafs der Schwamm auf einem dünnen Stiele sitzt, findet die Ausrottung desselben vermittelst des Messers oder die Unterbindung statt.

Krankheiten des Gehirns.

§. 2065.

Zu den Krankheiten, welchen das Gehirn unterworfen ist, gehören:

1) Gehirnentzündung (§. 2060.).
2) Wunden des Gehirns (§. 2059.).
3) Gehirnwassersucht (§. 2063.).

4) Erschütterung des Gehirns (*Commotio cerebri*, §. 2060.).

5) Hirnbruch (§. 2066.).

6) Hirnschwamm (§. 2066.).

§. 2066.

Ein Heraustreten des Gehirns aus der Hirnhöhle durch eine Öffnung in dem Knochen des Hirnschädels heifst Hirnbruch (*Encephalocele*), und wenn dadurch eine dem Schwamme ähnliche Geschwulst gebildet wird, so nennt man es Hirnschwamm.

Bei dem Hirnbruche ist die Geschwulst weich und teigigt anzufühlen, unschmerzhaft, wird durch den Druck vermindert, bei dessen Nachlafs sie aber wieder ihre vorige Gröfse annimmt. Auch fühlt man gemeiniglich in ihr ein Klopfen der Pulsadern.

§. 2067.

Der Hirnbruch ist gemeiniglich unheilbar, und in kurzem tödlich. Denn das schnelle Zurückdrücken der Geschwulst verursacht Betäubung, Schlafsucht und Lähmung. Blofs bei einem kleinen Bruche, der die Gröfse eines Hühnereies nicht übersteigt, kann ein anhaltender, gelinder und allmählig vermehrter Druck versucht werden.

Ein Hirnschwamm ist durch die Operation vermittelst des Messers zu entfernen.

Krankheiten des Gesichts.

§. 2068.

Das Angesicht ist verschiedenen Krankheiten unterworfen. Hieher gehören:

1) Gesichtsschmerz (§. 1150.).
2) Hundskrampf (§. 1225.).
3) Sardonisches Lachen (§. 1227.).
4) Wunden.
5) Ausschläge, als Blattern, Masern, u. d. gl.
6) Rose, Gesichtsrose (§. 683.).
7) Kupferhandel (§. 2069.).
8) Finnen (§. 880.).
9) Sommersprossen (§. 882.).
10) Ansprung, s. Krankh. d. Kinder.
11) Gesichtskrebs.
12) Ohrdrüsengeschwulst (§. 702. 483.).
13) Entzündung und Eiterung der Stirn.

§. 2069.

Kupferhandel (*Gutta rosacea*) besteht in einer ungewöhnlichen Röthe der Nase, der Backen und der übrigen Theile des Gesichts.

Er ist gemeiniglich Folge des Mifsbrauchs geistiger Getränke.

Die Behandlung desselben s. §. 827.

§. 2070.

Gegen Würmer und andere Insecten, welche in die Stirnhöhlen gekommen sind, und deren Daseyn sich durch einen Schmerz, vorzüglich an der Nasenspitze und häufigem Niesen zu erkennen giebt, sind Dämpfe von Wermuthdecoct oder Tabacksdecoct in die Nasenlöcher gelassen, zu empfehlen.

Krankheiten der Gehörorgane.

§. 2071.

Zu den Krankheiten, denen die Gehörorgane, nemlich die Ohren, unterworfen sind, gehören:

1) Wunden des äufseren Ohres.
2) Verwachsung des äufsern Gehörganges, s. Krankh. d. Kind.
3) Polypen im Gehörgange.
4) Ohrenentzündung (§. 473.).
5) Ohrenzwang oder Ohrenschmerz (*Otalgia*, §. 1133.).
6) Ohrenfluſs (*Otorrhoea*), d. i. Ausfluſs von Eiter oder Blut aus den Ohren.
7) Fehlerhaftes Gehör, und zwar:
   a) Ohrenklingen und Ohrenbrausen (§. 2072.).
   b) zu feines Gehör.
   c) Schwerhörigkeit (§. 2073.).
   d) Taubheit (§. 2073.).

§. 2072.

Ohrenklingen (*Tinnitus aurium*) und **Ohrenbrausen** (*Susurrus aurium*) gesellt sich oft zu Fiebern, Catarrhen, u. d. gl. oder ist Folge von Erkältung, u. s. w. oder geht als Vorbote anderen Formen des Übelbefindens vorher, z. B. dem Schlagflusse, der Fallsucht, dem Schnupfen, der Ohnmacht, dem Nasenbluten, u. a. m.

Die Cur besteht in dem Gebrauch der Reizmittel.

Taubheit.

§. 2073.

Schwerhörigkeit (*Auditus difficilis, Cophosis, Dysecoia*) und **Taubheit** oder Mangel des Gehörs (*Surditas*) sind blofs in Rücksicht der Grade von einander verschieden.

§. 2074.

Ursache. Diese besteht bald in Fehlern der Erregbarkeit, bald in Fehlern der Mischung und Form der Gehörorgane.

§. 2075.

Ursächliche Momente. Starke Erkältung, Beinfrafs der Gehörknochen, Unthätigkeit der Gehörnerven, Erschütterung von starken Schüssen, Verstopfung der Eustachischen Röhre, verhärtetes Ohrenschmalz, grofse Trockenheit der Gehörorgane, Polypen im Gehörgange, u. s. w.

§. 2076.

Prognosis. Diese hängt von der Integrität der Gehörorgane ab. Taubheit von Fehlern der Gehörknochen ist unheilbar.

§. 2077.

Curplan. Dieser ist gemeiniglich reizend; sehr oft sind aber auch ätzende Mittel angezeigt; selten findet aber die schwächende Methode statt.

§. 2078.

Äufserlich sind Einspritzungen von Aufgüssen gewürzhafter Kräuter in das Ohr, Dämpfe von Majoran - Lavendel - Pfeffermünzen - Chamillen - Hollunderaufgufs in das Ohr gelassen, Baumwolle mit Campheröl oder ätherischen Ölen befeuchtet in das Ohr gebracht, anzuwenden.

Auch lobt man hier die Electricität sehr.

§. 2079.

Bei verhärtetem Ohrenschmalze sind fette Öle, Seifenwasser und Milchrahm in das Ohr gebracht, anzuwenden.

§. 2080.

Bei zu grofser Trockenheit des Gehörganges sind Dämpfe von gewürzhaften in Milch gekochten Kräutern, Mandelöl oder andere fette Öle und Wein in das Ohr getröpfelt, zu empfehlen.

§. 2081.

Bei Verstopfung der Eustachischen Röhre kann man sich der Einspritzungen von Aufgüssen gewürzhafter Kräuter durch den Mund oder die Nase bedienen.

§. 2082.

Sind Insecten in das Ohr gekommen, so ist das Einbringen der Baumwolle mit Terpentin, Wermuthöl oder Branntwein befeuchtet, zu empfehlen. Auch kann man sich der Einspritzungen bedienen.

§. 2083.

Polypen oder andere Geschwülste im Gehörgange sucht man auszurotten (§. 1568.), fremde in das Ohr gerathene Körper oder Insecten zu entfernen, u. s. w.

Krankheiten der Augen.

§. 2084.

Der Krankheiten, denen die Augen unterworfen sind, ist eine beträchtliche Anzahl. Um sie daher leichter übersehen zu können, will ich sie nach den einzelnen Theilen derselben abhandeln.

§. 2085.

Zu den Krankheiten, denen die Augenlieder unterworfen sind, gehören:

1) Ausfallen der Augenwimpern und Augenbraunen (*Madarosis*).

2) Umkehrung der Augenwimpern (§. 2090.).

3) Läusesucht der Augenbraunen (*Phtiriasis Superciliorum*).

4) Zusammenwachsen der Augenlieder (§. 2091.).

5) Wunden der Augenlieder.

6) Umkehrung der Augenlieder (§. 2092.).

7) Entzündung der Augenlieder (§. 456.).

8) Krampf der Augenlieder (*Spasmus palpebrarum*).

9) Jucken der Augenlieder (§. 2093.).

10) Niederfallen des obern Augenliedes (§. 2094.).

11) Hasenauge (§. 2095.).

12) Balggeschwülste an den Augenliedern.

13) Gerstenkorn und Hagelkorn (§. 2096.).

14) Maulbeergeschwulst der Augenlieder (*Morum*) s. Krankh. d. Kind.

15) Wasserbläschen der Augenlieder (§. 2097.).

16) Flechten der Augenlieder (*Trachoma*).

17) Warze der Augenlieder (*Ficus l. Thymus palpebrae*).

18) Callosität der Augenlieder (*Scleriasis, Tylosis*),

19) Augenliedspalte (*Coloboma*).

20) Lähmung der Augenlieder (§. 2098.).

21) Augenblinzen (§. 2099).

22) Brandbeule der Augenlieder (*Anthracosis oculi*).

§. 2086.

Krankheiten, die das Auge selbst befallen, sind:

1) Augenentzündung (§. 455.).
2) Eiterauge (§. 461. 462. 472.).
3) Blutauge (§. 2100.).
4) Wunden der Augen.
5) Augenkrebs (§. 2101.).
6) Augenwassersucht (§. 2102.).
7) Augenschmerz (*Ophthalmodinia*).
8) Augenschwinden (*Atrophia oculi*).
9) Augenvorfall (§. 2103.).
10) Brandbeule des Auges (*carbunculus oculi*).
11) Augenwinkelgeschwulst (*Anchilops*).
12) Augenwinkelgeschwür (*Aegilops, Peribrosis*).
13) Geschwulst der Thränenwarze (§. 2104.).
14) Schwinden der Thränendrüse (*Rhoeas, Rhyas*).
15) Thränenfluſs und Triefaugen (§. 2105.).
16) Blutweinen (*Lacrymatio sanguinea*).
17) Geschwulst und Carunkel der angewachsenen Haut.
18) Vorfall der Regenbogenhaut (§. 2106.).
19) Anwachsung der Regenbogenhaut (*Synechia*) mit der Hornhaut oder der Kapsel der Krystalllinse (§. 2106.).

§. 2087.

Krankheiten der Hornhaut.

1) Flecken der Hornhaut (§. 2111.).
2) Augenfell (§. 2112.).
3) Geschwulst der Hornhaut (§. 2110.).
4) Zusammenfallen der Hornhaut (*Rutidosis*).
5) Verdunkelung der Hornhaut (§. 2119.)
6) Carunkeln der Hornhant (§. 2120.).
7) Abscefs der Hornhaut.
8) Geschwür der Hornhaut (§. 2108.).
9) Fistel der Hornhaut (§. 2109.).

§. 2088.

Krankheiten des Augensterns.

1) Erweiterung des Augensterns (§. 2121.).
2) Verengerung des Augensterns (§. 2122.).
3) Verschliefsung des Augensterns (§. 2122.).

§. 2089.

Krankheiten des Gesichts.

1) Schwäche des Gesichts (§. 2124.).
2) Halbsichtigkeit (§. 2128.).
3) Doppeltsehen (§. 2125.).
4) Lichtscheu (§. 2126.).
5) Lichtsehen (§. 2127.).
6) Schielen (*Strabismus*, *Luscitas*).
7) grauer Staar (§. 2132.).
8) schwarzer Staar (§. 2145.).
9) grüner Staar (§. 2144.).

10) Nachtblindheit (§. 2129.).
11) Tagblindheit (§. 2129.).
12) Kurzsichtigkeit (§. 2130.).
13) Weitsichtigkeit (§. 2131.).

Fehler der Augenlieder.

§. 2090.

Wenn die Augenwimpern nach dem Augapfel gekehrt sind, so dafs sie denselben reizen, so heifst es *Trichiasis*.

Ist ein Theil der Augenwimpern nach innen, und ein anderer Theil derselben nach aufsen gekehrt, so nennt man es *Distichiasis*.

Dieses Übel erfolgt gemeiniglich nach Augenentzündungen.

Es wird blofs durch das Ausreifsen der Haare gehoben.

Um das Wachsen der ausgerissenen Haare zu verhindern, so sind die Stellen, wo sie gestanden haben, mit Salmiakgeist oder einer schwachen Auflösung des Höllensteins zu befeuchten.

§. 2091.

Das Zusammenwachsen der Augenlieder (*Ancyloblepharum*) ist entweder angeboren, oder nach Entzündungen, Verbrennungen oder Geschwüren entstanden.

Sind die Augenlieder blofs durch zähen Schleim oder Eiter zusammengeklebt, so ist das Befeuchten

derselben mit lauwarmer Milch oder Wasser oder einem Eibischwurzeldecoct zu empfehlen. Im Nothfall kann man die Augenlieder vermittelst einer Sonde entfernen.

Sind die Ränder der Augenlieder mit dem Augenwinkel oder mit dem Augapfel (welches letztere *Symblepharon* heifst) zusammengeklebt und verwachsen, so findet hier die Trennung derselben vermittelst des Messers oder der Scheere statt.

§. 2092.

Umkehrung der Augenlieder nach aufsen, heifst *Ectropium*, und nach innen *Entropium*. Ersterer Zufall befällt gemeiniglich das untere Augenlied, wobei der untere Theil des Augapfels unbedeckt ist. Bei letzterem Zustande ist gemeiniglich auch *Trichiasis*.

Ectropium wird erzeugt:

1) durch Verkürzung der äufsern Haut des Augenliedes durch Narben, nach Wunden und Geschwüren oder nach Verbrennungen. Hier sind äufserlich entweder fette Öle oder erschlaffende Salben, oder die Operation, nemlich der Schnitt, anzuwenden.

2) durch eine ungewöhnliche Anschwellung der innern Haut des Augenliedes, oder durch Balggeschwülste in der Augenhöhle. Hier findet die Operation statt.

3) durch Erschlaffung oder Lähmung des Schliefsmuskels der Augenlieder.

Entropium wird am häufigsten von einer ungewöhnlichen Erschlaffung der äufsern Haut des Augenliedes hervorgebracht; welche dann entweder durch den äufseren Gebrauch des Alauns, oder durch die Operation gehoben wird.

§. 2093.

Gegen das Jucken der Augenlieder (*Pruritus palpebrarum*) ist äufserlich eine Auflösung des weifsen Vitriols (s. Form. N. 26.) oder des Sublimats (§. 240.) anzuwenden.

§. 2094.

Blepharoptosis oder *Ptosis* bestehet in einem Unvermögen des Kranken, das obere Augenlied in die Höhe zu heben, und folglich das Auge nach Willkühr öffnen zu können.

Das Übel entsteht:

1) am häufigsten von einer ungewöhnlichen Erschlaffung und Verlängerung der äufsern Haut des obern Augenliedes. Hier wird die überflüfsige äussere Haut des Augenliedes vermittelst einer Scheere abgeschnitten.
2) von einer Schwäche oder Lähmung des Aufhebemuskels der Augenlieder.
3) von einem Krampfe des Schliefsmuskels der Augenlieder.

§. 2095.

Hasenauge (*Lagophthalmus*) bestehet in einem Unvermögen, die Augenlieder gehörig schliefsen zu können.

Die Folgen hiervon sind: beständiges Augentriefen, Anhäufung von Schmuz auf dem Augapfel, u. s. w.

Das Übel entsteht von einem Krampfe des Aufhebemuskels, oder von Lähmung des Schiefsmuskels der Augenlieder. Am häufigsten aber wird es durch eine Verkürzung der äufsern Haut des obern Augenliedes erzeugt, welche eine Folge der Vernarbung nach Wunden, Verbrennungen oder Abscessen ist. Hier findet der äufsere Gebrauch fetter Öle oder der Eibischsalbe, oder die Operation vermittelst des Schnitts statt.

§. 2096.

Gerstenkorn (*Hordeolum*) ist ein kleines und hartes Knötchen am Rande der Augenlieder (§. 456.), welches entweder entzündet oder unentzündet, eiternd oder verhärtet ist. Ist das Knötchen einer kleinen Balggeschwulst ähnlich, so heifst es **Hagelkorn** oder Hirsenkorn (*Chalazion*, *Miliolum*).

Gegen entzündete Knötchen sind äufserlich reizende und erschlaffende Mittel; gegen verhärtete Knötchen aber Schierlingspflaster, Seifenspiritus und flüchtige Linimente (s. Form. N. 7. 8.) oder das Ausschälen desselben zu empfehlen.

§. 2097.

Wasserbläschen der Augenlieder müssen ausgeschält werden.

§. 2098.

Bei Lähmung der Augenlieder ist vorzüglich das Einreiben ätherischer Öle zu empfehlen.

§. 2099.

Augenblinzen (*Hippos*, *Nictitatio*) **bestehet in einem schnellen abwechselnden Öffnen und Zuschliefsen der Augen, und rührt entweder von einer üblen Gewohnheit oder von Schwäche der Augenlieder her. Im letzteren Fall ist das Einreiben ätherischer Öle oder flüchtiger Linimente (s. Form. N. 7. 8.) zu empfehlen.**

Fehler des Augapfels.

§. 2100.

Blutauge oder Blutunterlaufung des Auges (*Haemalops*, *Hypoaema*, *Hyposphagma*) **erfolgt nach** äufseren Gewaltthätigkeiten, **und erfordert den äusseren Gebrauch der Kräuterweine** (§. 99.). **Im Nothfall findet die Herauslassung des Blutes vermittelst der Operation statt.**

§. 2101.

Gegen den Augenkrebs (*Cancer bulbi oculi*) **ist die Ausrottung des Augapfels angezeigt.**

§. 2102.

Bei der Augenwassersucht (*Hydrophthalmia, Hydrops oculi*) wird anfangs Spannung im ganzen Umfange des Augapfels bemerkt. Bei den Bewegungen des Augapfels ist eine gewisse Steifigkeit wahrzunehmen, wobei das Gesicht geschwächt ist.

Dann schwillt der Augapfel allmählig sichtbarlich an, und ist dem Gefühl nach härter, als gewöhnlich, der spannende Schmerz wird heftiger, und der Augenstern erweitert sich.

Endlich schwillt der Augapfel so stark an, dafs er aus der Augenhöhle tritt, und nicht mehr von den Augenliedern bedeckt werden kann. Die Schmerzen sind jetzt sehr heftig und erstrecken sich durch den halben Kopf, das Gesicht geht gänzlich verloren, und der Augenstern wird unbeweglich.

Hat der Augapfel die Gröfse eines Hühnereies erreicht, so nennt man das Übelbefinden auch Ochsenauge (*Buphthalmos*).

Bei dem Ochsenauge ist wenig Hülfe noch zu erwarten.

Äufserlich sind Einschnitte in den Augapfel vorzunehmen.

§. 2103.

Vorfall des Augapfels, Hervortreten des Auges (*Ophthalmoptosis*) erfolgt nach äufseren Gewaltthätigkeiten, heftiger Erschütterung des Kopfes, Geschwülsten in der Augenhöhle, beim Husten oder Erbrechen, u. s. w.

Der aus der Augenhöhle herausgetretene Augapfel mufs so bald als möglich wiederum in dieselbe zurückgebracht werden.

§. 2104.

Bei einer Geschwulst der Thränencarunkel (*Encanthis*) ist das Auge beständig mit Thränen bedeckt. Zuweilen schwillt dieselbe zu einer ansehnlichen Gröfse, z. B. der einer kleinen Haselnufs an, so dafs dadurch das Schliefsen der Augenlieder gehindert wird.

Die Geschwulst ist entweder entzündet, oder geht in Eiterung über, wo sie dann vermittelst der Lancette geöffnet werden mufs; oder ist unschmerzhaft und weich, in welchem Fall dann äufserlich zusammenziehende und ätzende Mittel, als eine Alaunauflösung oder schwache Auflösung des Höllensteines anzuwenden sind, oder das Überflüfsige weggeschnitten wird.

§. 2105.

Thränenfluſs oder Thränenauge (*Epiphora*) bestehet in einem ungewöhnlich häufigen Ausflusse wäfsriger Feuchtigkeiten aus dem Auge. Ist die ausfliefsende Feuchtigkeit aber dick und eiterartig, so nennt man das Übel Augentriefen oder Triefaugen (*Lippitudo*).

Das Übelbefinden wird durch fremde in das Auge gekommene Körper, als Sand, Staub, scharfe Dämpfe, einwärts gekehrte Haare der Augenlieder,

Schwäche oder Verschliefsung der Thränenwege u. s. w. hervorgebracht.

Die Cur bestehet in der Entfernung der fremden Körper, der Wiedereröffnung der Thränengänge, und in dem äufserlichen Gebrauch reizender und zusammenziehender Mittel (s. Form. N. 26.).

Hieher gehört auch die Augenbutter (*lemositas*).

§. 2106.

Vorfall der Regenbogenhaut (*Ptosis Iridis*) ist gemeiniglich Folge der Operation des grauen Staars, wo dann die Regenbogenhaut durch die Öffnung der Hornhaut heraustritt.

Die Cur besteht in der Zurückbringung der Regenbogenhaut.

Bei der Anwachsung der Regenbogenhaut (*Synechia*) findet die Operation statt.

Fehler der Hornhaut.

§. 2107.

Fehler der Hornhaut sind gemeiniglich Folge einer vorhergegangenen Augenentzündung.

§. 2108.

Geschwüre der Hornhaut (*Ulcera corneae*) sind gemeiniglich die Folge von Augenentzündungen, und erfordern äufserlich zusammenziehende und ätzende Mittel, vorzüglich eine Auflösung des weifsen Vitriols (s. Form. N. 26.), des *Lapis divinus*, des Bleizuckers (s. Form. N. 26.) und des Sublimats (§. 240.).

Die Alten unterschieden die Geschwüre der Hornhaut, und zwar nannten sie ein oberflächliches Geschwür *Helcydrion*, ein tiefes Geschwür *Bothrion*, ein rundes Geschwür *Argema*, ein breites Geschwür *Coeloma*, ein unreines Geschwür *Encauma*.

§. 2109.

Fisteln der Hornhaut erkennt man aus einem trüben Striche zwischen den Lamellen der Hornhaut.

Der Fistelgang wird hier ganz oder zum Theil aufgeschlitzt.

§. 2110.

Geschwulst der Hornhaut, Vorfall der Hornhaut (*Staphyloma*), welche auch Mückenauge (*Myocephalum*), oder Melonauge (*Melon*), oder Traubenauge genennt wird, erfordert den äufserlichen Gebrauch ätzender Mittel, vorzüglich der Spiesglanzbutter.

Flecken und Felle der Hornhaut.

§. 2111.

Die Flecken der Hornhaut theilt man ein:

1) in *Achlys*, wenn derselbe halb durchsichtig und oberflächlich ist.
2) in *Nephelium*, wenn der Flecke weifs, undurchsichtig und nicht erhaben ist.
3) in *Aigis*, wenn der Flecke weifs, undurchsichtig und erhaben ist.

4) in *Leucoma l. Albugo*, wenn derselbe die ganze Hornhaut einnimmt, völlig undurchsichtig und ganz weifs ist.

5) in *Gerontoxon l. arcus senilis*, wenn nur der äufsere Rand der Hornhaut verdunkelt ist. Dieses findet man bei alten Personen.

§. 2112.

Die Augenfelle (*Pterygium*, *Pannus oculi*) oder Felle auf der Hornhaut werden eingetheilt:

1) in *Ungula*, wenn dasselbe dünn und durchsichtig ist.

2) in *Paralampsis*, wenn dasselbe glänzend, dick und beinahe ganz undurchsichtig ist.

3) in *Pannus*, wenn dasselbe dick, völlig undurchsichtig und mit sichtbaren Blutgefäfsen versehen ist, und die ganze Hornhaut bedeckt.

§. 2113.

Ursache. Diese bestehet in Fehlern der Mischung und Form der Hornhaut.

§. 2114.

Die Flecken und Felle der Hornhaut werden durch eine Austretung der Feuchtigkeiten zwischen den Lamellen der Hornhaut hervorgebracht.

§. 2115.

Ursächliche Momente. Vorhergegangene

Augenentzündung, Geschwüre der Hornhaut, Verbrennung, u. s. w.

§. 2116.

Prognosis. Undurchsichtige, die ganze Hornhaut einnehmende Flecken oder Felle verursachen Blindheit. Alte Flecken sind unheilbar.

§. 2117.

Curplan. Dieser besteht in dem äufserlichen Gebrauch ätzender und zusammenziehender Mittel.

Bei dem Augenfell findet auch die Operation, und zwar das Abschälen desselben vermittelst des Messers statt.

§. 2118.

Äufserlich ist eine Auflösung des Sublimats (§. 240.), oder des weifsen Vitriols (s. Form. N. 26), oder die rothe Präcipitatsalbe (s. Form. N. 25.) anzuwenden.

Überdiefs empfiehlt man äufserlich noch gepulverten Zucker, Wallnufsöl, eine Auflösung des Borax, oder des *lapis divinus*, Bolus oder Weinsteinrahm in Pulverform, gepulverten gebrannten Alaun, eine Auflösung des Salmiaks oder Brechweinsteins, Mohnsafttinctur, eine schwache Auflösung des Ätzsteines, Hirschhornsalz, eine Auflösung des Borax, u. a. m.

§. 2119.

Bei Verdunkelung der Hornhaut ist ei-

ne Auflösung des Sublimats (§. 240.) oder des weifsen Vitriols (s. Form. N. 26.) zu empfehlen.

Auch lobt man hier noch den Borax, *lapis divinus*, u. a. m.

§. 2120.

Carunkeln oder Auswüchse der Hornhaut und der angewachsenen Haut erfordern eine Auflösung des weifsen Vitriols, oder das vorsichtige Berühren mit dem Höllenstein oder der Spiesglanzbutter, oder das Wegschneiden vermittelst des Messers.

Fehler des Augensterns.

§. 2121.

Mydriasis bestehet in einer ungewöhnlichen Erweiterung des Augensterns, wobei er seiner Beweglichkeit beraubt ist.

Sie kömmt als Symptom bei dem schwarzen und grauen Staar, der Augenwassersucht, bei Würmern im Darmkanale, bei dem inneren Wasserkopfe, u. s. w. vor.

Auch können Mohnsaft, Bilsenkraut, Alraun, u. d. gl. äufserlich an das Auge gebracht, diesen Zustand bewirken.

Auch kann eine Schwäche und Lähmung des Augensternes dieses Übel erzeugen.

§. 2122.

Verengerung des Augensternes heifst

Myosis, so wie eine gänzliche Verschliefsung des Augensternes *Synizesis* genennt wird.

Sie entsteht am häufigsten nach einer heftigen Augenentzündung. Auch können Wunden der Regenbogenhaut das Übel veranlassen.

Hier ist dann die Operation angezeigt.

Fehler des Gesichtes.

§. 2123.

Bei fehlerhaftem Sehen (*Visus depravatus*) sind äufserlich Reizmittel, z. B. verdünnte Mohnsaftstinctur, verdünnter Vitriol - Salpeter - oder Salzgeist, verdünnter Branntwein oder Weingeist, und Wein anzuwenden.

§. 2124.

Schwäche des Gesichts (*Amplyopia*) ist gemeiniglich der Anfang des grauen Staares.

§. 2125.

Doppeltsehen (*Diplopia*) bestehet darinn, wenn die Gegenstände doppelt, dreifach oder vielfach gesehen werden.

Dieser Zustand ist gemeiniglich von kurzer Dauer.

§. 2126.

Lichtscheu (*Photophobia*) findet bei heftigen Augenentzündungen statt.

§. 2127.

Lichtsehen (*Photopsia*) ist derjenige Zustand, wo der Kranke feurige Funken, schwarze Punkte, u. d. gl. zu sehen glaubt.

§. 2128.

Halbsichtigkeit (*Hemiopia*) ist derjenige Zustand, wo der Kranke die Gegenstände nicht ganz, sondern nur zum Theil siehet.

Dieses Übel wird durch Verdunkelungen der Hornhaut oder der Krystalllinse, Herabhängung des oberen Augenliedes über den Augapfel, seitwärts stehenden Augenstern, u. d. gl. veranlafst.

§. 2129.

Bei der Nachtblindheit (*Hemeralopia*) kann der Kranke die Gegenstände bei Tage gut unterscheiden, bei Nacht aber nicht das geringste erkennen.

Bei der Tagblindheit (*Nyctalopia*) kann der Kranke bei Tage wenig oder gar nichts erkennen, bei Nacht aber gut sehen.

§. 2130.

Kurzsichtigkeit (*Myopia*) besteht darinn, wenn man die Gegenstände in der Ferne wenig oder gar nicht, in der Nähe aber sehr gut unterscheiden kann.

Dieses Übel wird durch eine zu starke Wölbung der Hornhaut oder ungewöhnliche Verlängerung des Augapfels, u. s. w. erzeugt.

§. 2131.

Weitsichtigkeit (*Presbyopia*) **besteht darinn, wenn man die Gegenstände in der Ferne deutlich, in der Nähe aber undeutlich siehet.**

Dieses Übel wird durch eine zu flache Gestalt der Hornhaut oder der Krystalllinse, oder ungewöhnliche Verkürzung des Augapfels, oder verminderte Dichtigkeit der Feuchtigkeiten, u. s. w. hervorgebracht.

Vorzüglich leiden alte Personen an derselben.

Grauer Staar.

§. 2132.

Grauer Staar (*Cataracta, suffusio, hypochyma*) besteht in einer Blindheit, welche von einer Verdunkelung der Krystalllinse oder der Kapsel derselben herrührt.

§. 2133.

Diagnosis. Daseyn eines dunkeln hinter dem Augensterne befindlichen Körpers.

§. 2134.

Den Anfang dieses Übels erkennt man aus dem Nebel vor den Augen, und aus der Dunkelheit des Innern des Auges.

§. 2135.

Den grauen Staar theilt man ein:

1) in **Krystallstaar** (*Cat. crystallina*), wenn blofs die Krystalllinse verdunkelt ist.

2) in häutigen Staar (*C. membranacea*), wenn blofs die Kapsel der Krystalllinse verdunkelt ist.

3) in *Cataracta mixta*, wenn die Krystalllinse und deren Kapsel zugleich verdunkelt sind.

4) in *Cataracta membranacea anterior s. posterior*, wenn blofs die vordere oder hintere Haut der Kapsel verdunkelt ist.

5) in *Cataracta interstitialis*, wenn sich die morgagnische Feuchtigkeit ungewöhnlich angehäuft hat.

6) in Milchstaar (*C. purulenta l. lactea*), wenn sich die Krystalllinse in eine Feuchtigkeit, die einer Milch, oder dem Eiter, oder einer dünnen Gallerte ähnlich sieht, verwandelt hat.

7) in Balgstaar (*C. cystica*), wenn die Kapsel der Krystalllinse einem runden gleichsam wie mit Milch angefüllten Sacke ähnlich sieht.

8) in zitternden Staar, wenn sich die Kapsel der Krystalllinse von der gläsernen Feuchtigkeit so sehr absondert, dafs dieselbe ganz beweglich wird, und bei der geringsten Bewegung des Auges zittert.

9) in Nachstaar (*C. secundaria*), wenn sich nach der Staaroperation die Kapsel der Krystalllinse verdunkelt.

10) in angewachsenen Staar, wenn die Kapsel der Krystalllinse entweder mit der Krystalllinse selbst, oder hinterwärts mit der Haut der gläsernen Feuchtigkeit, oder vorwärts mit der Regenbogenhaut verwachsen ist.

§. 2136.

Den eigentlichen grauen Staar (ächten Staar) muſs man von einer Verdunkelung des Auges (unächten Staar) durch Ansammlung von Eiter in den vordern Augenkammern, oder von einer Verdunklung der Haut der gläsernen Feuchtigkeit (*C. hyaloidea*) wohl unterscheiden.

§. 2137.

Der graue Staar entsteht sehr selten plötzlich, sondern gemeiniglich nur nach und nach, und ist zuweilen mit dem schwarzen Staar verbunden.

§. 2138.

Ursache. Diese besteht in einem Fehler der Mischung und Form der Krystalllinse und deren Kapsel.

§. 2139.

Ursächliche Momente. Wunden, Quetschungen, Verbrennung, Entzündung, schädliche Dämpfe, u. s. w.

§. 2140.

Prognosis. Arzeneimittel richten selten etwas aus, vorzüglich bei einem schon lang gedauerten Staar.

§. 2141.

Curplan. Dieser besteht in dem Gebrauch der Ätzmittel, und in der Operation.

§. 2142.

Innerlich kann man den Sublimat, den Spies-

glanzschwefel, das Extract der schwarzen Küchenschelle, u. a. m. anwenden.

§. 2143.

Die Staaroperation besteht in der Niederdrückung (*depressio*) oder in der Ausziehung (*extractio*) der Krystalllinse. Letztere ist ersterer vorzuziehen.

Grüner Staar.

§. 2144.

Grüner Staar (*Glaucoma*) besteht in einer Blindheit, welche von einer Verdunklung der gläsernen Feuchtigkeit herrührt.

Hier ist die Trübheit tiefer im Auge, als bei dem grauen Staar.

Das Übel ist unheilbar, die Anwendung der Arzeneimittel ist hier unnütz, und eine Operation kann nicht statt finden.

Schwarzer Staar.

§. 2145.

Schwarzer Staar (*Amaurosis, gutta serena*) bestehet in einer Blindheit, welche von Unempfindlichkeit der Netzhaut und von Unthätigkeit des Sehenervens herrührt.

§. 2146.

Diagnosis. Dunkelheit im Innern des Auges wird hier nicht bemerkt, doch ist der Augenstern

gemeiniglich erweitert und seiner Beweglichkeit beraubt.

§. 2147.

Der schwarze Staar entsteht gemeiniglich langsam, öfters tritt er aber auch plötzlich ein. Gewöhnlich befällt er beide Augen zugleich. Demselben gehen oft Vorboten, und zwar ein schwaches Gesicht und Lichtsehen voraus.

§. 2148.

Ursache. Diese besteht bald in einem Fehler der Mischung, bald in einem Fehler der Erregbarkeit.

§. 2149.

Ursächliche Momente. Heftige Erschütterung des Kopfes, Ausschweifungen in der Liebe, heftige Erkältung, Blutflüsse, u. s. w.

§. 2150.

Prognosis. Der schwarze Staar ist gemeiniglich unheilbar. Blofs im Anfange ist noch Hülfe zu erwarten. Ein plötzlich entstandener Staar ist mehrentheils leichter zu heilen, als einer, der allmählig entsteht.

§. 2151.

Curplan. Dieser besteht in dem Gebrauch der Ätzmittel und Reizmittel.

Die Operation findet hier nicht statt.

§. 2152.

Innerlich sind Spiesglanzschwefel, Brechweinstein, Sublimat und Campher anzuwenden.

Überdiefs empfiehlt man noch das Eisenhütlein, die Electricität, den Baldrian, die Wolverleiblumen, den Schierling, die Belladonne, flüchtige Laugensalze, die schwarze Küchenschelle, das weifse Bilsenkrautsextract, u. a. m.

Krankheiten der Thränenwege.

§. 2153.

Hieher gehört vorzüglich die Thränenfistel.

Thränenfistel.

§. 2154.

Thränenfistel (*Fistula lacrymalis*) besteht in einem gehinderten Durchgange der Thränen durch die Thränenwege.

Hier findet eine Verschliefsung des Thränensackes statt.

§. 2155.

Verlauf. Anfangs ist das Übel unschmerzhaft, die Nase trocken, die Haut auf dem Thränensack ungefärbt und unentzündet, und die ausgedrückte Feuchtigkeit klar und ungefärbt.

Hierauf wird der Thränensack schmerzhaft und entzündet, und die ausgedrückte Feuchtigkeit ist trübe, eiterartig, weifslicht oder gelblicht.

Dann wird der Thränensack plötzlich und heftig entzündet, so dafs er zerreifst, worauf die Entzündung verschwindet und die Fistelöffnung zurückbleibt.

Endlich, obwohl selten, kann der Thränensack in Eiterung übergehen, das Nagelbein cariös werden, und der Beinfrafs auch noch die benachbarten Knochen angreifen.

§. 2156.

Curplan. Dieser besteht in dem innern und äufsern Gebrauch reizender und ätzender Mittel, und in der Operation, und zwar in dem Öffnen des Thränensackes.

Krankheiten der Ohrdrüse.

§. 2157.

Die Krankheiten, denen die Ohrdrüse unterworfen ist, sind:

1) Entzündung der Ohrdrüse (§. 702.).
2) Verhärtung der Ohrdrüse (§. 1016. 1017.).
3) Bauerwetzel (§. 483.).
4) Krebs der Ohrdrüse.

Krankheiten der Nase.

§. 2158.

Zu den Krankheiten, denen die Nase unterworfen ist, gehören:

1) Nasenentzündung.

2) Nasengeschwür (§. 2159.).
3) Nasenkrebs.
4) Wunden der Nase.
5) Verschliefsung der Nasenlöcher (§. 2160.).
6) Schnupfen (§. 745.).
7) Nasenpolyp (§. 1561.).
8) Nasenbluten (§. 1394.).
9) Geruchlosigkeit (§. 2161.).

§. 2159.

Gegen ein Nasengeschwür (*Ozoena*) sind äufserlich eine Auflösung des Ätzsteines, Kalkwasser, verdünnter Branntwein, Alaunauflösung und Weiden- oder Eichenrindendecoct zu empfehlen.

§. 2160.

Bei einer Verschliefsung der Nasenlöcher sind dieselben vermittelst einer kleinen Hohlsonde, in welche ein Scalpel eingebracht wird, zu erweitern.

§. 2161.

Geruchlosigkeit oder Mangel des Geruchs (*Anosmia*) entsteht von Nasenpolypen, Nasengeschwüren, Schnupfen, Beinfrafs der Nasenknochen, u. s. w. und erfordert den Gebrauch reizender und ätzender Mittel.

§. 2162.

Die Nasenknochen sind ausgesetzt:
1) dem Beinfrafse (*Caries ossium nasi*).
2) dem Knochenbruche (*Fractura ossium nasi*).

Krankheiten der Kinnlade.

§. 2163.

Zu den Krankheiten, denen die Kinnlade unterworfen ist, gehören:

1) Kinnbackenzwang (§. 1236.).
2) beschwerliches Kauen (§. 2164.).
3) Kinnladenfistel.
4) Entzündung und Eiterung der Oberkinnladenhöhle.
5) Beinbruch der Oberkinnlade (*Fractura ossis Maxillaris superioris*).
6) Beinbruch der Unterkinnlade (*Fractura Maxillae inferioris*).
7) Verrenkung der Unterkinnlade (§. 2165.).

§. 2164.

Beschwerliches Kauen (*Manducatio difficilis*) wird durch Verrenkung der Unterkinnlade, Fractur der Unterkinnlade, cariöse Zähne, u. s. w. erzeugt.

§. 2165.

Die Verrenkung der Unterkinnlade (*Luxatio Maxillae inferioris*) geschieht jederzeit nach vorne, und zwar nur auf einer, oder auf beiden Seiten zugleich.

Bei einer Verrenkung der Unterkinnlade auf einer Seite steht das Kinn schief nach der gesunden

Seite zu, der Mund offen, und die Zähne in einer andern Richtung übereinander.

Bei einer Verrenkung der Unterkinnlade auf beiden Seiten hängt das Kinn gerade herunter, der Mund steht offen, die untersten Zähne stehen weit vor den obersten heraus, die Backen sind ganz platt, das Kauen, Schlucken und Sprechen ist gehindert, und der Speichel läuft häufig aus dem Munde.

Diese Verrenkung entsteht gewöhnlich von starkem Lachen oder Gähnen.

Die Cur besteht in der Wiedereinrichtung der Kinnlade (§. 1784.).

Krankheiten des Mundes.

§. 2166.

Der Mund begreift mehrere Theile unter sich, und zwar die Lippen, das Zahnfleisch, die Zähne, die Zunge, die Speicheldrüsen, den Gaumen, den Zapfen, die Mandeln, und den Schlund.

§. 2167.

Zu den Krankheiten des Mundes überhaupt gehören:

1) Mundfäule (§. 2168.).
2) Schwämmchen, s. Krankh. d. Kinder.
3) Blutspucken (§. 1406.).
4) Geschwulst der innern Theile des Mundes vom Insectenstich (§. 2169.).

§. 2168.

Mundfäule oder Mundkrebs (*Noma*) nennt man ein bösartiges, um sich fressendes Geschwür des Mundes.

Sie zeigt sich anfangs als eine rothgelbe, und etwas harte Blatter an den Lippen und inneren Theilen des Mundes, welche bald schwarz wird. Das Übel greift schnell um sich, so dafs in kurzem Lippen, Backen und Nase abfallen, und selbst die benachbarten Knochen cariös werden.

Hier sind innerlich und äufserlich flüchtige Reizmittel anzuwenden.

Äufserlich sind versüfste Geister, Mohnsafttinctur, u. d. gl. mit Honig vermischt zum Pinseln zu gebrauchen.

§. 2169.

Gegen Geschwulst der inneren Theile des Mundes vom Insectenstich veranlafst, ist Mohnsaft mit fettem Öl vermischt zum Pinseln anzuwenden.

Krankheiten der Lippen.

§. 2170.

Zu den Krankheiten, denen die **Lippen** ausgesetzt sind, gehören:

1) **Ausschlag** an den Lippen.
2) **Wunden** der Lippen.
3) **Spalten** der Lippen (§. 2171.).
4) **Hasenscharte** (§. 2172.).

5) Knoten an der Unterlippe (§. 2173.).
6) Lippengeschwüre.
7) Lippenkrebs.
8) Wasserkrebs der Lippen, s. Krankh. der Kinder.

§. 2171.

Gegen aufgesprungene Lippen ist vorzüglich die Lippenpomade zu empfehlen. Auch kann man warmes Unschlitt anwenden.

§. 2172.

Hasenscharte, Hasenlippe (*Labium leporinum*, *Lagostoma*, *Lagontomum*) nennt man eine länglichte Spalte der Lippe.

Gewöhnlich ist sie an der Oberlippe, und gemeiniglich ein angeborner Fehler. Die Lippe ist bald an einer, bald an zwei Stellen gespalten.

Sie verursacht nicht nur eine Ungestaltheit, sondern auch eine undeutliche Sprache. Der Zahn hinter der Spalte ist unbedeckt, und beim Sprechen fliefst der Speichel aus dem Munde.

Die Heilung besteht in der Operation, und zwar in der Vereinigung der vorher wund gemachten Lippen.

§. 2173.

Kleine, harte, weifse und unschmerzhafte Knoten an der innern Oberfläche der Lippen, vorzüglich der Unterlippe, gemeiniglich von der Gröfse einer Erbse, werden am besten ausgeschält.

Krankheiten der Zähne.

§. 2174.

Zu den Krankheiten, denen die Zähne sind unterworfen, gehören:

1) Zahnschmerz (§. 2175.).
2) Weinstein an den Zähnen (§. 2176.).
3) Verrenkung der Zähne (§. 2177.).
4) Wackeln der Zähne (*Gomphiasis*).
5) Stumpfwerden der Zähne (§. 2178.).
6) Zähneknirschen.
7) Beinfrafs der Zähne (§. 2179.).
8) Zahnfistel (§. 2181.).
9) Übelbefinden beim Zahnen, s. Krankh. d. Kind.

§. 2175.

Zahnschmerz, Zahnweh (*Otontalgia*) veranlassen Beinfrafs der Zähne, Erkältung, hysterische Disposition, u. s. w.

Die Cur besteht in dem innerlichen und äufserlichen Gebrauch der Reizmittel.

Innerlich sind vorzüglich flüchtige Reizmittel, als Opium, Naphte, versüfster Vitriol- Salpeter- oder Salzgeist, Campher und ätherische Öle zu empfehlen.

Äufserlich sind Mohnsaft oder dessen Tinctur, ätherische Öle, Cajeputöl, Zimmtöl, Gewürznelkenöl, Campher, Naphte, versüfster Vitriol - oder Salpetergeist, Weingeist, Branntwein, und Pimpinell-

essenz vermittelst der Baumwolle in den schmerzhaften Zahn zu bringen.

Auch kann man öfters Branntwein, Pimpinellessenz oder versüfsten Vitriolgeist, mit einem Salbei- oder Pfeffermünzenaufgufs vermischt, eine Zeitlang in den Mund nehmen lassen.

Ferner kann man Tabaksrauch oder den Dampf von einem noch ganz warmen Salbei- Pfeffermünzen- Polei - oder Chamillenaufgufs an den leidenden Zahn gehen lassen.

Überdiefs lobt man äufserlich noch den Saft einiger Käfer, die Cantharidentinctur, die Electricität, u. a. m.

Der hohle Zahn kann mit Wachs oder Blei ausgefüllt, oder vermittelst einem glühenden Drahte ausgebrennt werden. Oder man läfst einige Tropfen Vitriolöl in denselben fallen, worauf der Mund dann mit Wasser auszuspülen ist. Oder man läfst ihn herausziehen.

§. 2176.

Weinstein an den Zähnen (*Odontolithos, Tartarus dentium*) nennt man eine steinartige Masse, welche sich an die Zähne ansetzt.

Man schaft denselben weg entweder vermittelst eines Zahnpulvers, welches aus erdigten Substanzen, als Bolus, Catechuerde, Muschelschalen, u. d. gl. besteht, oder vermittelst des behutsamen Wegkratzens mit einem besondern Instrumente.

§. 2177.

Unter Verrenkung der Zähne (*Luxatio Dentium*) versteht man das Heraustreten eines oder mehrerer Zähne aus ihren Zahnhöhlen.

Sie wird durch äufsere Gewaltthätigkeit oder zu grofse Schlaffheit des Zahnfleisches erzeugt.

Der verrenkte Zahn wird nach Umständen entweder wiederum hineingedrückt oder herausgenommen.

§. 2178.

Stumpfwerden der Zähne (*Hebetudo Dentium, Haemodia*) erfolgt gemeiniglich auf den Genufs saurer Speisen und Getränke, der Säuren, und den Gebrauch zusammenziehender Mittel, und ist blofs vorübergehend.

§. 2179.

Beinfrafs der Zähne (*Caries Dentium*) befällt vorzüglich die Backenzähne, und kommt in jüngern Jahren vor, selten im hohen Alter. Gemeiniglich greift er zuerst die Krone an, selten die Wurzel.

Der Beinfrafs der Zähne ist entweder trocken oder feucht. Letzterer ist gefährlicher und greift schneller um sich, als ersterer.

Das Übel zeigt sich zuerst als ein gelber oder schwarzer Fleck an der Oberfläche der Zähne.

Der Beinfrafs der Zähne giebt nicht nur zu Zahnschmerzen Anlafs, sondern erzeugt öfters auch Zahnfisteln, Geschwulst, Entzündung und Eiterung des Zahnfleisches, ja greift sogar die Kinnlade an.

Die zu diesem Übel Anlafs gebenden Schädlichkeiten sind Erkältung der Zähne, metallene Zahnstocher, Säuren, u. a. m.

Gegen den Beinfrafs der Zähne ist der äufsere Gebrauch des Nelkenöls, oder die Ausbrennung derselben vermittelst eines glühenden Drahtes, oder die Ausziehung derselben zu empfehlen.

§. 2180.

Die Ausziehung der Zähne geschieht vermittelst des Geifsfufses, des Pelikans, des englischen Schlüssels, des Überwurfes und der Zahnzangen.

§. 2181.

Die Zahnfistel (*Fistula dentis*) kömmt häufiger an der obern, als an der untern Kinnlade vor, wird gewöhnlich von einem cariösen Zahne veranlafst, und erfordert die Herausziehung desselben.

Krankheiten des Zahnfleisches.

§. 2182.

Zu den Krankheiten, denen das Zahnfleisch unterworfen ist, gehören:

1) Entzündung und Geschwulst des Zahnfleisches (*Parulis*, §. 493.).
2) Zahnfleischgewächs (*Epulis*, §. 2183.).
3) hartes Zahnfleischgewächs (*Sclirosarcoma*).

4) örtliche Absterbung des Zahnfleisches (§. 2184.).

5) schwammiges Zahnfleisch (§. 2185.).

§. 2183.

Gegen das Zahnfleischgewächs ist die Ausschälung der Geschwulst vermittelst des Messers, die Unterbindung und das glühende Eisen anzuwenden.

§. 2184.

Die örtliche Absterbung (Brand) am Zahnfleische befällt Kinder häufiger, als Erwachsene, und fängt sich gemeiniglich mit einer ungewöhnlichen Röthe des Zahnfleisches, der innern Seite der Backen, der Zunge und der Lippen an, wobei ein Brennen empfunden wird.

Hierauf entsteht ein weifser Fleck, der sich bald absondert, und ein bösartiges, sehr stinkendes Geschwür hinterläfst, das um sich greift, Zunge, Backen, u. s. w. zerstört, und in kurzem den Tod verursacht.

Die Cur s. §. 2168.

§. 2185.

Bei schwammichtem, aufgetriebenem und leicht blutendem Zahnfleische oder sogenanntem Scorbut des Zahnfleisches (*Stomacace*) sind aufser dem Gebrauch innerer Mittel (§. 997. 998.) äufserlich noch das Pinseln mit Myrrhenessenz oder Catechuerden - Japanischer Erden - oder Lacktinctur mit Rosenhonig vermischt (§. 1002.) anzuwenden.

Krankheiten der Speicheldrüsen.

§. 2186.

Zu den Krankheiten, denen die Speicheldrüsen unterworfen sind, gehören:

1) Speichelfluſs (§. 2187.).
2) Speichelfistel (§. 2188.).

§. 2187.

Speichelfluſs (*Salivatio, Sialogia, Ptyalismus*) entsteht vom Miſsbrauch des Quecksilbers, bei Würmern im Darmkanale, bei den Pocken, vom Kauen scharfer Substanzen, z. B. des Tabaks, des Bertrams, u. s. w.

Hier ist der innerliche und äuſserliche Gebrauch der Reizmittel angezeigt.

Innerlich sind Campher, Opium, Quaſsie, Salbei, u. d. gl. zu empfehlen.

Äuſserlich kann man Gurgelwasser von Salbei- Schafgarben - Pfeffermünzen - Poleiaufguſs oder von Simarouben - Weidenrindendecoct anwenden.

§. 2188.

Die Speichelfistel (*Fistula salivalis*) zeigt sich als eine ungewöhnliche Öffnung an den Backen, aus welcher, vorzüglich beim Kauen und Sprechen, beständig Speichel ausflieſst.

Sie entsteht von einer Verletzung der Ohrdrüse oder des Stenonischen Ganges.

Durch dieses Übel wird nicht nur die Verdauung gestört, sondern auch Abzehrung erzeugt.

Die Heilung geschieht gemeiniglich vermittelst der Compression. Zuweilen wendet man auch äuserlich zusammenziehende Mittel an.

Im Fall, dafs der Speichelgang verschlossen ist, so mufs man denselben wiederum herstellen, oder vermittelst eines Troikars einen neuen bohren.

Krankheiten der Zunge.

§. 2189.

Die Krankheiten, denen die Zunge ausgesetzt ist, sind:

1) Zungenentzündung (§. 501.).
2) Zungengeschwür.
3) Balggeschwulst der Zunge.
4) Fröschleingeschwulst, s. Krankh. der Kinder.
5) Zungenkrebs (§. 2190.).
6) Schwämmchen, s. Krankh. d. Kind.
7) Wunden der Zunge.
8) Umwälzung der Zunge (*Glossocoma*, *Glossocele*, *Paraglosse*).
9) Zungenschmerz (*Glossagra*).
10) Lähmung der Zunge (§. 2191.).
11) angewachsene Zunge, s. Krankh. der Kinder.
12) Geschmacklosigkeit (*Ageustia*).
13) Sprachlosigkeit (*Aphonia*, *mutitas*).

§. 2190.

Zungenkrebs (*Cancer linguae*) zeigt sich anfangs als eine kleine Härte an der Zunge, welche bald höckerig, schmerzhaft und gröfser wird, worauf Risse entstehen, und es erfolgt nun ein Geschwür mit harten Rändern.

Hier ist die Operation und zwar das Wegschneiden des krebshaften Theils angezeigt.

§. 2191.

Gegen Lähmung der Zunge sind ätherische Öle, vorzüglich Cajeputöl und Pfeffermünzenöl, oder Naphte auf die Zunge zu tröpfeln, oder starke Gewürze, Cubeben, Pfeffer, Bertramwurzel, u. d. gl. zu kauen.

§. 2192.

Das Zungenbein ist zuweilen der Verschiebung (*Luxatio ossis hyoides*) unterworfen, wodurch das Athemholen und Sprechen erschwert, und das Schlingen gänzlich verhindert wird.

Die Cur besteht hier in der Zurückbringung des Zungenbeins.

Krankheiten des Gaumens.

§. 2193.

Zu den Krankheiten, denen der Gaumen unterworfen ist, gehören:

1) Entzündung des Gaumens (§. 507.).

2) Geschwüre des Gaumens.
3) venerische Geschwüre des Gaumens.
4) Geschwülste des Gaumens.

Krankheiten des Zapfens.

§. 2194.

Der Zapfen ist folgenden Krankheiten unterworfen:

1) Entzündung des Zapfens (§. 507.).
2) Krebs des Zapfens.
3) Schliefsen des Zapfens (*Procidentia uvulae, Hypostaphyle*, §. 512.).

Krankheiten der Mandeln.

§. 2195.

Folgenden Krankheiten sind die Mandeln ausgesetzt:

1) Mandelnentzündung (§. 513.).
2) verhärtete Mandeln (§. 2196.).

§. 2196.

Bei verhärteten und scirrhösen Mandeln ist das Wegnehmen derselben vermittelst des Schnittes angezeigt. Die Abbindung ist hier von geringerem Nutzen.

Krankheiten des Rachens.

§. 2197.

Zu den Krankheiten des Rachens gehören:

1) Rachenentzündung (§. 1531.).
2) Krampf des Rachens (§. 2198.).
3) Lähmung eines Theiles des Rachens (§. 2198.).
4) Wasserscheu (§. 2199.).
5) Übelbefinden von fremden im Rachen stecken gebliebenen Körpern (§. 1854.).
6) gehindertes Schlingen (§. 2200.).

§. 2198.

Bei Lähmung oder krampfhafter Verengerung des Rachens und der Speiseröhre gehen die verschluckten Speisen bis an den leidenden Theil, wo sie dann liegen bleiben oder sogleich wieder ausgeworfen werden.

Innerlich sind Naphte, Mohnsaftstinctur, u. s. w. anzuwenden.

Äufserlich sind reizende Linimente, (s. Form. N. 7. 8. 33. 34.) und ätherische Öle in den Hals einzureiben.

§. 2199.

Wasserscheu (*Hydrophobia*) besteht in einem Abscheu gegen alle wäfsrige Getränke.

Sie ist entweder Folge des Bisses toller Hunde (§. 1919.), oder gesellt sich zu andern Formen des Übelbefindens, z. B. zu heftigen Fiebern, Entzündungen, u. s. w.

§. 2200.

Gehindertes oder beschwerliches Schlingen (*Deglutitio impedita s. difficilis, Dyspha-*

gia) wird veranlafst durch Rachen - und Speiseröhrenentzündung, Lähmung der Speiseröhre, Verengerung des Rachens oder der Speiseröhre durch Geschwülste, Polypen, Krampf, fremde in dem Schlunde stecken gebliebene Körper, u. s. w.

Krankheiten des Halses.

§. 2201.

Innerhalb des Halses liegen die Schilddrüfse, Speiseröhre und Luftröhre, welche auch mancherlei Krankheiten unterworfen sind.

§. 2202.

Zu den Krankheiten des Halses gehören:

1) Kinnflechte (§. 846.).
2) Krummer Hals (§. 2203.).
3) Wunden des Halses.
4) Kropf (§. 2204.).
5) Halsweh (§. 490.).

§. 2203.

Krummer, schiefer oder steifer Hals (*Collum obstipum*, *Cervix obstipa*) entsteht von einer Verkürzung der äufsern Haut der einen oder der andern Seite des Halses durch Narben nach Verbrennungen, Geschwüren, u. d. gl. erzeugt, oder von einem Krampfe der Halsmuskeln durch Erkältung, u. d. gl. veranlafst, u. s. w.

Die Verkürzung der Haut wird vermittelst der Operation gehoben.

§. 2204.

Kropf (*Struma*, *Bronchocele*) besteht in einer besonderen Anschwellung des vordern Theiles des Halses, welche anfangs beweglich und schwammicht ist, und dem Drucke des Fingers nachgiebt, in der Folge aber härter und beinahe knorpelartig wird.

Von ihm mufs man aber die Geschwulst der Schilddrüse unterscheiden.

Der Kropf ist gewöhnlich endemisch, und kömmt vorzüglich in Tyrol, in der Schweiz, u. s. w. vor. Er herrscht gewöhnlich nur unter Menschen aus der niedern Volksclasse, und befällt vorzüglich das weibliche Geschlecht.

Die Veranlassung hierzu suchen einige in dem Schnee- oder Eiswasser, andere in starker Anstrengung, z. B. beim Tragen auf dem Kopfe, bei der Geburt, u. s. w.

Die Cur besteht in der Anwendung der Ätzmittel.

Innerlich empfiehlt man vorzüglich den gebrannten Meerschwamm zu einem Scrupel mit Zimmtrinde vermischt. Auch sind hier Spiefsglanzmittel angezeigt. Überdiefs lobt man noch die Schwefelleber, den rothen Fingerhut, calcinirte Eierschalen, Schierling, fixe Laugensalze, u. a. m.

Äufserlich sind Bleiwasser, flüchtiges Liniment

(s. Form. N. 8.), der Saft des rothen Fingerhuts, u. a. m. anzuwenden.

Die Operation ist hier äufserst gefährlich.

Krankheiten der Luftröhre.

§. 2205.

Zu den Krankheiten der Luftröhre gehören:

1) Luftröhrenentzündung (§. 521.).
2) Eiterung der Luftröhre (*Phthisis trachealis*).
3) Wunden der Luftröhre.
4) Erstickungsgefahr von fremden in der Luftröhre stecken gebliebenen Körpern (§. 1854.).

Krankheiten der Speiseröhre.

§. 2206.

Zu den Krankheiten, denen die Speiseröhre unterworfen ist, gehören:

1) Speiseröhrenentzündung (§. 531.).
2) Krampf der Speiseröhre (§. 2198.).
3) Lähmung eines Theiles der Speiseröhre (§. 2198).
4) Polyp in der Speiseröhre.
5) Übelbefinden von fremden in der Speiseröhre stecken gebliebenen Körpern (§. 1854.).
6) Wunden der Speiseröhre.

Krankheiten der Brust.

§. 2207.

Die Brust enthält mancherlei Organe, und zwar die zum Athemholen dienlichen Organe (Respirationsorgane), das Brustbein, die Rippen, die Lunge, das Rippenfell, Mittelfell, den Herzbeutel, das Herz, den Brustkanal und das Zwergfell.

§. 2208.

Zu den Krankheiten der Brust gehören:

1) Brustwassersucht (§. 1639.).
2) Wunden der Brust.
3) Blutergiefsung in die Brusthöhle (§. 2210.).
4) Eiterbrust (§. 547. 553.).

§. 2209.

Bei jeder Brustkrankheit leidet das Athemholen mehr oder weniger, ist beschwerlich und ängstlich, es sind mehr oder weniger Schmerzen in der Brust vorhanden, es findet eine Beklemmung, Angst, Husten, u. s. w. statt.

§. 2210.

Eine Ergiefsung des Blutes in die Brusthöhle nach vorhergegangener Verletzung der Blutgefäfse erkennt man aus plötzlich eingetretener Schwäche, schwachem Pulse, Neigung zu Ohnmachten,

blasser Gesichtsfarbe, beschwerlichem Athemholen, kalten Gliedmafsen, Druck und Schwere in der Brust und Unvermögen auf dem Rücken zu liegen.

Die Ausleerung des Bluts geschieht entweder durch Erweiterung der Wunde oder eine künstliche Öffnung der Brust.

Krankheiten der Respirationsorgane.

§. 2211.

Hieher gehören:

1) Angst (§. 2212.).
2) Engbrüstigkeit (§. 2219.).
3) Athemlosigkeit (*Apnoea.*).
4) Alp (§. 2214.).
5) Catarrh (§. 741.).
6) Stickfluſs (§. 2217.).
7) Schluchzen (§. 2216.).
8) Heftiges Niesen (§. 2213.).
9) Husten (§. 2218.).
10) Heiserkeit (§. 2215.).

§. 2212.

Angst (*anxietas*) zeigt gestörten Blutumlauf an, und ist nicht nur ein Symptom der Brustkrankheiten, als der Lungenentzündung, Brustwassersucht, u. d. gl. sondern wird auch bei Fiebern, Entzündungen des Zwergfells, des Magens, der Leber, der Gedärme, u. s. w. beim Friesel, bei der Hysterie, u. a. m. gefunden.

§. 2213.

Niesen (*sternutatio*), welches in einem auf ein tiefes Einathmen erfolgten heftigen Ausathmen besteht, wobei die ausgeathmete Luft durch die Nasenlöcher mit Geräusch herausgeht, wird durch stark reizende, die Nasenlöcher berührende Substanzen, Dämpfe, u. d. gl. hervorgebracht, ist ein Symptom des Catarrhes, und gesellt sich öfters zu heftigen Fiebern.

Bei zu heftigem und anhaltendem Niesen ist innerlich Mohnsaft, und äufserlich das Einziehen von Dämpfen gewürzhafter Kräuter in die Nasenlöcher zu empfehlen.

§. 2214.

Alp, Alpdrücken (*Incubus*) ist ein mit grofser Angst und Beklemmung verbundenes Gefühl von Zusammendrückung der Brust während des Schlafes.

Es erfolgt öfters beim Liegen auf dem Rücken. Nach dem Anfalle ist der Kranke ermattet.

Dieser Zufall wird durch das Liegen auf der Seite vermieden.

§. 2215.

Heiserkeit (*Raucitas*, *raucedo*) entsteht von anhaltendem Sprechen, von Erkältung, u. d. gl. oder ist Symptom der Catarrhe, Schwindsucht, heftiger Fieber, u. s. w.

Das Übel hat seinen Sitz in der Luftröhre, wovon Trockenheit derselben die Folge ist.

Reizmittel, vorzüglich Chamille, Pfeffermünze, Campher, Mohnsaft, versüfster Vitriolgeist, u. d. gl. sind hier anzuwenden.

§. 2216.

Schluchzen (*Singultus*), welches in einem kurzen, mit Geräusch verbundenen Einathmen besteht, wird von Erkältung, Entkräftung des Körpers, zu geschwindem Essen und Trinken, Überladung des Magens, u. d. gl. hervorgebracht, oder gesellt sich zu Magenentzündung, Zwergfellsentzündung, Darmentzündung, Leberentzündung, Fiebern, u. s. w.

Oft ist er ein Vorbote des herannahenden Todes.

Der Curplan besteht hier in dem innerlichen und äufserlichen Gebrauch der Reizmittel.

Innerlich sind Mohnsaft, versüfster Vitriolgeist oder ätherische Öle anzuwenden, und äufserlich ätherische Öle, Muscatennufsöl und reizende Linimente und Salben (s. Form. N. 7. 8. 33.) einzureiben.

§. 2217.

Stickfluſs (*Catarrhus suffocativus*) besteht in einer Störung des Athemholens, mit grofser Beklemmung, Husten, Röcheln und Angst verbunden.

Er erfordert den reizenden Curplan, vorzüglich Mohnsaft, Campher, Vitriolæther und Salmiakgeist.

Die Kinder sind demselben vorzüglich ausgesetzt, s. Krankh. der Kinder.

§. 2218.

Husten (*Tussis*), welcher in einem auf ein tiefes Einathmen erfolgten heftigen Ausathmen besteht, wobei die ausgeathmete Luft durch den Mund

mit Geräusch herausgeht, ist entweder mit Auswurf verbunden (feuchter Husten), oder ohne Auswurf (trockner Husten).

Man theilt den Husten ein in Catarrhhusten, Magenhusten, Keichhusten (s. Krankheiten der Kind.), Krampfhusten, u. s. w.

Er entsteht nach Erkältung, zu schnellem Essen oder Trinken, u. s. w. oder gesellt sich zu andern Formen des Übelbefindens, als zu Catarrhen - Luftröhren - und Lungenentzündung, Lungensucht, hectischen Fiebern, Brustwassersucht, u. a. m.

Hier ist der reizende Curplan angezeigt. Vorzüglich sind Mohnsaft, Bilsenkrautsextract, versüfster Vitriol - Salpeter - oder Salzgeist, ätherische Öle, Cajeputöl, Fenchelsamen, Baldrian, Chamille, Schafgarbe, Polei, Wolverleiblumen, u. a. m. zu empfehlen.

§. 2219.

Engbrüstigkeit, Dampf (*Asthma*) ist ein anhaltend beschwerliches, mit Beklemmung verbundenes Athemholen.

Man theilt die Engbrüstigkeit ein:

1) in *Dyspnoea*, wenn sie sich zu Fiebern gesellt.

2) in *Orthopnoea*, wenn der Kranke nur in einer aufrecht sitzenden Stellung athmen kann.

3) in *Asthma sibilans*, wenn das Athemholen mit Geräusch verbunden ist.

4) in *Catarrhus suffocativus*, wenn der Kranke der Erstickungsgefahr ausgesetzt ist (§. 2217.).

Überdiefs unterscheidet man noch das *Asthma humidum* und *siccum*, *Asthma spasticum s. convulsivum*, u. s. w.

Bei einem hohen Grade des Übels werden die Augen aus ihren Höhlen hervorgedrängt, es erfolgen kalte Schweifse, der Puls wird unregelmäfsig, der Kranke ist in Gefahr zu ersticken; und endlich erfolgt Erstickung, Schlagfluís, Wassersucht oder Lähmung.

Das Übel wird erzeugt durch fehlerhaften und engen Bau der Brust, Brustwassersucht, Eiterbrust, Herzpolypen, Anfüllung der Lungen mit Staub, bleiische und arsenikalische Dämpfe und Dünste, Zusammendrückung der Luftröhre durch Geschwülste, Bauchwassersucht, Trommelsucht, Ausdehnung der Gebärmutter während der Schwangerschaft, Blähungen, zu grofse Fettigkeit, starke Erkältung, u. s. w.

Die Engbrüstigkeit ist entweder als Symptom anderer Formen des Übelbefindens zu betrachten, und dann erfordert es eben keine besondere Behandlung; oder es ist als eine Form des Übelbefindens für sich zu betrachten, und daun ist der reizende Curplan, vorzüglich Mohnsaft, versüfster Vitriol- Salpeter - oder Salzgeist, Salmiakgeist, Pimpinellessenz, geistiges Pfeffermünzenwasser, flüchtige Laugensalze, u. d. gl. anzuwenden.

Krankheiten des Brustbeins.

§. 2220.

Zu den Krankheiten des Brustbeins gehören:

1) Beinbruch des Brustbeins (§. 2221.).
2) Beinfrafs des Brustbeins.
3) Fistel des Brustbeins.

§. 2221.

Der Beinbruch des Brustbeins (*Fractura Sterni*) ist jederzeit gefährlich, erzeugt Blutspeien, Engbrüstigkeit, u. s. w. und ist durch die Wiederaufhebung des gebrochenen Knochenstückes zu heben.

Krankheiten der Rippen.

§. 2222.

Krankheiten der Rippen sind:

1) Beinbruch der Rippen (§. 2223.).
2) Verrenkung der Rippen.

§. 2223.

Der Beinbruch der Rippen (*Fractura Costarum*) ist jederzeit bedenklich, verursacht Entzündung der Lunge und des Rippenfells, Husten, u. s. w. und wird durch die Wiedereinrichtung gehoben.

Krankheiten der Brüste.

§. 2224.

Diese werden bei den Krankheiten der Weiber abgehandelt. Hieher gehören:

1) Entzündung der Brüste.
2) Geschwulst, Knoten der Brüste.
3) Eiterung oder Abscefs der Brüste.
4) Scirrhus und Krebs der Brüste.
5) entzündete und wunde Brustwarzen.
6) Quetschung der Brüste.

Krankheiten der Lunge.

§. 2225.

Zu den Krankheiten, denen die Lunge unterworfen ist, gehören:

1) Lungenentzündung (§. 539.).
2) Lungenabscefs (§. 544.).
3) Eitersack der Lungen (§. 546.).
4) Lungensucht (§. 1030.).
5) Lungenknoten (*nodi l. tubercula pulmonum*).
6) Lungencatarrh (§. 745.).
7) Lungenwassersucht (§. 1640.).
8) Wunden der Lunge.
9) Blutfluſs aus der Lunge (§. 1412).

Krankheiten des Herzbeutels.

§. 2226.

Krankheiten des Herzbeutels sind:

1) Herzbeutelsentzündung (§. 560.).
2) Wassersucht des Herzbeutels (§. 1640.).

Krankheiten des Herzens.

§. 2227.

Die Krankheiten, denen das Herz unterworfen ist, sind:

1) Herzentzündung (§. 555.).
2) Herzpolyp (§. 2228.).
3) Herzzittern (§. 2229.).

§. 2228.

Das Daseyn eines Herzpolypen (*Polypus cordis*) ist schwerlich zu erkennen. Beschwerliches Athemholen, Herzzittern, irregulärer Puls, Angst und häufige Ohnmachten lassen auf einen solchen schliefsen. Er ist unheilbar.

Eben diefs gilt auch von Pulsadergeschwülsten der Aorta, oder anderer grofsen Blutgefäfse.

§. 2229.

Herzzittern, Herzklopfen (*Palpitatio cordis*) besteht in einer ungewöhnlich starken Bewegung des Herzens.

Es wird durch Herzpolypen, Verhärtung der Herzklappen, hysterische Disposition, Blähungen, Gemüthsaffekte, u. s. w. hervorgebracht. Auch gesellt es sich zur Brustwassersucht, Herzentzündung, Herzbeutelsentzündung, u. a. m.

Von Fehlern des Herzens entstanden, ist das Übel unheilbar. Sonst sind Reizmittel angezeigt, vorzüglich Mohnsaft.

Krankheiten des Zwergfells.

§. 2230.

Das Zwergfell ist einigen Krankheiten unterworfen, und zwar:

1) Zwergfellsentzündung (§. 564.).
2) Wunden des Zwergfells.
3) Krampf des Zwergfells.

Krankheiten des Rückgrats.

§. 2231.

Zu den Krankheiten, denen das Rückgrat unterworfen ist, gehören:

1) Beinbruch der Wirbelbeine des Rückgrats (*Fractura vertebrarum Spinae dorsi*).
2) Verrenkung der Wirbelbeine des Rückgrats (§. 2232. 2233. 2234.).
3) Krümmung des Rückgrats (§2235.).
4) Rückendarre (§. 1025).
5) Rückenschmerz.

6) Rückenkrampf (§. 1236.).
7) Rückenmarksentzündung (§. 451.).
8) Rückenspalte, s. Krankh. der Kinder.
9) Beinfrafs der Wirbelbeine (§. 2236.).
10) Rückengewächs (§. 2237.).

§. 2232.

Die Verrenkung der Halswirbelbeine (*Luxatio vertebrarum colli*) erkennt man an der Beweglichkeit des Kopfes nach allen Seiten, und an der Hervorragung oder Vertiefung im Nacken längst den Wirbelbeinen des Halses. Dabei ist das Gesicht aufgetrieben, die Augen aus ihren Höhlen herausgetreten, der Mund offen, die Zunge unbeweglich, u. s. w.

Diese Verrenkung ist gemeiniglich tödlich. Sie erfordert die Wiedereinrichtung (§. 1284.).

§. 2233.

Die Verrenkung der Wirbelbeine des Rückgrats (*Luxatio vertebrarum Spinae dorsi*) erkennt man aus der schiefen Richtung des Oberleibes und an der Hervorragung oder Vertiefung am Rückgrate.

§. 2234.

Die Verrenkung des Schwanzbeins (*Luxatio ossis Coccygis*) entsteht nach einem harten Fall oder bei schweren Geburten, geschieht entweder einwärts oder auswärts, und erfordert die Wiedereinrichtung (§. 1284.).

§. 2235.

Krümmung des Rückgrats, Höcker, Buckel (*Gibber*, *Gibbositas*) theilt man ein:

1) in *Lordosis l. repanditas*, wenn die Krümmung nach innen oder nach vorne ist.

2) in *Cyphosis l. gibberositas*, wenn die Krümmung nach hinten oder nach aufsen ist.

3) in *Scoliosis l. obstipitas*, wenn die Krümmung zur Seite ist.

Das Übel entsteht gemeiniglich in der Kindheit, und zwar nach einem Stofs oder Fall, unrechter Behandlung der Kinder, nach der englischen Krankheit, u. s. w.

Dadurch entsteht Ungestaltheit des Körpers, beschwerliches Athemholen, Husten, u. d. gl.

Ist das Übel alt, so ist wenig Hülfe mehr zu erwarten. Ist es aber erst kürzlich entstanden, so sind äufserlich erschlaffende Salben, und Maschinen anzuwenden.

§. 2236.

Beinfrafs der Wirbelbeine (*Caries vertebrarum*) erkennt man aus dem Schmerz, welcher beim Druck stärker wird, und aus der Anschwellung der Wirbelbeine. Hierzu gesellen sich endlich Krümmung des Rückgrats und Lähmung der untern Gliedmafsen.

Das Übel ist sehr bedenklich, schwer zu heilen, und erfordert den innerlichen und äufserlichen Gebrauch der Reizmittel.

§. 2237.

Rückengewächs (*Nata*) ist eine Balggeschwulst auf dem Rücken, die an einem kleinen und dünnen Stiele sitzt, zuweilen die Gröfse einer Melone erreicht, und durch den Schnitt, oder durch die Abbindung ausgerottet wird.

Krankheiten des Unterleibes.

§. 2238.

Der Unterleib enthält mancherlei Organe in sich, als die Verdauungsorgane, und zwar den Magen, den Darmkanal, die Leber, Milz, Gallenblase, Magendrüse und Gekrösdrüsen, die Urinwege, und zwar die Nieren, Harnblase und Harnröhre, und endlich die Zeugungstheile, als die Gebärmutter, Mutterscheide, Samenbläschen, u. s. w.

§. 2239.

Zu den Krankheiten des Unterleibes gehören:

1) Wunden des Unterleibes (§. 2241.).
2) Bauchfellsentzündung (§. 613.).
3) Wassersucht des Bauchfells (§. 1634.).
4) Abscefs am Unterleibe.
5) Bauchbruch (§. 1703.).
6) Nabelbruch (§. 1703.).
7) Blutnabelbruch (*Haematomphalus*), d. i. eine von ausgetretenem Blute entstandene Geschwulst des Nabels.

8) Nabelgeschwulst (*Exomphalus*).

9) Nabelfleischgewächs (*Sarcomphalus*), d. i. aus dem Nabel herausgewachsenes schwammiges Fleisch.

10) Nabelgeschwür (*Embyomphalus*).

11) Lendenmuskelsentzündung (§. 630. 2242.).

12) Lendenabscefs (*Abscessus lumbalis*, §. 632. 635.).

13) Leistenbeule (§. 709. 1117. 2243.).

14) Leistenbruch (§. 1703. 2243. 1722.).

15) Schenkelbruch (§. 1703. 2243.).

16) Mittelfleischbruch (§. 1703.).

17) Bruch des eiförmigen Loches (§. 1703.).

§. 2240.

Hieher gehören ferner:

1) Bauchwassersucht (§. 1623.).

2) Trommelsucht (§. 1655.).

3) Netzbruch (§. 1704. 1698. 1714. 1717. 1718.).

4) Netzentzündung (§. 626.).

5) Gekrösentzündung (§. 626.).

6) Magendrüsenentzündung (§. 610.).

§. 2241.

Bei beträchtlichen Wunden des Unterleibes werden die herausgetretenen Theile wiederum zurückgebracht, und die verwundeten Theile vermittelst der Heftpflaster und der vereinigenden Binde; oder durch die blutige Nath vereiniget.

§. 2242.

Die Lendenmuskelsentzündung (§. 630.) wird oft mit dem Lendenweh oder der Nierenentzündung verwechselt. Sie unterscheidet sich aber von denselben dadurch, dafs bei ihr weder die Ausleerung des Stuhls noch des Urins gehindert ist.

§. 2243.

Die Leistenbeule (§. 709. 1117.) unterscheidet sich von dem Leistenbruche und Schenkelbruche dadurch:

1) Die Leistenbeule ist hart, schmerzt bei der Berührung, und weicht dem Drucke nicht; der Bruch aber ist weich, schmerzt nicht bei der Berührung, und läfst sich wiederum in den Leib zurückdrücken.

2) Die Leistenbeule schwillt allmählig an und langsam; der Bruch hingegen entsteht gemeiniglich plötzlich und von beträchtlicher Gröfse, und nach irgend einer starken Anstrengung.

3) Beim Husten oder zurückgehaltenen Athem schwillt der Bruch stärker an, die Leistenbeule aber nicht.

5) Mit dem Bruche sind mehr oder weniger Coliken, Verstopfung des Stuhlganges, u. d. gl. verbunden, mit der Leistenbeule aber nicht.

Krankheiten des Magens.

§. 2244.

Der Magen ist mancherlei Krankheiten unterworfen, und zwar:

1) Magenentzündung (§. 570. 2248.).
2) Magenverhärtung (§. 2249.).
3) Wunden des Magens (§. 2250.).
4) Magenschmerz (§. 2258.).
5) Sodbrennen (§. 2251.).
6) Auftreibung des Magens (§. 2252.).
7) Magendrücken von Unverdaulichkeit (§. 2253.).
8) Blutfluſs aus dem Magen (§. 1419.).
9) geschwächte Verdauung (§. 2254.).
10) Würmer im Magen (§. 2282).
11) Mangel des Appetits (§. 2255.).
12) verdorbener Appetit (§. 2257.).
13) Gefräſsigkeit (§. 2256.).
14) Zu heftiger Durst (*Polydipsia*).
15) Ekel (§. 2265.).
16) Erbrechen (§. 2264.).
17) Magenschwäche (§. 2247.).

§. 2245.

Die Annahme sogenannter Schärfen und Unreinigkeiten im Magen, als Galle, Schleim, Säure,

u. d. gl. ist grundlos und unerwiesen; und die Ausführung derselben durch Brechmittel, ist irrig und precär.

§. 2246.

Der Curplan gegen Fehler des Magens ist jederzeit reizend. Vorzüglich sind gewürzhafte und bittere Reizmittel angezeigt.

§. 2247.

Gegen Magenschwäche sind vorzüglich gewürzhafte und bittere Reizmittel, bittere Extracte in Wasser oder Wein aufgelöfst, Wermuth, Quafsie, Colombo, Enzian, Zimmt, Calmus, Pomeranzenschale, Pfeffer, Ingber, Muscatennufs, Pfeffermünze, Fenchel, Kümmel, Anis, Gewürznelken, Polei, Wein, Zimmttinctur, Colombotinctur, Pomeranzen-Enzian - Wermuth - Bitterklee - Calmusessenz, geistiges Zimmt - und Pfeffermünzenwasser, Zimmt - oder Pfeffermünzenöl, Naphte, und versüfster Vitriol - Salpeter - oder Salzgeist zu empfehlen.

§. 2248.

Die Magenentzündung (§. 570.) wird oft mit dem Magenkrampf, der Leberentzündung oder der Cholera verwechselt.

§. 2249.

Die Magenverhärtung (§. 572.) erkennt man aus einem schmerzhaften Drücken in der Magengegend, und aus der Beängstigung, welche nach

dem Genuſs der Speisen, vorzüglich säuerlicher Art und des Obstes, erfolgt, und so lange dauert, bis alles Genossene wiederum ausgebrochen ist. Dabei ist Unverdaulichkeit, Mangel an Appetit, Verstopfung des Stuhlganges und Abzehrung.

Das Übel wird durch Erkältung, Mifsbrauch geistiger Getränke oder der Säuren, Traurigkeit, u. s. w. erzeugt.

Hülfe ist hier selten zu erwarten.

Der Curplan besteht in dem Gebrauch reizender und ätzender Mittel, vorzüglich des Sublimats, Spiesglanzschwefels, Mohnsaftes, u. a. m.

§. 2250.

Wunden des Magens sind an dem blutigen Erbrechen und an dem Ausflusse unverdauter Speisen aus der Wunde erkennbar.

§. 2251.

Sodbrennen (*Soda, ardor ventriculi*) besteht in einem Gefühl von Brennen im Magen und Schlunde, mit Ekel, Aufsteigen, ranzigtem Geschmacke, Durste, Mangel an Appetit und Angst verbunden.

Es entsteht nach dem Genuſs verdorbener Nahrungsmittel, Mifsbrauch fetter Speisen, u. s. w.

Gewürzhafte und bittere Reizmittel, vorzüglich Calmus, Pomeranzenschale, bittere Extracte, Pomeranzen - Wermuth - Calmus - Bitterklee - und Enzianessenz sind hier sehr zu empfehlen.

§. 2252.

Auftreibung des Magens von Blähungen (*Inflatio ventriculi*), Vapeurs, wodurch kurzer Athem, Herzklopfen, Kopfschmerzen, Aufstofsen (*ructus*) u. d. gl. erzeugt wird, wird durch Entwickelung fixer Luft im Magen hervorgebracht, wozu Magenschwäche, der Genufs blähender Speisen, u. s. w. Veranlassung geben.

Gewürzhafte Reizmittel, vorzüglich Calmus, Pfeffer, Pomeranzenschale, Gewürznelken, Cardamomen, Muscatennufs, Fenchel, Anis, Kümmel, Zimmt, Pfeffermünze und deren ätherisches Öl sind hier zu empfehlen.

§. 2253.

Magendrücken von Unverdaulichkeit erfordert anfangs ein Brechmittel aus Ipecacuanha, und dann den Gebrauch bitterer Extracte oder der Pomeranzenschale, und des Calmus, oder der Wermuth - Bitterklee - Enzian - Calmus - und Pomeranzenessenz.

§. 2254.

Geschwächte Verdauung (*Concoctio debilis*) theilt man ein:

1) in *Apepsia*, wo die Verdauungskraft sehr geschwächt ist.

2) in *Dyspepsia*, wenn die Verdauung langsam und mit Mühe vor sich geht.

Die Ursache besteht in einer Magenschwäche, wozu Traurigkeit, anhaltendes Nachtwachen, Sorgen,

Kummer, anhaltendes Denken, Mifsbrauch der Brechmittel, Ausschweifung in der Liebe, u. s. w. Gelegenheit geben.

Die Cur s. §. 2247.

§. 2255.

Mangel an Appetit (*Anorexia*) wird durch Magenschwäche, Magenverhärtung, Mifsbrauch geistiger Getränke, u. d gl. erzeugt, oder gesellt sich zu andern Formen des Übelbefindens, als zu Fiebern, Catarrhen, Sodbrennen, u. s. w.

Hier sind vorzüglich bittere Extracte in Wein aufgelöfst, und Pomeranzen- Wermuth- Bitterklee- oder Enzianessenz zu empfehlen.

§. 2256.

Gefräfsigkeit (*Voracitas*) theilt man ein:

1) in Vielfräfsigkeit (*Polyphagia*), wo eine unersättliche Begierde nach Speisen statt findet, der Körper aber doch hinlänglich genährt wird.

2) in Wolfshunger (*Fames lupina*), wenn die Kranken die Speisen ungekauet und mit der gröfsten Begierde verschlingen.

3) in Ochsenhunger (*Bulimus*, *fames bovina*), welcher in einem ungewöhnlich starken Appetit besteht, wobei aber der Körper nicht hinlänglich genährt wird.

4) in Hundshunger (*Cynorexia*, *fames canina*), wenn die Kranken die Speifsen in so grofser

Menge verschlucken, so dafs sie wiederum ausgebrochen werden.

§. 2257.

Verdorbener Appetit (*appetitus corruptus*), oder vielmehr heftiger Appetit nach besonderen Speisen ist zweierlei:

1) *Pica* oder Lüsternheit, wenn ein grofses Verlangen nach besondern, doch efsbaren Dingen statt findet, z. B. zu einer ungewöhnlichen Jahreszeit frische Kirschen, Beere u. d. gl. gefordert werden, oder Appetit nach Schlangen, Eidexen, u. d. gl. vorhanden ist, u. s. w.

2) *Malacia*, wenn ein grofser Appetit nach völlig ungenieſsbaren, oder wohl gar ekelhaften Dingen vorhanden ist, z. B. nach Koth, Kreide, Kalk, Sand, u. s. w.

Das Übel befällt häufig Schwangere und Kinder.

Magenschmerz.

§. 2258.

Magenschmerz, Magenkramf (*Cardialgia*) ist ein heftiger Schmerz in der Magengegend, mit Angst, beschwerlichem Athemholen, und Neigung zum Erbrechen verbunden.

Dabei sind Rückenschmerzen, Erbrechen, kalte Gliedmafsen, u. s. w.

Bei einem hohen Grade des Übels gesellen sich

noch Zuckungen, Ohnmachten, kalte Schweifse, u. d. gl. hinzu.

§. 2259.

Die Anfälle dauern selten über eine Stunde; und entstehen gemeiniglich sogleich nach dem Genufs der Speisen.

§. 2260.

Ursache. Diese besteht in einer Schwäche des Magens.

§. 2261.

Ursächliche Momente. Traurigkeit, Ärger, Kummer, Magenverhärtung, hysterische Disposition, Erkältung, u. s. w.

§. 2262.

Curplan. Dieser ist reizend. Vorzüglich sind hier ätherische Öle, Pfeffermünzenöl, Zimmt - oder Cajeputöl, geistiges Zimmt - oder Pfeffermünzenwasser, Mohnsaft, Zimmttinctur, Baldriantinctur und Muscatennufsöl zu empfehlen.

Überdiefs lobt man noch den Wismuthkalk zu ein bis sechs Gran, den Baldrian, u. a. m.

§. 2263.

Äufserlich sind flüchtige Linimente (s. Form. N. 7. 8.), ätherische Öle, Cajeputöl (s. Form. N. 33.), und Camphergeist einzureiben.

Erbrechen.

§. 2264.

Erbrechen (*Vomitus*) besteht in einem Aus-

werfen der in dem Magen enthaltenen Dinge durch den Mund.

§. 2265.

Ekel (*Nausea*) besteht in einer Neigung zum Brechen.

§. 2266.

Dem Erbrechen gehen Ekel, unangenehme Empfindung in der Magengegend, Zittern der Lippen, Zusammenfluſs des Speichels im Munde, Zittern der Glieder, Schwindel, u. d. gl. vorher.

§. 2267.

Heftiges Erbrechen ist mit Betäubung, Magendrücken, Angst, Ohnmachten, kalten Gliedmaſsen, kalten Schweiſsen, u. d. gl. verbunden.

§. 2268.

Ursache. Diese besteht in einer Schwäche des Magens.

§. 2269.

Ursächliche Momente. Erkältung, Magenentzündung, Magenverhärtung, Diätfehler, Schwangerschaft, Beinbruch des schwertförmigen Knorpels, verschluckte Gifte, Barbeneier, Schifffahrt, gewisse Substanzen, z. B. Ipecacuanha, Brechweinstein, Spiesglanzglas, u. s. w.

§. 2270.

Das Erbrechen gesellt sich auch noch zu manchen andern Formen des Übelbefindens, als zu Magenentzündung, Darmentzündung, Leberentzündung,

Milzentzündung, Netzentzündung, Nierenentzündung, Urinblasenentzündung, Gebärmutterentzündung, Netzbruch, Fiebern, Kopfwunden, Wurmzufällen, Übelbefinden von Steinen in der Gallenblase oder in den Nieren, heftigem Kopfweh, eingeklemmten Bruch, Magenkrampf, Trommelsucht, Hysterie, Colik, u. a. m.

§. 2271.

Curplan. Dieser ist reizend. Vorzüglich sind Mohnsaft, Pomeranzenessenz, Muscatennufs, und Zimmttinctur zu empfehlen.

Auch lobt man noch Wermuth - oder Weinsteinsalz mit Zitronensäure versetzt, Colombo, Aloeessenz, versüfsten Vitriolgeist, Bittersalzerde mit Weinsteinrahm vermischt, u. a. m.

Krankheiten des Darmkanals.

§. 2272.

Die Gedärme oder der Darmkanal sind mancherlei Krankheiten ausgesetzt, und zwar:

1) Darmentzündung (§. 579.).
2) örtliche Absterbung der Gedärme (§. 583.).
3) Kothfistel (§. 2273. 2274.).
4) Verhärtung irgend eines Theiles der Gedärme (§. 584. 591.).
5) Würmer im Darmkanal (§. 2282.).
6) Blähungen (§. 2276.).
7) Wunden der Gedärme (§. 2275.).
8) Darmbruch (§. 1697. 1699. 1704.).

9) Ineinanderschiebung der Gedärme (§. 2277.).

10) Kothbrechen (§. 2311.).

11) Colik (§. 2303.).

12) Verstopfung des Stuhlganges (§. 2346).

13) Bleicolik (§. 1905.).

14) Cholera (§. 1477.).

15) Durchfall (§. 1466. 2280.).

16) Ruhr (§. 1487. 2280.).

17) Lienterie (§. 1499.).

18) Bauchfluſs (§. 1508.).

19) Leberfluſs (§. 1459. 2281.).

20) schwarze Krankheit §. 2278.).

§. 2273.

Kothfistel (*Fistula stercorea*) nennt man eine kleine Öffnung im Darmkanale, gemeiniglich in der Gegend des Bauchringes, aus welcher zuweilen mehr oder weniger Koth ausfliefst. Dabei ist aber der Kothabgang durch den Hintern nicht gehemmt.

Das Übel ist Folge der Darmwunden oder eines Darmgeschwüres; gemeiniglich aber entsteht es nach der örtlichen Absterbung eines Theiles der im Bruche enthaltenen Gedärme.

Die Heilung geschieht vermittelst der Compression (§. 922.) und durch öftere Clystiere.

§. 2274.

Künstlichen After (*anus artificialis*) nennt man den Abgang des Koths durch den Bauchring,

wobei der gewöhnliche Weg desselben durch den After verschlossen ist.

Er ist Folge der örtlichen Absterbung eines Stückes der im Bruche enthaltenen Gedärme.

Der künstliche After mufs zugeheilt werden, wenn die Öffnung im Darmkanale nicht weit vom Magen ist, z. B. im Leerdarme; weil der Kranke sonst in Abzehrung verfällt.

Der künstliche After darf aber nicht zugeheilt werden, wenn er schon alt ist, durch den Hintern schon lange kein Koth mehr ist ausgeleert worden, und man folglich auf eine Verengerung oder Verschliefsung des nach dem After zu gelegenen Darmstückes schliefsen mufs.

§. 2275.

Sind die dünnen Gedärme verwundet, so fliefst Nahrungsbrei aus der Wunde; so wie bei Verwundung der dicken Gedärme Koth ausfliefst.

Bei der Verwundung der Gedärme entstehen heftige Colikschmerzen, Blutbrechen, blutiger Stuhlgang, kalte Schweifse und Ohnmachten.

§. 2276.

Blähungen (*Flatus*) in den Gedärmen erzeugen Colik (Windcolik, *colica flatulenta*), Auftreibung des Unterleibes (*meteorismus*), Geräusch in dem Darmkanale (*borborygmi*), Angst, Unruhe, beschwerliches Athemholen, u. s. w.

Sie werden durch Entwickelung fixer Luft im Darmkanale erzeugt, wozu Schwäche der Gedärme, Diätfehler, der Genufs blähender Speisen, u. d. gl. Veranlassung geben.

Hier sind vorzüglich gewürzhafte Reizmittel, Pomeranzenschale, Muscatennufs, Fenchel, Anis, Kümmel, Calmus, Pfeffer, Gewürznelken, Cardamomen, Zimmt, Coriander, Cubeben, Senf, Pfeffermünze, Salbei, Majoran, Colombo, Serpentaria, Angelica, Meisterwurz, Chamille, Lorbeerblätter, ätherische Öle, Pfeffermünzenöl, Fenchelöl und Salmiakgeist zu empfehlen.

§. 2277.

Ineinanderschiebung der Gedärme (*Volvulus, convolvulus, intussusceptio*) besteht darinn, wenn der obere Theil eines Darms in den unteren, oder der untere in den obern hineingedrängt, und daselbst eingeschnürt worden ist.

Die Zeichen hiervon sind ungewifs.

§. 2278.

Schwarze Krankheit (*Morbus niger, melaena*) besteht in dem Abgang einer schwarzen, pechartigen, stinkenden, geronnenem Blute ähnlichen Materie durch den After, mit Kraftlosigkeit, Angst und Ohnmachten verbunden.

Sie entsteht nach Blutbrechen, u. s. w.

Hier sind vorzüglich bittere Extracte zu empfehlen.

Bauchflüsse.

§. 2279.

Unter Bauchflüssen (*alvi profluvia, alvi fluxus*) versteht man fehlerhafte und zu häufige Stuhlgänge, wohin der Durchfall (§. 1466.), die Ruhr (§. 1487.), Lienterie (§. 1499.), *Fluxus coeliacus* (§. 1508.) und Leberfluſs (§. 1459.) zu rechnen sind.

§. 2280.

Die Ruhr (§. 1487.) unterscheidet sich von dem Durchfalle dadurch, daſs erstere epidemisch herrscht, und mit heftigem Stuhlzwange und Leibesschmerzen verbunden ist, letzterer aber nicht, und daſs bei ersterer gemeiniglich Blut abgeht, bei letzterem aber nicht.

Heftiges und beständiges Drängen zum Stuhlgange, mit Stuhlzwang, heftigen Leibesschmerzen und Fieber verbunden, und welches zu einer Jahreszeit statt findet, wo die Ruhr (nemlich offenbarer Blutabgang durch den After, mit Stuhlzwang, u. s. w. verbunden) herrscht, ist ebenfalls auch zur Ruhr zu rechnen, und als solche zu betrachten, wenn auch gleich kein Blutabgang statt findet.

Bei dem Durchfalle sind zwar auch Leibesschmerzen und Stuhlzwang vorhanden, aber nur in geringem Grade, und noch lange nicht so heftig, wie bei der Ruhr.

Überdieſs ist die Ruhr jederzeit als eine eigene Form des Übelbefindens zu betrachten, der Durch-

fall hingegen ist oft nur Symptom anderer Formen des Übelbefindens, z. B. des Typhus; in welchem Fall er dann freilich auch epidemisch herrschen kann.

§. 2281.

Der Leberfluſs (§. 1459.) unterscheidet sich von dem Hämorrhoidalflusse dadurch, daſs bei ersterem nicht wahres Blut, sondern nur eine röthlich gefärbte, dem Blutwasser ähnliche Feuchtigkeit durch den After abgeht; und von der Ruhr durch die Abwesenheit des Fiebers, und dadurch, daſs es nicht mit Leibesschmerzen und Stuhlzwange verbunden ist.

Der Ausfluſs erfolgt beim Leberflusse nur einigemal täglich ohne Leibesschmerzen und Stuhlzwang, und dadurch unterscheidet er sich hinlänglich von dem Durchfalle, weil der Stuhlgang bei letzterem häufiger geschieht, und jederzeit mit etwas Leibesschmerzen und Stuhlzwange verbunden ist.

Wurmzufälle.

§. 2282.

Würmer (*Vermes*) werden sehr häufig im Magen und Darmkanale angetroffen; zuweilen aber auch in andern Organen des Körpers, als in der Leber, in den Nieren, in dem Herze, u. s. w. wie auch in Geschwüren, u. d. gl.

§. 2283.

Von der Entstehung der Würmer im Menschen hat man verschiedene Meinungen. Viele glau-

ben, dafs dieselben von aufsen vermittelst der Speisen und Getränke in den Körper gelangen. Andere hingegen behaupten, dafs sie im Körper von sich selbst entständen, und dafs der menschliche Organismus schon im Mutterleibe zur Erzeugung der Würmer disponirt sey.

Beide Meinungen haben Gründe für sich.

§. 2284.

Was meine Meinung anbelangt, so glaube ich, dafs die Würmer von aufsen vermittelst der Speisen und Getränke in den Körper gelangen, Schwäche und Schlaffheit der Organe aber deren Aufenthalt in demselben begünstiget.

§. 2285.

In dem Darmkanale werden mancherlei Sorten von Würmern angetroffen. Hier will ich aber nur die Arten derselben, welche am häufigsten und gewöhnlich gefunden werden, erwähnen.

Diese sind die Madenwürmer, Spulwürmer, Haarschwanz, und Bandwürmer.

§. 2286.

Den Maden - und Spulwürmern sind Kinder vorzüglich unterworfen.

Der Bandwurm kommt seltener vor.

§. 2287.

Madenwürmer oder Springwürmer (*ascarides*) sind kleine, runde, einen Querfinger lange,

den Käsemilben ähnliche Würmer. Zuweilen haben sie die Länge eines Fingers. Sie halten sich nur in den dicken Gedärmen auf.

§. 2288.

Haarschwanz (*trichuris*, *tricocephalus*) ist ein dünner, runder, glänzender, sieben Linien langer Wurm, der sich vorzüglich im Blinddarme aufhält.

§. 2289.

Spulwürmer (*lumbrici*) sind runde, fünf bis sechs Zoll lange, mit Ringen versehene, den Regenwürmern ähnliche Würmer. Sie halten sich vorzüglich in den dünnen Gedärmen auf. Zuweilen erreichen sie die Länge von ein, zwei und mehreren Schuhen.

Von den Regenwürmern unterscheiden sich die Spulwürmer dadurch, dafs sie einen mit Warzen besetzten Ring an der Spitze des Kopfes haben, welcher bei den Regenwürmern nicht angetroffen wird, und dafs das Maul der Spulwürmer aus verschiedenen Saugröhren besteht, das der Regenwürmer aber nur eine Öffnung hat. Auch haben die Spulwürmer keine Stacheln und Borsten am Leibe, wie die Regenwürmer.

Sie werden im menschlichen Körper, vorzüglich bei Kindern, am häufigsten angetroffen.

§. 2290.

Bandwurm (*taenia*, *lumbricus latus*, *vermis solitarius*) ist ein sehr langer, platter, aus unzähli-

gen Gelenken zusammengesetzter, einem Bande ähnlicher Wurm. Er ist zehn, zwanzig, dreifsig und mehrere Ellen lang. Der Kopf desselben besteht aus einem langen dünnen Faden, und endiget sich in ein mit Saugröhren versehenes Knötchen. Er hält sich vorzüglich in den dünnen Gedärmen auf.

Es giebt davon zweierlei Arten, und zwar:

1) breite Bandwurm (*taenia lata*), welcher kurze und breite Gelenke hat.

2) Kürbiswurm (*taenia cucurbitina*), welcher einige Zoll lange, den Kürbiskernen ähnliche Gelenke hat.

§. 2291.

Das Daseyn der Würmer im Darmkanale kann nicht als Ursache so mancher Form des Übelbefindens angesehen werden, da deren Aufenthalt in demselben durch Schwäche begünstigt wird, und folglich letztere dafür zu betrachten ist.

§. 2292.

Diagnosis. Der Abgang der Würmer ist das einzige sichere und zuverlässige Zeichen, alle übrigen hingegen sind mehr oder weniger trüglich.

§. 2293.

Zeichen, aus welchen auf das Daseyn der Madenwürmer im Darmkanale kann geschlossen werden.

Diese sind: Jucken im Mastdarme, Stuhlzwang, vorzüglich aber der Abgang der Würmer selbst.

§. 2294.

Zeichen, wodurch sich die Spulwürmer im Darmkanale zu erkennen geben.

Diese sind: öftere Leibesschmerzen, aufgetriebener Unterleib, schleimigter Stuhlgang, Üblichkeit, stinkender Athem, häufiger Zufluſs eines wäſsrigen Speichels im Munde, öfters sehr starker Appetit, Zähneknirschen und Auffahren im Schlafe, unruhiger Schlaf, besondere Bewegungen des Mundes, blasses, aufgedunsenes, cachectisches Gesicht mit Ringeln um den Augen, Jucken in der Nase, erweiterter Augenstern, unordentlicher Puls, u. s. w.

§. 2295.

Zeichen des Daseyns eines Bandwurms im Darmkanale.

Diese sind nur muthmaſslich, so lange nicht Stücke vom Bandwurme abgegangen sind. Denn wellenförmige Bewegungen im Unterleibe beim Niesen, Erbrechen oder Stuhlgange, Druck im Bauche, u. s. w. können uns nicht geradezu auf das Daseyn eines Bandwurms schlieſsen lassen.

§. 2296.

Prognosis. Das Daseyn der Würmer im Darmkanale ist sehr oft mit bedenklichen Zufällen

verbunden, als mit Zuckungen, Fieber, Abzehrung, Harnstrenge, Ohnmachten, Epilepsie, Heifshunger, u. a. m.

So lange der Kopf vom Bandwurm nicht abgeht, so lange ist der Kranke von dem Übel nicht befreiet, weil sich solcher immer wieder reproducirt.

§. 2297.

Curplan. Dieser besteht in dem Gebrauch der Reizmittel.

§. 2298.

Vorzüglich sind hier bittere Extracte angezeigt.

§. 2299.

Purgiermittel stiften im Ganzen genommen hier mehr Schaden, als Nutzen, und sind, wenige Fälle ausgenommen, ganz zu vermeiden.

§. 2300.

Gegen Madenwürmer sind Clystiere von Tabaksrauch, einem Tabaksaufgufs, gekochtem Wermuthöl oder einer Auflösung von Aloe zu empfehlen.

Überdiefs lobt man noch Clystiere von fettem Öle, oder von Knoblauch mit Milch gekocht, den Dampf von einer Abkochung des Knoblauchs mit Milch an den After gelassen, u. s. w.

§. 2301.

Gegen Spulwürmer sind vorzüglich bittere Extracte, Wermuth, Reinfarn, Baldrian und Wurmsamen zu empfehlen.

Überdiefs lobt man noch das versüfste Quecksilber, Eisensalz, Corallenmoos (*muscus helmintochorton*), Ricinusöl, *Spigelia anthelminthica*, Möhren, *Geoffrea surinamensis*, Eisenvitriol, Zinkkalk, Zinnfeile, *Dolichos pruriens*, Eisenfeile, breiten Wegerich, Hirschhornöl, Sabadillsamen, Dippels Thieröl, Schwefel, mineralischen Mohr, Eisenmohr, Sabina, Spiesglanzmohr, Rhabarber, Knoblauch, Zwiebeln, Ochsengalle, salzsauere Schwererde, Kalkwasser, Campher, weifsen Diptam, Brechnufs, stinkenden Asant, stinkende Nieswurz, Steinöl, u. a. m.

Äufserlich sind Ochsengalle, Aloe, Wermuth- oder Reinfarnöl in die Nabelgegend einzureiben.

§. 2302.

Gegen den Bandwurm ist die Farrenkrautwurzel vorzüglich zu empfehlen.

Überdiefs lobt man noch den Eisenvitriol, Zinnfeile, Eisenfeile, versüfstes Quecksilber, u. a. m.

Mit den drastischen Purganzen mufs man, so sehr sie auch empfohlen werden, behutsam seyn, um den Körper nicht zu sehr zu schwächen. Vorzüglich gilt diefs von der so sehr beliebten *Gummi Guttae*.

Darmschmerz.

§. 2303.

Darmschmerz, Leibesschmerz, Leibschneiden (*Colica*) ist gemeiniglich mit Durchfall oder Ver-

stopfung des Stuhls verbunden. Er ist bald periodisch, bald anhaltend.

§. 2304.

Ursache. Diese besteht in einer Schwäche des Darmkanals.

§. 2305.

Ursächliche Momente. Blähungen, Würmer, Erkältung, verschluckte Gifte, verhärteter Koth, Ineinanderschiebung der Gedärme, u. s. w.

§. 2306.

Der Darmschmerz gesellt sich oft zu andern Formen des Übelbefindens, als zur Darmentzündung, Nierenentzündung, Urinblasenentzündung, Wurmsuchfällen, eingeklemmten Bruch, Beschwerden von Steinen in der Gallenblase, Hypochondrie, Hysterie, Ruhr, u. a. m.

§. 2307.

Prognosis. Die Gefahr ist im Ganzen genommen unbestimmt. Ist das Übelbefinden von eingeklemmten Brüchen, Ineinanderschiebung der Gedärme, u. d. gl. entstanden, so ist es sehr gefährlich. Gesellen sich Schluchzen, Ohnmachten, u. d. gl. hinzu, so ist das Übel bedenklich.

§. 2308.

Curplan. Dieser besteht in dem Gebrauch der Reizmittel.

§. 2309.

Innerlich sind Mohnsaft, Bilsenkrautsextract, Campher, Naphte, ätherische Öle, Baldrian, Pfeffermünze, Ingber, Calmus und Muscatennufs zu empfehlen.

Äufserlich sind reizende Linimente (s. Form. N. 7. 8. 33.), oder ätherische Öle in den Unterleib einzureiben, Umschläge von Chamillen - Krause- oder Pfeffermünzenaufgüssen, u. d. gl. anzuwenden, Clystiere von Tabaksrauch, Mohnsaft, Bilsenkrautsextract, u. d. gl. zu gebrauchen, und warme Bäder zu empfehlen.

§. 2310.

Überdiefs ist verhärteter Koth vermittelst der Clystiere zu erweichen, ein eingeklemmter Bruch zurückzubringen, u. s. w.

Kothbrechen.

§. 2311.

Kothbrechen, Darmgicht (*Ileus*, *passio iliaca*, *Miserere mei*) besteht in einem heftigen Erbrechen, so dafs endlich selbst Koth ausgebrochen wird, mit Colikschmerzen und hartnäckiger Verstopfung des Stuhlganges verbunden.

§. 2312.

Ursache. Diese besteht in Schwäche des Darmkanals.

§. 2313.

Ursächliche Momente. Ineinanderschiebung der Gedärme, eingeklemmte Brüche, verhärteter Koth, Darmentzündung, u. s. w.

§. 2314.

Prognosis. Die Dauer ist unbestimmt. Die Gefahr ist sehr grofs, vorzüglich wenn Darmentzündung, Schluchzen, u. d. gl. eintreten.

§. 2315.

Curplan. Dieser ist jederzeit reizend.

§. 2316.

Vorzüglich ist hier der Mohnsaft angezeigt.

§. 2317.

Äufserlich sind Clystiere von Tabaksrauch, oder einem Tabaksaufgufs anzuwenden, und reizende Linimente (s. Form. N. 7. 8. 33.) in den Unterleib einzureiben.

§. 2318.

Eingeklemmte Brüche müssen zurückgebracht, verhärteter Koth durch Clystiere erweicht werden, u. s. w.

§. 2319.

Aderlässe und Purgiermittel sind hier gänzlich zu verwerfen.

Krankheiten des Mastdarms.

§. 2320.

Die Krankheiten, denen der Mastdarm ist ausgesetzt, sind:

1) Entzündung des Mastdarms (§. 579.).
2) Abscefs am Hintern (*abscessus ani*).
3) Geschwüre am Hintern.
4) Mastdarmfistel (§. 2329.).
5) Verhärtung im Mastdarme (§. 2321.).
6) Verengerung des Mastdarms (§. 2322.).
7) Verwachsen des Hintern, s. Krankh. der Kinder.
8) Polyp im Mastdarme.
9) Feigwarzen am Hintern (§. 2323.).
10) Hämorrhoidalknoten (§. 1444. 1445. 1455. 1458.).
11) Hämorrhoidalfluſs (§. 1443. 2324.).
12) Lähmung des Mastdarms (§. 2325.).
13) Vorfall des Mastdarms (§. 2326.).
14) Beschwerden von Madenwürmern im Mastdarme (§. 2287. 2293. 2300.).
15) Mastdarmschmerz (§. 2327.).
16) Jucken am After (§. 2328.).
17) Stuhlzwang (§. 2340.).
18) Verstopfung des Stuhlganges (§. 2346.).

§. 2321.

Verhärtung im Mastdarme erkennt man durch das Gefühl vermittelst eines eingebrachten Fin-

gers oder Sonde und aus dem häufigen, fruchtlosen und schmerzhaften Drängen zum Stuhlgange. Die mühsam ausgepreſsten Excremente haben die Form einer Federspule, Drahts, Bindfadens, u. d. gl. Die Verengerung des Darms nimmt immer mehr zu, und das Übel wird täglich schlimmer. Dabei wird auch noch der Abgang des Urins gestört.

Hier sind die Compression, der anhaltende Gebrauch der Bougies in den Mastdarm gebracht, und Stuhlzäpfchen von Cacaubutter anzuwenden.

§. 2322.

Verengerung des Mastdarms (*coarctatio ani*) wird durch Polypen oder Verhärtung im Mastdarme, u. s. w. erzeugt.

§. 2323.

Feigwarzen (*condylomata*, *cristae*, *fici*, *mariscae*, *crystalli*) sind harte Auswüchse oder Fleischgewächse an dem After, welche gemeiniglich schmerzhaft sind, und gröſstentheils von der Lustseuche herrühren.

Zuweilen findet man sie nur einzeln, oft ist aber der ganze Hintere damit bedeckt. Sie haben die Gröſse einer Erbse oder Bohne. Zuweilen hängen sie wie Feigen an einem dünnen Stiele.

Die Cur besteht in dem äuſseren Gebrauch des rothen Präcipitats (s. Form. 25.), einer Sublimatauflösung, oder des Höllensteines, oder Ätzsteines.

§. 2324.

Der Hämorhoidalflufs (§. 1443.) unterscheidet sich von dem Leberflusse und der Ruhr dadurch, dafs das Blut nicht, wie bei diesen, mit den Excrementen vermischt ist, sondern erst nach der Ausleerung des Koths zum Vorschein kommt.

§. 2325.

Bei einer Lähmung des Mastdarms gehen die Excremente wider Willen des Kranken ab.

§. 2326.

Vorfall des Mastdarms (*Prolapsus l. Procidentia ani*, *Proctocele*, *Exania*) entsteht während der Ausleerung des Koths, und zwar durch heftiges Drücken beim Stuhlgange, sehr harte Excremente, bei schweren Geburten, u. s. w.

Die Heilung besteht in der Zurückbringung des Darms.

Fällt der Mastdarm aber wieder beim Stuhlgange hervor, so sind Bähungen von Eichenrindendecoct, Clystiere von Eichen- oder Weidenrindendecoct mit Mohnsaft vermischt, Dämpfe von Kräutern in Wein digerirt (§ 179.), oder Räucherungen von Weihrauch, Mastix und Bernstein an den After gelassen, anzuwenden.

§. 2327.

Schmerz des Mastdarms entsteht von Wundseyn desselben, z. B. durch das Gehen oder

Reiben erzeugt, von verhärtetem Koth, Feigwarzen, Hämorrhoidalknoten, Entzündung oder Geschwüren des Mastdarms, u. s. w.

Gegen das Wundseyn ist Bleiwasser zu gebrauchen, verhärteter Koth ist durch Clystiere zu erweichen, u. s. w.

§. 2328.

Jucken am After wird durch Madenwürmer, Hämorrhoidalfluſs, u. s. w. erzeugt, und erfordert den äuſserlichen Gebrauch des Bleiwassers oder Kalkwassers.

Mastdarmfistel.

§. 2329.

Mastdarmfistel, Steiſsfistel, Gesäſsfistel (*Fistula ani*) entsteht unter allen Fisteln am häufigsten.

§. 2330.

Die Mastdarmfisteln theilt man ein:

1) in vollkommene oder complete, wenn an der Fistel zwei Öffnungen vorhanden sind, wovon die eine nach auſsen, d. i. nach dem Mittelfleische, die andere nach innen, d. i. nach dem Darme, zugeht.
2) in unvollkommene, blinde oder incomplete, wenn an der Fistel nur eine Öffnung vorhanden ist. Diese sind wiederum:
   a) äuſserliche blinde Fisteln, wenn der fistulöse Gang sich bloſs im Mittelfleische

befindet, nach aufsen eine Öffnung vorhanden ist, im Darme aber keine.

b) innerliche blinde Fisteln, wenn die Fistel sich blofs im Mastdarme öffnet, aber nicht nach aufsen.

§. 2331.

Die complete Fistel erkennt man aus der Öffnung am Mittelfleische, aus welcher ein dünnes Eiter fliefst, und beim Stuhlgange Koth mit Eiter vermischt, dringt. Dabei sind Schmerzen und Stuhlzwang. Eine in die äufsere Öffnung der Fistel gebrachte Sonde berührt den in den Mastdarm gesteckten Finger unmittelbar, und eine in die Fistel gespritzte Feuchtigkeit fliefst sogleich zum Mastdarme heraus.

§. 2332.

Die äufsere blinde Fistel erkennt man aus einer Öffnung am Mittelfleische, aus welcher die eingespritzte Feuchtigkeit sogleich herausläuft, und die in diese Öffnung gebrachte Sonde den in den Mastdarm gesteckten Finger nicht unmittelbar berührt.

§. 2333.

Die innere blinde Fistel erkennt man aus einer vorhergegangenen Entzündung und daher entstandenem Schmerze; aus dem mit dem Stuhlgange abgehenden Eiter, und aus der Entdeckung der Öffnung vermittelst des in den Mastdarm gebrachten

Fingers. Zuweilen sieht man am Mittelfleische eine Röthe, oder fühlt eine schmerzhafte Stelle oder Härte.

§. 2334.

Die complete Fistel existirt am häufigsten.

§. 2335.

Die Mastdarmfistel ist eine Folge einer vorhergegangenen Entzündung oder Eiterung im Mastdarme.

§. 2336.

Prognosis. Die Gefahr ist unbestimmt. Je älter und callöser die Fistel ist, desto schlimmer.

§. 2337.

Curplan. Dieser besteht in der Operation.

§. 2338.

Die Operation besteht entweder:

1) in der Unterbindung, indem ein Blei- Silber- oder Eisendraht, oder eine seidene, an eine Darmsaite befestigte, Schnur durch die ganze Fistel gezogen wird, in derselben liegen bleibt, und beide Enden davon zusammengebunden, und alle zwei oder drei Tage stärker zusammengezogen werden, bis das Ganze ist durchschnitten worden.

2) in dem Aufschlitzen, indem das Operationsmesser in die Fistel geschoben wird, so dafs dessen Knöpfchen den in den Mastdarm gesteck-

ten Finger berührt, worauf beide dergestalt zugleich herausgezogen werden, dafs die Fistel in ihrer ganzen Länge aufgeschlitzt wird.

3) in dem Ausschneiden der Fistel, welches aber sehr schmerzhaft ist.

§. 2339.

Ist die Fistel kurz, neu und nicht callös, so kann man sich der Einspritzungen von einer Auflösung des Sublimats oder des Höllensteines bedienen.

Stuhlzwang.

§. 2340.

Stuhlzwang (*Tenesmus*) besteht in einem häufigen und schmerzhaften Drängen zum Stuhlgange, wobei entweder nichts oder doch nur wenig abgeht.

§. 2341.

Ursächliche Momente. Madenwürmer, Erkältung, Verhärtung im Mastdarme, u. s. w.

§. 2342.

Der Stuhlzwang gesellt sich gemeiniglich zu andern Formen des Übelbefindens, als zur Ruhr, Hämorrhoidalflusse, Entzündung des Mastdarms, Urinblasenentzündung, Gebärmutterentzündung, Beschwerden von Steinen in der Harnblase, u. a. m.

§. 2343.

Prognosis. Die Gefahr ist unbestimmt. Leicht entsteht ein Vorfall des Mastdarms.

§. 2344.

Curplan. Dieser ist reizend.

§. 2345.

Reizende Clystiere (§. 183.) und Bähungen (§. 179.) sind hier von vielem Nutzen.

Verstopfung des Stuhlganges.

§. 2346.

Verstopfung des Stuhlganges (*obstructio alvi*) **ist entweder als eine besondere Form des Übelbefindens für sich zu betrachten, oder ist Symptom anderer Formen des Übelbefindens.**

§. 2347.

Ursache. Diese besteht in Schwäche des Darmkanals.

§. 2348.

Ursächliche Momente. Würmer im Darmkanale, Gebrauch des Mohnsaftes, harte Excremente, Verhärtung im Mastdarme, Schwangerschaft, u. s. w.

§. 2349.

Verstopfter Stuhlgang gesellt sich gemeiniglich zu andern Formen des Übelbefindens, als zur Hypochonderie, Kothfistel, Wurmbeschwerden, Colik, Kothbrechen, Magenentzündung, Darmentzündung, Milzentzündung, Bauchfellsentzündung, Gekrösentzündung, Nierenentzündung, Harnblasenentzündung,

eingeklemmten Brüchen, Fiebern, Gelbsucht, Bleicolik, Trommelsucht, u. a. m.

§. 2350.

Prognosis. Die Dauer sowohl, als die Gefahr ist unbestimmt. Oft ist es unbedeutend, zuweilen aber sehr gefährlich. Bei Kothbrechen, eingeklemmten Brüchen, Bleicolik, u. d. gl. ist es jederzeit bedenklich.

§. 2351.

Curplan. Dieser ist reizend.

§. 2352.

Innerlich sind vorzüglich bittere Extracte zu empfehlen.

Bei der Bleicolik, Kothbrechen, Gelbsucht und eingeklemmten Brüchen ist der Mohnsaft angezeigt.

Auch kann man sich des Kaffees, der Rhabarber, des Tabaks, u. d. gl. bedienen.

§. 2353.

Äufserlich sind reizende Bähungen (§. 179.) auf den Unterleib, reizende Clystiere (s. Form. N. 21.) und Stuhlzäpfchen von Seife, Honig oder Speck anzuwenden.

§. 2354.

Purgiermittel stiften hier mehr Schaden als Nutzen.

Krankheiten der Leber.

§. 2355.

Zu den Krankheiten, denen die Leber unterworfen ist, gehören:

1) Leberentzündung (§. 592. 2356.).
2) Leberabscefs (§. 2357.).
3) Verhärtung der Leber (§. 597.).
4) Lebergeschwulst (§. 2358.).
5) Wunden der Leber.

§. 2356.

Die Entzündung der Leber (§. 592.) darf nicht mit der Entzündung des Zwergfells, der Lungen, des Magens oder der Nieren verwechselt werden.

§. 2357.

Den Leberabscefs (*abscessus hepatis*) erkennt man aus der vorhergegangenen Leberentzündung, Druck in der Lebergegend, unerträglichem Durste, gestörter Verdauung und Stuhlgange, eiterartigem Durchfalle, und gelben Farbe der Haut. Zuweilen zeigt sich eine schwappernde Geschwulst in der Lebergegend.

Hier ist wenig zu thun. Entsteht derselbe nach aufsen, so ist er zu öffnen, und dann gehörig zu behandeln.

Lebergeschwulst.

§. 2358.

Die Lebergeschwulst, welche bald gröfser, bald geringer seyn kann, und mit mehr oder weniger Verhärtung verbunden ist, betrachtet man gemeiniglich als eine Verstopfung der Leber von Blutanhäufung, Schleim, sogenannter schwarzgalligter Materie, u. d. gl. und als die Ursache von sehr vielen Formen des Übelbefindens. Diefs ist aber ungegründet.

§. 2359.

Die Lebergeschwulst ist verbunden mit Druck in der Lebergegend, sparsamen und harten Stuhlgange, Angst, blasser Gesichtsfarbe, u. s. w.

§. 2360.

Prognosis. Das Übelbefinden ist jederzeit bedenklich, und leicht erfolgt Auszehrung, Bauchwassersucht, Hypochondrie, u. s. w.

§. 2361.

Curplan. Dieser besteht in dem innerlichen und äufserlichen Gebrauch der Reizmittel.

§. 2362.

Innerlich sind vorzüglich bittere Extracte, Quafsie, rother Enzian, Spiesglanzschwefel und Mohnsaft zu empfehlen.

Äufserlich sind flüchtige Linimente in den Unterleib einzureiben (s. Form. N. 7. 8.).

Krankheiten der Gallenblase.

§. 2363.

Zu den Krankheiten der Gallenblase gehören:

1) Entzündung der Gallenblase (§. 592.).
2) Geschwür in der Gallenblase (§. 2357.).
3) Fistel der Gallenblase (§. 2364.).
4) Wunden der Gallenblase (§. 2365.).
5) Gallenblasensteine (§. 2366.).

§. 2364.

Fisteln der Gallenblase entstehen nach Wunden derselben, bei Steinen in der Gallenblase, u. s. w. und sind selten bedenklich. Sind Steine in der Gallenblase vorhanden, so müssen diese vermittelst einer Zange behutsam herausgezogen werden.

§. 2365.

Wunden der Gallenblase sind an dem Ausflusse der Galle aus der Wunde, und an der gestörten Verdauung und Stuhlgange zu erkennen.

Wunden der Gallenblase sind weit gefährlicher, als Verletzungen der Leber, und bei der glücklichsten Behandlung bleibt doch eine Fistel zurück.

Gallenblasensteine.

§. 2366.

Steine in der Gallenblase (*Calculi vesicu-lae felleae*) **sind dunkelbraune, aschgraue oder gelbe, gemeiniglich dreieckige Steine, die von brennbarer Beschaffenheit sind, und aufser der Gallenblase zuweilen auch in der Leber gefunden werden.**

§. 2367.

Die Anzahl der Steine ist unbestimmt; zuweilen trifft man sie zu hunderten in der Gallenblase an. Zuweilen wiegt ein Stein etliche Loth.

§. 2368.

Diagnosis. Druck und Schwere in der Lebergegend, Neigung zum Erbrechen, wirkliches Erbrechen, Magen - und Darmschmerzen, und Auftreiben des Unterleibes.

Hierzu gesellen sich Gelbsucht, Verstopfung des Stuhlganges, u. s. w.

§. 2369.

Ursächliche Momente. Schwächende Leidenschaften, Kummer, Ärger, Traurigkeit, u. s. w.

§. 2370.

Prognosis. Das Übel ist jederzeit bedenklich. Sehr oft gehen die Steine durch den Stuhlgang mit fort.

§. 2371.

Curplan. Arzeneimittel richten hier wenig aus.

§. 2372.

Doch lobt man eine Mischung von zwei Theilen Vitriolnaphte und einem Theile Terpentinöl, wie auch eine Auflösung des mineralischen Laugensalzes in Kalkwasser.

Krankheiten der Milz.

§. 2373.

Die Krankheiten, denen die Milz ist unterworfen, sind:

1) Milzentzündung (§. 603.).
2) Eiterung der Milz (§. 2374.).
3) Verhärtung der Milz (§. 2375.).
4) Wunden der Milz.

§. 2374.

Die Eiterung der Milz erkennt man aus der vorhergegangenen Milzentzündung, und Drucke in der Milzgegend, wobei die Kranken gewöhnlich traurig und niedergeschlagen sind. Oft bemerkt man eine Anschwellung der Milzgegend.

Hier ist wenig auszurichten. Entsteht eine Eitergeschwulst nach aufsen, so ist diese zu öffnen, und hierauf gehörig zu behandeln.

§. 2375.

Die Geschwulst der Milz ist mit mehr oder weniger Verhärtung, Druck in der Milzgegend, blasser und fahler Gesichtsfarbe, Angst, u. s. w. verbunden.

Das Übel ist jederzeit bedenklich, und leicht erfolgt Auszehrung, Hypochondrie, u. s. w.

Der Curplan ist reizend. Innerlich sind vorzüglich bittere Extracte, Mohnsaft und Spiesglanzschwefel anzuwenden, und äufserlich flüchtige Liniмente (s. Form. N. 7. 8.) in die Milzgegend einzureiben.

Krankheiten der Nieren.

§. 2376.

Die Nieren sind mancherlei Krankheiten unterworfen, und zwar:

1) Nierenstein (§. 2381.).
2) Nierenentzündung (§. 636. 2378.).
3) Nierenabscefs (§. 639. 640. 2379.).
4) Nierenverhärtung (§. 641.).
5) Nierenschmerzen (§. 2380.).
6) Blutharnen (§. 1429.).
7) Harnruhr (§. 1527.).
8) Wunden der Nieren.

§. 2377.

Dafs die Nieren leiden, erkennt man an der gestörten Urinabsonderung, und an einem Drucke oder Schmerze in der Nierengegend.

§. 2378.

Die Nierenentzündung (§. 636.) darf nicht mit der Lendenmuskelsentzündung oder dem Lendenweh verwechselt werden.

Bei der Nierenentzündung ist die Ausleerung des Urins, wie auch die des Stuhlganges gestört, welches bei der Lendenmuskelsentzündung aber nicht der Fall ist.

§. 2379.

Den Nierenabsceſs (*abscessus renum*) erkennt man aus der vorhergegangenen Nierenentzündung, Schwere und Druck in der Nierengegend, Taubheit und Schwere des Schenkels der leidenden Seite, und aus dem mit dem Urin abgehendem Eiter. Zuweilen entsteht eine schwappernde Geschwulst in der Nierengegend.

Hier ist wenig zu thun. Öfters geht das Eiter mit dem Urin ab. Ein Absceſs nach auſsen muſs geöffnet, und dann gehörig behandelt werden.

§. 2380.

Nierenschmerz, Nierenweh (*dolor nephriticus*, *nephralgia*) enteteht von Erkältung, Zorn, Ärger, Nierensteinen, Nierenentzündung, u. s. w. und erfordert den reizenden Curplan.

Nierenstein.

§. 2381.

Steine in den Nieren (*Calculi renum*) sind graue oder weiſslichte, steinharte oder mehr zerreibliche, lamellöse, mit einem innern Kern versehene Steine.

§. 2382.

Diagnosis. Anhaltender Druck und Schmerz in der Nierengegend, welcher sich oft bis zur Harnblase erstreckt, Harnzwang, sparsamer Abgang eines trüben und sandigen Urins, Taubheit des Schenkels der leidenden Seite, und oft ein Zurückziehen der Hode der krankhaften Seite.

Hierzu gesellen sich gemeiniglich noch Erbrechen, Leibesverstopfung, u. s. w.

§. 2383.

Ist der Stein aus der Niere in den Harngang übergegangen, so erkennt man dieses aus heftigen Schmerzen in den Lenden, wozu sich oft Erbrechen, Zuckungen, u. s. w. gesellen.

§. 2384.

In den Nieren können nur einer, aber auch mehrere Steine vorhanden seyn.

Häufiger entsteht er in der linken Niere, selten in beiden zugleich.

§. 2385.

Die Veranlassung zum Nierensteine suchen einige in dem Genufs säuerlicher Weine, andere in einer sitzenden Lebensart, oder in Geschwüren der Nieren, u. s. w.

§. 2386.

Curplan. Arzeneimittel richten hier wenig aus.

§. 2387.

Doch empfiehlt man das Kalkwasser, die Seife, u. a. m. welche aber von wenigem Nutzen seyn werden.

Krankheiten der Urinblase.

§. 2388.

Zu den Krankheiten, denen die Urin- oder Harnblase unterworfen ist, gehören:

1) Urinblasenstein (§. 2394.).
2) Urinblasenentzündung (§. 644.).
3) Geschwür in der Harnblase.
4) Verhärtung an der Urinblase (§. 2389.).
5) Krampf der Urinblase (§. 2390.).
6) Lähmung der Urinblase (§. 2390.).
7) Harnblasenvorfall (§. 2391.).
8) Wunden der Urinblase (§. 2392.).
9) Harnbrennen (§. 2393.).
10) Harnverhaltung (§. 2401.).
11) Unwillkührlicher Urinabgang (§. 2412.).

§. 2389.

Verhärtung an der Urinblase erkennt man aus einem Drucke in der Blasengegend, und aus den Beschwerden beim Urinlassen.

§. 2390.

Gegen Krampf oder Lähmung der Urinblase sind flüchtige Reizmittel zu empfehlen. Äus-

serlich sind reizende Linimente (s. Form. N. 7. 8. 33. 34.) in die Harnblasengegend einzureiben.

§. 2391.

Harnblasenvorfall (*Prolapsus l. Procidentia vesicae urinariae*) nennt man den Zustand, wenn sich die innere Haut oder auch mehrere Häute vom Harngange durch die Harnröhre verschieben.

Das Übel kömmt blofs bei Weibespersonen vor, und erfordert die Zurückbringung der vorgefallnen Theile, und dann die Einbringung einer Wachskerze in die Harnblase.

§. 2392.

Wunden der Urinblase erkennt man aus dem Ausflusse von Urin aus der Wunde, und aus dem Abgange des mit Blut vermischten Urins durch die Harnröhre.

§. 2393.

Gegen das Harnbrennen sind innerlich Mohnsaft, Mandelmilch, Mandelöl, u. d. gl. zu empfehlen.

Rührt dasselbe aber von dem Gebrauch der spanischen Fliegen her, so zeigt sich der Campher vorzüglich nützlich.

Urinblasensteine.

§. 2394.

Steine in der Urinblase (*Calculi vesicae urinariae*) sind weifslichte oder graue, steinharte oder zerreibliche, lamellöse, mit einem innern Kern versehene Steine.

§. 2395.

Diagnosis. Schmerzen beim Urinlassen, häufiger und schmerzhafter Trieb zum Urinlassen, Harnstrenge, trüber und schleimigter Urin, der beim Lassen oft plötzlich unterbrochen wird, Stuhlzwang, Schwere im Mittelfleische, Jucken an der Eichel, häufige Erectionen des männlichen Gliedes.

Am sichersten wird der Stein durch die Untersuchung vermittelst des Catheders oder vermittelst des Fingers, in den After oder die Mutterscheide gebracht, entdeckt; es sey denn, dafs derselbe in einer Haut verschlossen sey.

§. 2396.

Gemeiniglich ist nur ein Stein, selten sind mehrere in der Urinblase vorhanden, deren Gewicht einige Quentchen bis zu mehreren Lothen beträgt. Mancher Stein erreicht aber auch das Gewicht von einem Pfunde und mehr.

Die Steine hängen selten an der Urinblase an, sondern sind mehrentheils frei.

Mannspersonen leiden an dem Übel häufiger, als Frauenzimmer.

§. 2397.

Die Veranlassung zum Urinblasensteine suchen einige in dem Genufs säuerlicher Weine, oder in Geschwüren der Harnblase, oder in einer besondern Beschaffenheit des Trinkwassers, oder in einer sitzenden Lebensart, lang anhaltendem Liegen, u. s. w.

vorzüglich aber in einer besondern Disposition des Körpers zur Erzeugung der Steine.

§. 2398.

Prognosis. Das Übel ist nie ohne Gefahr, und erregt öfters die heftigsten Schmerzen.

§. 2399.

Curplan. Arzeneimittel richten hier wenig aus. Jederzeit ist die Operation, und zwar der Steinschnitt (*lithotomia*), wodurch der Stein aus der Urinblase entfernt wird, angezeigt.

§. 2400.

Man empfiehlt hier die Bärentraube, Seife, Kalkwasser, Seifensiederlauge, aus reinem Pflanzenlaugensalz und Austerschalenkalk bereitet, u. a. m. welche aber wenig Nutzen schaffen werden.

Urinverhaltung.

§. 2401.

Die Urinverhaltung oder Unterdrückung des Urins (*suppressio urinae*) theilt man ein:

1) in Schwerharnen (*Dysuria*), wenn der Urin mit Mühe und Beschwerde abgeht.

2) in Harnstrenge, Harnwinde (*Stranguria*), wenn der Urin nur tropfenweis und mit Schmerz abgeht.

3) in Harnverhaltung (*Ischuria*), wenn ein

Drang zum Urinlassen mit Schmerzen verbunden statt findet, ohne dafs das Mindeste abgeht.

§. 2402.

Wenn in den Nieren kein Urin abgesondert wird, und folglich Urinverhaltung, aber ohne Trieb zum Urinlassen, eintritt, so nennt man dieses Übel *Ischuria renalis*.

§. 2403.

Ursache. Diese besteht in Schwäche der Urinblase.

Ursächliche Momente. Erkältung, Lähmung der Harnblase, Anschwellung der Gebärmutter während der Schwangerschaft, Harnblasensteine, Geschwüre in der Urinblase, Verhärtung an der Urinblase, Mifsbrauch der spanischen Fliegen, Nierensteine, Madenwürmer im Mastdarme, u. s. w.

§. 2404.

Beschwerden beim Urinlassen gesellen sich oft zu andern Formen des Übelbefindens, als zur Urinblasenentzündung, Nierenentzündung, Harnröhrenentzündung, Beschwerden von Nieren - und Urinblasensteinen, Fiebern, Vorsteherdrüsenentzündung, Mutterscheidenentzündung, Gebärmutterentzündung, venerischem Tripper, u. a. m.

§. 2405.

Greise und Wollüstlinge sind dem beschwerlichen Urinlassen häufig ausgesetzt.

§. 2406.

Prognosis. In einem geringen Grade ist das Übel mehr beschwerlich, als gefährlich, in einem hohen Grade ist es aber jederzeit bedenklich.

Bei gänzlicher Harnverhaltung schwillt die Urinblase bald so sehr an, dafs sie die andern Eingeweide des Unterleibes nach hinten zusammendrückt; worauf sie endlich, bei mangelnder Hülfe, platzt, der Urin sich in die Bauchhöhle ergiefst, und der Tod erfolgt; oder der Urin aus der Harnblase in die Harngänge und Nieren zurückdrückt, wodurch heftige Nierenschmerzen, u. s. w. eintreten.

§. 2407.

Curplan. Dieser besteht in dem Gebrauch der Reizmittel, und im Nothfalle in der Anwendung des Catheders.

§. 2408.

Innerlich ist vorzüglich der Mohnsaft zu empfehlen.

§. 2409.

Äufserlich sind flüchtige Linimente (s. Form. N. 7. 8.) in das Mittelfleisch und die Urinblasengegend einzureiben, reizende Bähungen (§. 179.) auf den Unterleib zu legen, und laue Bäder und Clystiere (§. 183.) anzuwenden.

§. 2410.

Bei Urinblasensteinen ist der Steinschnitt anzu-

wenden, gegen den unvorsichtigen Gebrauch der spanischen Fliegen ist der Campher zu empfehlen, u. s. w.

§. 2411.

Bei gänzlicher Harnverhaltung mufs man sich des Catheders bedienen.

Im Fall aber, dafs die Einbringung des Catheders in die Urinblase unmöglich wäre (welchem Hindernisse man aber oft durch ein warmes Bad abhelfen kann), und Arzeneimittel vergeblich sind angewendet worden, so mufs man dann seine Zuflucht zur Durchbohrung der Urinblase durch den After nehmen.

Unwillkührlicher Urinabfluſs.

§. 2412.

Unwillkührlicher Urinabfluſs (*Incontinentia urinae*, *Enuresis*) besteht in einem Unvermögen, den Urin an sich halten zu können.

§. 2413.

Dieser Zustand besteht entweder in einem beständigen Auströpfeln des Urins, oder in einem häufigern Urinlassen, als gewöhnlich zu geschehen pflegt, oder in einem ohne Wissen des Kranken existirenden Abgang des Urins, z. B. des Nachts, beim Typhus, u. s. w.

§. 2414.

Sehr häufig geht bei Kindern, seltener bei Erwachsenen, des Nachts während dem Schlafe der Urin ab, welches man *Enuresis nocturna* nennt.

§. 2415.

Ursache. Diese besteht in Schwäche der Urinblase oder des Schliefsmuskels derselben.

§. 2416.

Ursächliche Momente. Lähmung der Urinblase und des Schliefsmuskels derselben, Geschwüre in der Harnröhre, Erkältung, u. s. w.

§. 2417.

Der unwillkührliche Abgang des Urins gesellt sich oft zum Typhus, und andern Formen des Übelbefindens; oder ist Vorbote des Schlagflusses; oder ist eine Folge des unvorsichtig verrichteten Steinschnittes, oder der Operation einer Mastdarmfistel, u. s. w.

§. 2418.

Prognosis. Das Übel ist mehr beschwerlich, als gefährlich, und nicht selten unheilbar.

§. 2419.

Curplan. Dieser besteht in der Anwendung der Reizmittel.

§. 2420.

Innerlich sind bittere Extracte, Canthariden-tinctur, Salmiakgeist, Quafsie, Campher, u. s. w. anzuwenden.

Äufserlich sind flüchtige Linimente (s. Form. N. 7. 8.) in die Urinblasengegend und das Mittelfleisch

einzureiben, und reizende Bähungen (§. 179.) auf den Unterleib zu legen.

§. 2421.

Als Palliativmittel wendet man Maschinen, wodurch der Urin aufgefangen wird, an, z. B. Schweinsblasen, Flaschen von Horn, u. d. gl.

Krankheiten der Harnröhre.

§. 2422.

Zu den Krankheiten, denen die Harnröhre unterworfen ist, gehören:

1) Harnröhrenentzündung (§. 660.).
2) Tripper (§. 1087. 2446.).
3) Geschwüre in der Harnröhre (§. 2423.).
4) Urinfistel (§. 2429.).
5) Blutfluſs aus der Harnröhre (§. 1436.).
6) Auswüchse in der Harnröhre (§. 2424.).
7) Stein in der Harnröhre (§. 2425.).
8) Verengerung der Harnröhre (§. 2426.).
9) Ungewöhnliche Öffnung in der Harnröhre (§. 2427.).
10) Fehlende Öffnung der Harnröhre (§. 2428.).

§. 2423.

Gegen ein Geschwür in der Harnröhre sind Einspritzungen von Bleiwasser oder Kalkwasser zu empfehlen.

§. 2424.

Auswüchse in der Harnröhre (*carunculae*) verhindern den Durchgang des Urins. Man erkennt sie an dem äufseren Gefühl, und aus dem gestörten Abgange des Urins, indem der Lauf desselben öfters unterbrochen wird, oder der Urin in einem sehr dünnen oder getheilten Strahle, oder auch nur tropfenweis abgeht. Auch kann man sie vermittelst der einfachen Kerzen entdecken.

Hier sind Einspritzungen von einer Auflösung des Sublimats, oder von Kalkwasser anzuwenden.

§. 2425.

Wenn aus der Urinblase ein Stein in die Harnröhre gekommen ist, so ist derselbe nicht, wie einige gerathen haben, in die Urinblase zurückzuschieben, sondern vermittelst eines Schnittes in die Harnröhre zu entfernen.

§. 2426.

Die Verengerung der Harnröhre ist schwer zu heben. Sie entsteht nach Geschwüren in der Harnröhre, nach dem Tripper, bei Auswüchsen in die Harnröhre, u. s. w. Der Urin geht hier in einem getheilten oder sehr dünnen Strahle ab.

Die Cur besteht in der Anwendung der Bougies oder Kerzen.

§. 2427.

Eine in der Harnröhre befindliche unge-

wöhnliche Öffnung mufs man scarificiren, und dann die Zuheilung derselbea befördern.

§. 2428.

Bei einer fehlenden Öffnung der Harnröhre ist die Öffnung derselben vermittelst der Operation zu bewerkstelligen.

§. 2429.

Die Urinfistel oder Harnfistel (*Fistula urinaria*) ist dreierlei Art. Aufsere blinde Harnfistel nennt man sie, wenn sie blofs eine Öffnung nach aufsen hat, innere blinde Urinfistel, wenn sie blofs eine Öffnung nach innen hat, und vollkommne Harnfistel, wenn sie sich sowohl nach aufsen, als nach innen öffnet.

Der Urin geht hier zuweilen bei Mannspersonen in den Hodensack, und bei Frauenzimmern in die Mutterscheide.

Die Urinfistel wird durch Harnröhrengeschwüre, Steine in der Harnröhre, unvorsichtig verrichteten Steinschnitt, u. s. w. veranlafst.

Die Heilung besteht in dem Gebrauch der Kerzen und in dem Einreiben flüchtiger Linimente (s. Form. N. 7. 8.).

Krankheiten des Mittelfleisches.

§. 2430.

Krankheiten des Mittelfleisches sind:

1) Abscefs am Mittelfleische (*abscessus perinaei.*).

2) Mitelfleischfistel (§. 2431.).

3) Zerreifsung des Mittelfleisches, z. E. bei einer schweren Geburt.

4) Mistelfleischbruch (§. 1703.).

§. 2431.

Die Darmfistel oder Mittelfleischfistel (*Fistula perinaei*) steht gemeiniglich mit einer Harnfistel in Verbindung. Hier ergiefst sich der Urin in das Mittelfleisch.

Krankheiten der Zeugungstheile.

§. 2432.

Die Krankheiten der Zeugungstheile zerfallen wiederum in Krankheiten der männlichen und in die der weiblichen Zeugungsglieder.

Krankheiten der männlichen Zeugungstheile.

§. 2433.

Die männlichen Geburtsglieder bestehen aus mancherlei Organen, und zwar aus dem *Penis*, der Vorsteherdrüse, dem Hodensacke, den Hoden, dem Samenstrange und den Samenbläschen.

Krankheiten der männlichen Ruthe.

§. 2434.

Die männliche Ruthe (*Penis*) ist mancherlei Krankheiten unterworfen, und zwar:

1) Samenergufs ohne Beischlaf (§. 2439.).
2) anhaltende Steifigkeit des männlichen Gliedes (§. 2459.).
3) Unvermögen des Mannes zum Beischlafe (§. 2465.).
4) Krampf des männlichen Gliedes (§. 2435.).
5) Verwachsung der Eichel, s. Krankh. d. Kinder.
6) Blutflufs aus dem männlichen Gliede (§. 2440.).
7) Krebs der männlichen Ruthe (§. 2436.).
8) Chanker (§. 1078.).
9) Verengerung der Vorhaut (§. 2472.).
10) Einklemmung der Eichel (§. 2481.).
11) Tripper (§. 2446.).
12) Venusbogen (*chorda veneris*), d. i. ungewöhnliche Krümmung des männlichen Gliedes mit sehr heftigen Schmerzen verbunden (§. 1106.).
13) Krystallblasen (§. 2437.).
14) Galanteriebeulen (§. 2438.).

§. 2435.

Als ein Krampf der männlichen Ruthe (*Spasmus penis*, *Mentulagra*) kann der *Priapismus* (§. 2459.) und der Venusbogen betrachtet werden.

§. 2436.

Der Krebs der männlichen Ruthe (*cancer penis*) erfordert das Abnehmen des krebshaften Theiles.

§. 2437.

Krystallblasen (*Vesiculae crystallinae*) sind Bläschen von verschiedener Gröfse, gemeiniglich von der einer grofsen Bohne, welche mit einer durchsichtigen und scharfen Feuchtigkeit angefüllt sind, und vorzüglich an der Eichel vorkommen. Sie sind eine Folge der Lustseuche.

Die Cur besteht in dem äufserlichen Gebrauche einer Auflösung des Sublimats, des Höllensteines oder des Ätzsteines.

§. 2438.

Galanteriebeulen (*Phymata venerea*) sind kleine und harte Erhabenheiten, die bei Mannspersonen an der Eichel und Vorhaut, und bei Frauenzimmern an den Schamlippen, Nymphen und dem Kitzler vorkommen, und die Folge venerischer Geschwüre sind.

Sie erfordern äufserlich die rothe Präcipitatsalbe (s. Form. N. 25.), oder eine Auflösung des Höllensteines, Ätzsteines oder des Sublimats.

Pollution.

§. 2439.

Samenergufs ohne Beischlaf (*Pollutio*) geschieht entweder bei Tage (*pollutio diurna*), oder des Nachts (*pollutio nocturna*).

§. 2440.

Ursache. Diese beruht bei zu häufigen Pollutionen jederzeit auf Schwäche der Zeugungstheile.

§. 2441.

Ursächliche Momente. Ausschweifungen in der Liebe, Onanie, Anhäufung von Samen in den Samenbläschen, zu lebhafte Phantasie, Harnblasensteine, u. s. w.

§. 2442.

Pollutionen gesellen sich auch oft zu andern Formen des Übelbefindens, als zur Rückendarre, Beschwerden von Harnblasensteinen, u. a. m.

§. 2443.

Prognosis. Zu häufige Pollutionen entkräften den Körper, und bewirken endlich Abzehrung.

§. 2444.

Curplan. Zu häufige Pollutionen erfordern den Gebrauch der Reizmittel.

§. 2445.

Innerlich sind Mohnsaft, Campher, Zimmttinctur, bittere Extracte, geistiges Zimmt- oder Pfeffermünzenwasser, Calmus, u. d. gl. anzuwenden.

Tripper.

§. 2446.

Tripper (*Gonorrhoea, Blenorrhoea, Leucorrhoea, catarrhus penis, catarrhus urethrae*) besteht in dem Ausflusse eines Schleimes aus der männlichen Harnröhre.

§. 2447.

Man theilt den Tripper ein:

1) in Tripper von venerischem Anstekkungsstoffe (venerischer oder bösartiger Tripper, *gonorrhoea venerea l. maligna*, §. 1087.).

2) in Tripper von verschiedenen Schädlichkeiten, aber nicht von venerischem Ansteckungsstoffe (gutartiger Tripper, *gonorrhoea l. blenorrhoea l. leucorrhoea benigna.*).

3) in Nachtripper (*gonorrhoea secundaria l. posthuma*), der eine Folge eines vorhergegangenen venerischen Trippers ist.

4) in Eicheltripper (*gonorrhoea l. leucorrhoea balani, gonorrhoea spuria s. notha*), wenn der Schleim nicht aus der Harnröhre, sondern aus der Eichelkrone kommt.

§. 2448.

Überdiefs theilt man den Tripper noch ein in idiopathischen und symptomatischen, chronischen, activen und passiven, u. s. w.

§. 2449.

Mit dem venerischen Tripper ist ein Brennen beim Urinlassen verbunden, aber nicht mit dem gutartigen Tripper, Nachtripper und Eicheltripper.

§. 2450.

Ursache. Diese besteht in Schwäche.

§. 2451.

Der Sitz des Trippers ist in den Morgagnischen Drüsen, aber nicht in den Samenbläschen. So wie auch die ausfliefsende Feuchtigkeit weder Same, noch Eiter, soudern Schleim ist.

§. 2452.

Ursächliche Momente. Venerischer Ansteckungsstoff, Erkältung, Onanie, zu häufiger Beischlaf, u. s. w.

§. 2453.

Prognosis. Das Übel ist mehr beschwerlich, als gefährlich.

§. 2454.

Curplan. Dieser besteht in dem Gebrauch der Reizmittel.

§. 2455.

Äufserlich sind Einspritzungen von Bleiwasser, Kalkwasser oder einer Auflösung von weifsem Vitriol anzuwenden.

§. 2456.

Die Cur des venerischen Trippers s. §. 1098 — 1103.

§. 2457.

Der Eicheltripper ist nicht venerischer Natur, erscheint gemeiniglich bei solchen, welche eine lange und enge Vorhaut haben, und wird durch öfteres Reinigen und Waschen mit Kalkwasser oder Bleiwasser gehoben.

§. 2458.

Die Behandlung des Nachtrippers s. §. 1104.

Satyriasis.

§. 2459.

Satyriasis, *Salacitas* ist eine anhaltende Steifigkeit des männlichen Gliedes mit einem Gefühl von Wollust verbunden.

Priapismus, *Tentigo* ist eine anhaltende Steifigkeit des männlichen Gliedes ohne Gefühl von Wollust.

Mentulagra oder Wollustkrampf ist eine anhaltende Steifigkeit des männlichen Gliedes mit Schmerz verbunden.

§. 2460.

Der Wollustkrampf kann zuweilen sehr heftig seyn, so dafs Blutharnen, u. s. w. erfolgt.

§. 2461.

Ursächliche Momente. Harnblasensteine, Anhäufung von Samen, scharfer Urin, wollüstige Phantasien, u. s. w.

§. 2462.

Überdiefs gesellt sich die anhaltende Steifigkeit des männlichen Gliedes zu andern Formen des Übelbefindens, als zum venerischen Tripper, der Wasserscheu, den Nieren- und Urinblasensteinen, der Melancholie, der Krätze, u. a. m.

§. 2463.

Curplan. Dieser ist reizend.

§. 2464.

Mohnsaft und Campher sind hier vorzüglich zu empfehlen.

Männliches Unvermögen.

§. 2465.

Unvermögen des Mannes zum Beischlafe (*Impotentia virilis*) ist entweder nur vorübergehend, z. E. nach Schrecken, oder anhaltend.

§. 2466.

Ursache. Diese besteht, bei sonst gehöriger Bildung der Zeugungstheile, in Schwäche.

§. 2467.

Ursächliche Momente. Zu häufiger Beischlaf, Onanie, hohes Alter, vorhergegangene heftige Krankheiten, Sorgen, Traurigkeit, u. s. w.

§. 2468.

Fehlerhafte Bildung oder Destruction der Zeugungstheile veranlassen auch Impotenz, als Verhärtung der Hoden, Amputation der männlichen Ruthe, Castration, u. s. w.

§. 2469.

Curplan. Ist Schwäche blofs Ursache, so besteht derselbe in Anwendung der Reizmittel.

§. 2470.

Innerlich sind vorzüglich Wein, Gewürze, Chocolade, Kräuterweine (s. Form. N. 10.), Mohnsaft, Naphte, u. d. gl. anzuwenden.

Als schnell wirkende Mittel sind Phosphorus, spanische Fliegentinctur und Stechapfelsamen zu empfehlen.

Auch lobt man zu diesem Behuf den Moschus, Ambra, Zibeth, Spargel, Zwiebeln, Salep, *Stincus marinus*, u. a. m.

§. 2471.

Äufserlich sind reizende Linimente (s. Form. N. 7. 8. 33. 34.) in die Zeugungstheile eingerieben, das Waschen und Baden der Zeugungsglieder in Wein, wäfsrigen oder weinigten Aufgüssen gewürzhafter Pflanzen, Melissen- Lavendel- Rosmarin- Ameisengeist, u. d. gl. anzuwenden.

Verengerung der Vorhaut.

§. 2472.

Verengerung der Vorhaut (*Phimosis*) besteht in einer Zusammenschnürung der Vorhaut über der Eichel, so dafs dieselbe nicht zurück und hinter die Eichel geschoben werden kann.

§. 2473.

Bei Knaben ist die Vorhaut jederzeit enge und mit einer kleinen Öffnung versehen; zuweilen bleibt

sie aber bis in das männliche Alter enge, wodurch das Urinlassen und der Beischlaf gehindert wird.

§. 2474.

Ursächliche Momente. Chanker an der Vorhaut, venerischer Tripper, Geschwüre an der Vorhaut, heftige Entzündung der Vorhaut, Verletzungen, u. s. w.

§. 2475.

Prognosis. Das Übel ist bedenklich, vorzüglich wenn es bei der Lustseuche vorkommt. Am häufigsten hömmt es bei Chankern an der Vorhaut vor, seltener bei dem Tripper. Es verursacht gänzlich gehinderten Abfluſs des Urins, Verwachsung der Vorhaut, u. s w. Die unter der Vorhaut und an der Eichel sich befindlichen Chanker greifen immer weiter um sich, der Abfluſs des Eiters wird gehindert, und die Eichel allmählig zerstört.

§. 2476.

Curplan. Dieser besteht in dem Gebrauch der Reizmittel, und im Nothfall findet die Operation statt.

§. 2477.

Gegen die Entzündung der Vorhaut sind äuſserlich Bähungen von Bleiwasser, einer Sublimatauflösung, lauer Milch, Kalkwasser oder einer wäſsrigen Auflösung des Opiums zu empfehlen.

§. 2478.

Gegen Chankers unter der Vorhaut kann

man sich der Einspritzungen von einer Sublimatauflösung zwischen der Vorhaut und der Eichel bedienen. Innerlich ist der Sublimat ebenfalls auzuwenden.

§. 2479.

Um das zwischen der Vorhaut und der Eichel angehäufte Eiter herauszulassen, so sind Einschnitte der Länge nach in die Vorhaut zu empfehlen.

§. 2480.

Sind alle äufserlich angewendeten Mittel vergeblich gebraucht worden, so findet dann die Operation statt. Diese besteht in der Durschschneidung der Vorhaut der Länge nach.

Einklemmung der Eichel.

§. 2481.

Einklemmung der Eichel oder spanischer Kragen (*Paraphimosis*) besteht in einer Zusammenschnürung der Vorhaut hinter der Eichel, so dafs dieselbe nicht nach vorne und über die Eichel gebracht werden kann.

§. 2482.

Ursächliche Momente. Chanker an der Vorhaut, venerischer Tripper, Verletzungen, bei Knaben Onanie, oder wenn sie die Vorhaut mit Gewalt zurückgezogen haben, u. s. w.

§. 2483.

Prognosis. Das Übel ist sehr gefährlich, und erfordert schleunige Hülfe. In kurzem entsteht Entzündung der Vorhaut, welche schnell in örtliche Absterbung übergeht.

§. 2484.

Curplan. Dieser besteht in der Anwendung der Reizmittel, und im Nothfalle findet die Operation statt.

§. 2485.

Äufserlich sind Bähungen von Bleiwasser oder einer wäfsrigen Auflösung des Mohnsaftes zu empfehlen.

§. 2486.

Kann die Vorhaut auf keine Art über die Eichel gezogen werden, so findet dann die Operation, nemlich die Durchschneidung der Vorhaut statt.

§. 2487.

Auch kann die Eichel in kaltes Wasser getaucht werden, wodurch sie sogleich zusammenschrumpft, und dann die Vorhaut darüber gezogen wird.

Krankheiten der Vorsteherdrüse.

§. 2488.

Zu den Krankheiten der Vorsteherdrüse gehören:

1) Vorsteherdrüsenentzündung (§. 665.).

2) Geschwulst der Vorsteherdrüse.
3) Verhärtung der Vorsteherdrüse (§. 2489.).

§. 2489.

Bei Verhärtung der Vorsteherdrüse fühlt man eine Geschwulst im Mittelfleische, dabei Beschwerden beim Urinlassen.

Das Übel ist schwer zu heben. Doch ist das Einreiben flüchtiger Linimente (s. Form. N. 7. 8.) zu empfehlen.

Krankheiten der Hoden.

§. 2490.

Zu den Krankheiten, denen die Hoden unterworfen sind, gehören:

1) Hodenentzündung (§. 669.).
2) Eiterung der Hoden.
3) Hodengeschwulst (§. 2491.).
4) Verhärtung der Hoden (§ 2491.).
5) Speckhodengeschwulst (§. 2491.).
6) Fleischgewächs der Hoden (§. 2491.).
7) Samengeschwulst (§. 2491.).
8) Wassersucht der Hoden (§. 2491.).
9) Wassserfleischgeschwulst (§. 2491.).

Hodengeschwulst.

§. 2491.

Die Hodengeschwülste (*tumores testiculorum*) theilt man ein:

1) in Sandklofs (*Testiculus venereus*, *hernia humoralis*), wenn der Hode verhärtet. Gemeiniglich ist er eine Folge der Lustseuche.

2) in Fleischgewächs der Hoden oder sogenannten Fleischbruch (*Sarcocele*, *Sarcoma scroti*), wenn die Geschwulst einem Fleischgewächs ähnlich ist.

3) in Wasserfleischgeschwulst oder sogenannten Wasserfleischbruch (*Hydrosarcocele*), wenn ein Fleischbruch mit einem Wasserbruch verbunden ist.

4) in Speckhodengeschwulst oder sogenannten Fettbruch (*Steatocele*, *lyparocele*), wenn in der Scheidenhaut des Samenstranges eine Fettgeschwulst entstanden ist.

5) in Steinbruch (*Porocele*), wenn der Fleischbruch hart, glänzend und ungleich ist.

6) in *Chondrocele*, wenn der Fleichbruch die Härte eines Knorpels hat.

7) in *Osteocele*, wenn der Fleischbruch verknöchert ist.

8) in Hodenwassersucht oder sogenannten Wasserbruch (*Hydrocele*), wenn in der Scheidenhaut des Hoden und des Samenstranges eine wäfsrige Geschwulst entstanden ist.

9) in Samenbruch (*Spermatocele*), wenn die Hodengeschwulst eine Folge von angehäuftem Samen ist.

10) in Samenstrangsgeschwulst oder sogenannten Krampfaderbruch (*Cirsocele*, *Va-*

ricocele, hernia varicosa), wenn der Samenstrang mehr oder weniger angeschwollen ist.

11) in sogenannten Wasserkrampfaderbruch (*Hydrocirsocele*), wenn ein Krampfaderbruch mit einem Wasserbruche verbunden ist.

§. 2492.

Ursächliche Momente. Quetschung der Hoden, Verletzungen, u. s. w.

§. 2493.

Prognosis. Diese ist, im Ganzen genommen, unbestimmt. Im Anfange der Geschwulst findet öfters die Zertheilung durch äufserlich angewendete Arzeneimittel statt, in der Folge aber selten oder nie. Die Verhärtung der Hoden geht leicht in Scirrhus oder in ein krebsartiges Geschwür über.

§. 2494.

Curplan. Dieser besteht in dem Gebrauch der Reizmittel und der Ätzmittel. Gemeiniglich mufs aber die Operation vorgenommen werden.

§. 2495.

Äufserlich kann man Bähungen von einem Schierlings - oder Eisenhütleinsaufgufs, und Breiumschläge von Alraun, Belladonne oder Kellerhalswurzel anwenden. Vorzüglich ist der Mohnsaft in Form eines Breies aufgelegt zu empfehlen. Auch können reizende Linimente (s. Form. N. 7. 8. 33.), Schierlingspflaster, das öftere Baden des Hodensackes in

einer wäfsrigen Auflösung des Mohnsaftes und das Waschen desselben mit Seifenspiritus oder Seifensiederlauge angewendet werden.

§. 2496.

Der Kranke mufs sich eines Tragbeutels (*suspensorium scroti*) bedienen. Auch ist ihm das viele Gehen zu untersagen.

§. 2497.

Bei der Hodenwassersucht sind verschiedene Operationen empfohlen worden. Diese sind die Operation durch Ätzmittel, die Anwendung des Troikars, der Schnitt, und der Gebrauch des Haarseils oder der Wieken.

§. 2498.

Bei unheilbaren Hodengeschwülsten, vorzüglich beim Fleischbruche, ist oft die Ausrottung des krankhaften Hodens (*castratio*) angezeigt.

Krankheiten des Hodensacks.

§. 2499.

Die Krankheiten, denen der Hodensack ist ausgesetzt, sind:

1) Hodensackentzündung (§. 2501.).
2) Eiterung des Hodensacks (2502.).
3) Krebs des Hodensacks (§. 2504.)
4) Erschlaffung des Hodensacks (§. 2503.).

5) Hodensackgeschwulst.
6) Hodensackbruch (§. 1722.).
7) Hodensackwassersucht (§. 2505.).
8) Wasserdarmbruch (§. 2506.).
9) Blutgeschwulst des Hodensacks (§. 2507.).

§. 2500.

Verschiedene Geschwülste der Hoden und des Hodensacks benennt man mit den Namen falsche Brüche (*herniae spuriae s. nothae*), und zwar den Wasserbruch, Fleischbruch, Krampfaderbruch und Blutbruch. Dieſs ist aber irrig und precär.

§. 2501.

Die Entzündung des Hodensacks geht zuweilen sehr schnell in örtliche Absterbung über, und erfordert äufserlich Bähungen von gewürzhaften Kräutern (§. 179), oder einer wäfsrigen Auflösung des Mohnsaftes oder von verdünntem Bleiwasser.

§. 2502.

Eine Eitergeschwulst des Hodensacks, welche man auch Eiterbruch (*empyocele*) nennt, erfordert das Herauslassen des Eiters vermittelst dem Schnitte.

§. 2503.

Bei zu grofser Erschlaffung des Hodensacks (*Rhacosis*) kann sich der Kranke eines Tragebeutels (*suspensorium scroti*) bedienen.

§. 2504.

Hodensackkrebs (*Cancer scroti*) zeigt sich zuerst als ein kleiner, harter Knoten, oder als ein kleines, flaches, unreines und schmerzhaftes Geschwür, mit harten und umgebogenen Rändern am Hodensacke.

Am häufigsten befällt er die Schornsteinfeger, daher er auch Schornsteinfegerkrebs (*cancer caminariorum*) genennt wird.

Wird der Hodensackkrebs nicht bei Zeiten ausgerottet, so greift er auch die Hoden und den Samenstrang an, endlich auch die Eingeweide des Unterleibes, und wird dann in kurzem tödlich.

Der schadhafte Theil des Hodensacks mufs sobald als möglich weggeschnitten werden.

Sind der Samenstrang und die Leistendrüsen schon schadhaft, so ist die Ausrottung zu spät.

§. 2505.

Bei der **Hodensackwassersucht** (*Hydrops scroti*) bemerkt man eine weiche, schwapperude, schmerzlose und glatte Geschwulst über den ganzen Hodensack, welche beim Druck mit dem Finger eine Grube zurückläfst. In der Folge nimmt sie auch das männliche Glied ein.

Der Kranke mufs sich eines Tragbeutels (*suspensorium scroti*) bedienen.

Äufserlich sind Bähungen und Baden in warmen Bleiwasser oder Kalkwasser zu empfehlen.

Die Ausleerung des Wassers vermittelst der Haarseile, des Troikars, der Stiche oder der Einschnitte ist nicht geradezu zu empfehlen, weil hierauf leicht örtliche Absterbung eintritt.

§. 2506.

Wasserdarmbruch (*Hydroenterocele*) nennt man einen Bruch, in dessen Bruchsacke sich Wasser angehäuft hat. Dieſs geschieht gemeiniglich bei einem alten Bruche, wo die Därme lange aus dem Unterleibe ausgetreten sind.

§. 2507.

Blutgeschwulst des Hodensacks, welche man auch Blutbruch (*Haematocele*) nennt, ist eine Anhäufung von ausgetretenem Blute im Hodensacke, welche durch äuſserliche Gewaltthätigkeit entstanden ist.

Die Herauslassung des Blutes geschieht hier vermittelst des Troikars oder der Lancette.

Krankheiten der weiblichen Zeugungstheile.

§. 2508.

Die weiblichen Geschlechtstheile bestehen aus mancherlei Organen, und zwar aus der Mutterscheide, den Schamlippen, dem Kitzler, der Gebärmutter und den Eierstöcken.

§. 2509.

Die Krankheiten der weiblichen Geschlechtstheile werde ich bei den Krankheiten der Weiber abhandeln.

Krankheiten des Kitzlers.

§. 2510.

Zu den Krankheiten des Kitzlers gehören:

1) Chanker am Kitzler (§. 1078.).
2) Galanteriebeulen (§. 2438.).
3) Krebs des Kitzlers.

Krankheiten der Schamlippen.

§. 2511.

Krankheiten der Schamlippen sind:

1) Schamlippenentzündung (§. 2512.).
2) Chanker an den Schamlippen (§. 1078.).
3) Galanteriebeulen (§. 2438.).
4) Krystallblasen (§. 2437.).

§. 2512.

Die Schamlippenentzündung (*Inflammatio labiorum pudendi*) entsteht vom Reiben, Gehen bei heifser Witterung, Verletzungen, Unreinlichkeit, scharfen Urin, weifsen Flusse, schwerer Geburt, u. s. w. und erfordert äufserlich Bähungen von gewürzhaften Kräutern (§. 179.).

Krankheiten der Mutterscheide.

§. 2513.

Zu den Krankheiten, denen die Mutterscheide unterworfen ist, gehören:

1) Mutterscheidenentzündung (§. 655.).
2) Mutterscheidenbruch (§. 1703.).
3) Vorfall der Mutterscheide (§. 2514.).
4) Polypen in der Mutterscheide.
5) Krystallblasen (§. 2437.).
6) Feigwarzen (§. 2323.).
7) Verschliefsung des Jungferhäutchens (§. 2515.).
8) Verwachsung der Mutterscheide (§. 2515.).
9) weifser Flufs (§. 2607.).
10) Mutterwuth (§. 2617.).

§. 2514.

Der Vorfall der Mutterscheide (*Prolapsus l. Procidentia vaginae uteri, Colpoptosis*) entsteht von äufserer Gewaltthätigkeit, schwerer Geburt, starkem Erbrechen, u. s. w. und wird durch die Zurückbringung gehoben.

§. 2515.

Eine Verschliefsung des Jungferhäutchens (*Imperforatio Hymenis*) oder Verwachsung der Mutterscheide (*Imperforatio Vulvae*) erfordert die Operation.

Krankheiten der Gebärmutter.

§. 2516.

Die Gebärmutter ist verschiedenen Krankheiten unterworfen. Diese sind:

1) Gebärmutterentzündung (§. 649.).
2) Eiterung der Gebärmutter (§. 2517.).
3) Gebärmuttergeschwür.
4) Scirrhus und Krebs der Gebärmutter (§. 2522).
5) Mola (§. 2518.).
6) Mutterpolyp (§. 2529.).
7) Vorfall der Gebärmutter (§. 2519.).
8) Umkehrung der Gebärmutter (§. 2520.).
9) Schiefliegen der Gebärmutter (*Hysteroloxia*).
10) Wunden der Gebärmutter.
11) Wassersucht der Gebärmutter (§ 2521.).
12) Mutterblutfluss (§. 2533.).

§. 2517.

Die Eiterung der Gebärmutter (*exulceratio uteri*) erkennt man aus der vorhergegangenen Gebärmutterentzündung, drückendem Schmerze im Becken und Ausflusse des Eiters aus der Mutterscheide.

Hier sind reizende Einspritzungen (s. Form. N. 27.) in die Mutterscheide zu empfehlen.

§. 2518.

Mola ist ein Gewächs in der Gebärmutter, wel-

ches mit derselben durch Gefäfse verbunden ist, und von abgestofsenen Eierchen oder extravasirten Feuchtigkeiten entsteht.

Sie veranlassen zuweilen starke Mutterblutflüsse, geben den Schein von Schwangerschaft, und erzeugen falsche Wehen.

Gemeiniglich werden sie vermittelst der erregten Wehen aus der Gebärmutter fortgestofsen.

§. 2519.

Beim Vorfall der Gebärmutter (*Prolapsus s. Procidentia uteri*) sinkt die Gebärmutter entweder nur zum Theil in die Mutterscheide (unvollkommener Gebärmuttervorfall, *Procidentia uteri incompleta*), oder sie sinkt bis zur Scham herab (vollkommener Gebärmuttervorfall, *Procidentia uteri completa*). Ersterer Fall ereignet sich vorzüglich bei unverheiratheten Frauenzimmern, letzterer aber bei solchen, welche schon geboren haben.

Hier ist die Zurückbringung der vorgefallenen Gebärmutter angezeigt. Dann sind reizende Einsprizzungen (s. Form. N. 27.) in die Mutterscheide zu empfehlen. Auch ist ein Mutterkranz (*pessarium*) anzuwenden.

§. 2520.

Eine Umkehrung der Gebärmutter (*Inversio uteri*, *Hysteroptosis*) tritt bei gebärenden Weibern (§. 2659.) ein.

§. 2521.

Die Wassersucht der Gebärmutter (*Hy-*

drops uteri) ist schwer zu erkennen. Fluctuation ist äufserlich nicht wahrzunehmen, doch ist eine Geschwulst über der Schamgegend, mit einem Gefühl von Schwere verbunden, vorhanden.

Man darf sie aber nicht mit der Schwangerschaft verwechseln.

Der Curplan ist reizend.

Gebärmutterkrebs.

§. 2522.

Der Krebs der Gebärmutter (*Cancer uteri*) entsteht gewöhnlich aus einem Scirrhus, zuweilen ist er aber auch die Folge eines bösartigen Geschwurs.

§. 2523.

Diagnosis. Schmerz und Gefühl von Schwere im Becken, gestörter, unterdrückter oder unordentlicher Monatsfluſs, harter, rauher und schmerzhafter Muttermund, Schmerzen beim Beischlafe.

Hierzu gesellen sich Stuhl- und Harnzwang, Erbrechen, weiſser Fluſs, u. s. w.

§. 2524.

Geht der Scirrhus in Krebs über, so wird der Schmerz sehr heftig und stechend; und bei offnem Krebse flieſst eine dünne, schwarzbräunliche und stinkende Gauche aus der Mutterscheide.

§. 2525.

Man muſs sich hüten, den Scirrhus und Krebs

der Gebärmutter mit der Schwangerschaft zu verwechseln.

§. 2526.

Prognosis. Das Übel ist jederzeit bedenklich. Oft geht der Scirrhus in Krebs über. Leicht gesellt sich Wassersucht hinzu. Ein Scirrhus der Gebärmutter ist schwer zu heilen, der Krebs nie. Die Conception wird hierdurch erschwert. Bei Schwangern erfolgt leicht Abortus. Der offne Krebs erzeugt Abzehrung, welche endlich in Tod übergeht.

§. 2527.

Ursächliche Momente. Traurigkeit, Mifshandlung der Gebärmutter bei einer schweren Geburt, u. s. w.

§. 2528.

Curplan s. §. 949. Auch sind reizende Einspritzungen in die Mutterscheide zu empfehlen.

Mutterpolyp.

§. 2529.

Der Mutterpolyp (*Cercosis, Polypus uteri*) unterscheidet sich von der *Mola* dadurch, dafs letztere mit der Gebärmutter blofs durch Gefäfse verbunden ist, ersterer aber mit der Gebärmutter eine und dieselbe Substanz ausmacht.

§. 2530.

Anfänglich ist der Mutterpolyp klein und kaum merklich, und wächst nur allmählig.

Sobald er eine gewisse Grölse erreicht hat, so steigt er auch durch den Muttermund in die Mutterscheide herab, wächst hier schneller, als zuvor, und verursacht nun beträchtliche Beschwerden. Er erregt häufige beträchtliche Blutflüsse, welche die Kranke sehr entkräften. Er drückt die Blase und den Mastdarm, und stört dadurch die Ausleerungen des Koths und Urins mehr oder weniger.

Endlich fällt derselbe auch aus der Mutterscheide heraus, zieht den Boden der Gebärmutter mit sich herab, und verursacht eine Umkehrung der Gebärmutter.

Zuweilen wird er auch durch den herabfliefsenden Harn oder durch äufseres Reiben entzündet und schmerzhaft.

§. 2531.

Ein in die Mutterscheide herabgetretener Polyp unterscheidet sich von dem Muttervorfall dadurch:

1) Der Mutterpolyp gleicht einer umgekehrten Birn, unten ist er nemlich am dicksten, und höher hinauf wird er allmählig dünner. Der Muttervorfall hingegen ist unten schmal, und wird heraufwärts allmählig dicker.

2) Der Muttervorfall kann leicht zurückgedrückt werden, wobei die Kranke sich erleichtert fühlt. Der Mutterpolyp hingegen kann nicht zurückgedrückt werden, und verursacht während dem Drucke grofse Beschwerden.

3) Der Mutterpolyp ist weicher und nicht so empfindlich, als die herabgefallne Gebärmutter.

4) Auch kann man aus der Lage des Muttermundes den Mutterpolyp von dem Muttervorfall unterscheiden.

§. 2532.

Curplan. Dieser besteht in der Unterbindung des Polypen.

Mutterblutfluſs.

§. 2533.

Mutterblutfluſs, Mutterblutsturz (*Haemorrhagia uteri*) bezeichnet einen Abgang des Blutes aus der Gebärmutter, der nicht mit dem Monatsflusse und dem Kindbetterinnenflusse in Verbindung steht.

§. 2534.

Die Mutterblutflüsse entstehen bei Schwangern am häufigsten, seltener aufserhalb der Schwangerschaft.

§. 2535.

Vorboten sind: Ängstlichkeit, Schwere der Lenden, Jucken und Hitze in der Mutterscheide, Ohrenbrausen, u. s. w.

§. 2536.

Ursächliche Momente. Starker Fall oder Stofs auf den Unterleib, Mutterpolypen, gewaltsame Trennung der Nachgeburt, Ärger, Traurigkeit, u. s. w.

§. 2537.

Prognosis. Die Gefahr ist unbestimmt. Starke Mutterblutflüsse sind jederzeit bedenklich, und entkräften den Körper. Bei Schwangern verursachen sie leicht Abortus.

§. 2538.

Curplan. Dieser ist reizend.

§. 2539.

Innerlich sind Zimmttinctur und Mohnsaft zu empfehlen.

Äufserlich sind Einspritzungen in die Mutterscheide von einem Salbei- oder Schafgarbenaufgufs, Bleiwasser, und einer Auflösung von Alaun oder weifsem Vitriol zu gebrauchen. Auch kann man sich der Bähungen von einer wäfsrigen Auflösung des Mohnsaftes auf den Unterleib bedienen.

Krankheiten der Eierstöcke.

§. 2540.

Zu den Krankheiten der Eierstöcke gehören:

1) Wassersucht der Eierstöcke (§. 2541).
2) Verhärtung der Eierstöcke.

§. 2541.

Die Wassersucht des Eierstocks (*Hydrops ovarii*) ist schwer zu erkennen. Äufserlich ist am Unterleibe eine Geschwulst wahrzunehmen.

Das Übel ist gemeiniglich nur unfruchtbaren und alten Weibespersonen eigen.

Hier ist wenig auszurichten.

Krankheiten der äufsern Gliedmafsen.

§. 2542.

Die äufsern Gliedmafsen sind als obere und als untere zu unterscheiden. Zu ersteren gehören der Oberarm, der Unterarm, die Hand und die Finger. Zu letzteren der Oberschenkel, der Unterschenkel, der Fufs und die Zehen.

Krankheiten der Hände.

§. 2543.

Zu den Krankheiten der Hände gehören:

1) Schwielen an Händen (§. 2544.).
2) Handweh (*Chiragra*, §. 1151).
3) Wunden der Haad.
4) Abscefs der Hand.
5) Flechsenspringen (*subsultus tendinum*), welches in Zuckungen der Hände besteht.
6) Zittern der Hände.

§. 2544.

Schwielen an Händen und Füfsen (*callus*) bestehen in einer verhärteten, unempfindlichen und dicken Oberhaut an den Händen und Füfsen, die von schwerer Arbeit und vielem Gehen entsteht.

Die Schwielen lassen sich am besten wegnehmen, wenn man den damit befallenen Theil in warmes Wasser halten läfst, und sie dann mit einem Messer abschält.

Krankheiten der Finger.

§. 2545.

Zu den Krankheiten, denen die Finger unterworfen sind, gehören:

1) Fingerwurm (§. 676).
2) Abscefs oder Geschwür an Fingern.
3) Zusammenwachsen der Finger (§. 2546.).
4) Verletzungen der Finger.
5) Verrenkung der Finger (*luxatio digitorum*).
6) Beinbruch der Finger (*fractura ossium digitorum*).
7) Steifigkeit der Finger.
8) Beinfrafs der Finger (*caries ossium digitorum*).

§. 2546.

Zusammengewachsene Finger oder Zehen sind vermittelst eines scharfen Messers von einander zu trennen.

Krankheiten der Nägel.

§. 2547.

Krankheiten der Nägel sind:

1) Abfallen der Nägel (§. 2548.).

2) Nagelgeschwür.

3) Nietnagel (§. 2549.).

§. 2548.

Abfallen der Nägel (*Onychoptosis*) entsteht bei mancherlei Formen des Übelbefindens, z. B. bei der Elephantiasis, hectischem Fieber, u. a. m.

Hier ist äufserlich das Bleicerat anzuwenden.

§. 2549.

Unter Nietnagel versteht man diejenigen kleinen Häutchen, welche sich an den Wurzeln der Nägel lostrennen.

Sie dürfen nicht abgerissen werden, weil sonst Schmerzen, ja wohl gar Nagelgeschwüre entstehen.

Am besten ist es, sie dicht an der Haut mit einer feinen Scheere abzuschneiden.

Krankheiten der Füfse.

§. 2550.

Zu den Krankheiten, denen die Füfse sind ausgesetzt, gehören:

1) Fufsgeschwulst (§. 1614.).

2) Fufsgeschwür (§. 917.).

3) Wadenkrampf (§. 1229.).

4) Abscefs des Hüftgelenks (*Abscessus ischiadicus*).

5) Schenkelschmerz (§. 1150.).
6) Knieweh (*Gonagra*, §. 1151.).
7) Krümmung der Füfse (§. 2551. 1552.).
8) Verrenkung des Fufses (*luxatio pedis*).
9) Zerreifsung der Achillessehne (§. 2553.).
10) Schwielen an Füfsen (§. 2544.).

§. 2551.

Die Krümmung der Füfse (*Curvatura pedum*) unterscheidet man:

1) als *Vari* (Pferdefüfse, Klumpfüfse, Klopffüfse, Dohlfüfse), wenn die Füfse und die Knie einwärts gebogen sind.

2) als *Valgi*, wenn die Füfse und die Knie auswärts gebogen sind.

§. 2552.

Die Krümmung der Füfse ist entweder angeboren, oder ist eine Folge der englischen Krankheit. Sie erfordert den Gebrauch der Maschinen.

§. 2553.

Die Zerreifsung der Fersensehne oder Achillessehne (*laceratio tendinis Achillis*) erfolgt leicht nach einer starken Anstrengung. Während dafs die Zerreifsung geschieht, so hört man ein Knacken, als wenn plötzlich eine Nufs unter den Fersen wäre aufgetreten worden.

Die Heilung besteht in der Vereinigung der beiden Enden der zerrifsnen Sehne, und zwar vermittelst eines angemessenen Verbandes.

Krankheiten der Zehen.

§. 2554.

Zu den Krankheiten der Zehen gehören:

1) Verrenkung der Zehen (*Luxatio digitorum pedum*).

2) Beinbruch der Zehen (*Fractura ossium digitorum pedis*).

3) Verwachsen der Zehen (§. 2546.).

4) Verletzungen der Zehen.

5) Beinfrafs der Zehen (*Caries ossium digitorum pedis*).

6) Örtliche Absterbung der Zehen (§. 2555.).

§. 2555.

Die örtliche Absterbung der Zehen (*Sphacelus digitorum pedum*, *Melasma*) zeigt sich anfangs als ein schwarzer oder bleifarbiger Fleck an der innern Seite der kleinen Zehe, von welcher jederzeit die Haut abgeht.

Der Mohnsaft ist hier sowohl innerlich, als äusserlich zu empfehlen.

Beinbrüche und Verrenkungen des Schlüsselbeins und der obern und untern Extremitäten.

§. 2556.

Der Beinbruch des Schlüsselbeins (*Fractura claviculae*) kömmt häufiger, als die Verrenkung des Schlüsselbeins (*Luxatio clavicu-lae*) vor.

§. 2557.

Den Beinbruch des Schlüsselbeins erkennt man sowohl an dem Gefühl, als an dem Geräusch der rauhen Knochenenden. Die Schulter und der Arm sinken hier herab, und fallen vorwärts auf die Brust; die Gegend um das Schlüsselbein schwillt auf und wird schmerzhaft, und die Bewegung des Oberarms ist gehindert.

§. 2558.

Der Beinbruch des Schulterblatts (*Fractura scapulae*) findet seltener statt, als der der mehresten anderen Knochen. Er erfordert die gewöhnliche Behandlung (§. 1770. 1771.).

§. 2559.

Beinbrüche des Oberarms (*Fractura ossis brachii s. humeri*), des Unterarms (*Fractura antibrachii*), der Handwurzelbeine (*Fractura ossium*

carpi) und der Beine der Mittelhand (*Fractura ossium metacarpi*) sind leicht zu erkennen.

§. 2560.

Die Verrenkung des Oberarms (*Luxatio humeri l. brachii*) erkennt man aus der schmerzhaften Bewegung des Arms, und der Unmöglichkeit, ihn auszustrecken, aus einer Geschwulst unter dem Schlüsselbeine und aus einer Grube unter der Schulterhöhe.

§. 2561.

Die Verrenkung des Unterarms (*Luxatio antibrachii*) geschieht nach hinten, nach innen und nach aufsen; nie aber nach vorne, weil das Olecranon dagegen steht, es sey denn, dafs solches zugleich gebrochen wäre.

Bei einer Verrenkung des Unterarms nach hinten ist der leidende Arm kürzer, als der gesunde, und dabei gebogen, das Olecranon ist sehr nach hinten in die Höhe gewichen, und bei der Ausdehnung des Arms vermehren sich die Schmerzen.

Bei der Verrenkung des Unterarms nach innen ragt die Ellbogenröhre nach innen hervor, und der Arm ist ein wenig gebogen.

§. 2562.

Beinbrüche des Oberschenkels (*Fractura ossis femoris*), des Unterschenkels (*Fractura*

cruris), der Kniescheibe (*Fractura patellae l. rotulae*), der Knochen der Fufswurzel (*Fractura ossium tarsi*) und der Knochen des Mittelfufses (*Fractura ossium metatarsi*) sind leicht zu erkennen.

§. 2563.

Die Verrenkung des Schenkels (*Luxatio ossis femoris*) geschieht entweder nach innen und unten, oder nach aufsen und oben, oder nach aussen und unten. Am häufigsten kömmt sie aber nach innen vor.

Bei einer Verrenkung des Schenkels nach innen und unten ist der leidende Fufs länger, als der gesunde, und dabei nach aufsen gedreht, das Knie halb gebogen, und bei der Drehung des Fufses nach innen werden die Schmerzen vermehrt; gegen die Scham zu bemerkt man eine Erhabenheit, die von dem hieher gewichenen Kopf des Schenkels entsteht; der Hinterbacken der leidenden Seite ist platt.

Bei einer Verrenkung des Schenkels nach aussen und oben ist der leidende Fufs kürzer, als der gesunde, und dabei nach innen gedreht, und bei der Drehung des Fufses nach aufsen werden die Schmerzen vermehrt.

Bei einer Verrenkung des Schenkels nach aussen und unten ist der leidende Fufs länger, als der gesunde, und dabei nach innen gedreht, und bei der

Drehung des Fulses nach aussen werden die Schmerzen vermehrt.

§. 2564.

Die Verrenkung der Kniescheibe (*Luxatio patellae*), des Schienbeins (*Luxatio tibiae*) und des Fulses (*Luxatio pedis*) sind leicht zu erkennen.

Krankheiten

des

weiblichen Geschlechts.

Krankheiten der Frauenzimmer.

§. 2565.

Das weibliche Geschlecht ist selbst im gesunden Zustande Veränderungen unterworfen.

Diese Veränderungen bestehen im Zustande der Kindheit, der Mannbarkeit, der Schwangerschaft und des hohen Alters.

§. 2566.

Von den Krankheiten des weiblichen Geschlechts im Zustande der Kindheit s. Krankh. der Kinder.

Von den Krankheiten des weiblichen Geschlechts im Zustande des hohen Alters s. Krankh. d. Greise.

Von den Krankheiten des weiblichen Geschlechts im Zustande der Schwangerschaft s. Krankh. der Schwangern.

§. 2567.

Bei den mannbaren oder erwachsenen Frauenzimmern unterscheidet man vorzüglich den ungeschwängerten und den geschwängerten Zustand.

§. 2568.

Die Krankheiten der erwachsenen Frauenzimmer zerfallen aber in Krankheiten des weiblichen Geschlechts überhaupt, in Krankheiten der Schwangern, der Gebärenden, der Wöchnerinnen und der Säugenden.

Krankheiten des weiblichen Geschlechts überhaupt.

§. 2569.

Das weibliche Geschlecht hat einen zarteren Körperbau und ein reizbareres Nervensystem, als das männliche Geschlecht. Daher ist dasselbe auch so häufig den Krämpfen unterworfen.

§. 2570.

Hier will ich aber blofs diejenigen Krankheiten abhandeln, welche dem weiblichen Geschlechte vermöge ihrer vor dem männlichen Geschlechte eigenthümlichen Theile, nemlich in Rücksicht der Brüste und der Geschlechtstheile, eigen sind.

§. 2571.

Mehrere Formen des Übelbefindens werde ich hier aber übergehen, weil ich dieselben schon an andern Orten abgehandelt habe. Hierher gehören:

1) Harnblasenvorfall (§. 2391.).
2) Mutterscheidenvorfall (§. 2514.).
3) Gebärmuttervorfall (§. 2519.).

4) Gebärmutterentzündung (§. 649.).
5) Mutterscheidenentzündung (655.).
6) Wassersucht der Gebärmutter (§. 2521.).
7) Wassersucht des Eierstocks (§. 2541.).
8) Gebärmutterkrebs (§. 2522.).
9) Mutterpolyp (§. 2529.).
10) Mutterscheidenbruch (§. 1703.).
11) Brustkrebs (§. 930.).
12) Schamlippenentzündung (§. 2512.).
13) Bleichsucht (§. 1022.).

§. 2572.

Nun will ich aber zu den übrigen, noch nicht abgehandelten Formen des Übelbefindens übergehen. Diese sind die Hysterie, krankhafter Monatsfluſs, weiſser Fluſs, Mutterwuth und Unfruchtbarkeit.

Hysterie.

§. 2573.

Hysterie (*malum hystericum*) besteht in einer zu groſsen Reizbarkeit, verbunden mit Krämpfen, irrigen Vorstellungen, Blähungen und Neigung zu Ohnmachten.

§. 2574.

Diagnosis. Groſse Empfindlichkeit, Schwindel, Neigung zu Ohnmachten, Krämpfe, Herzzittern, Angst, unruhiger und ängstlicher Schlaf, Unbehaglichkeit nach der Mahlzeit, ein Gefühl, als wenn ein Pfropf im Halse wäre (*globus hystericus*), halbseitiges

Kopfweh, heftiges Kopfweh, welches aber nur eine kleine Stelle am Kopfe einnimmt (*clavus hystericus*), Verstopfung des Stuhlganges, Blähungen und kalte Extremitäten.

§. 2575.

Die Hysterie hat grofse Ähnlichkeit mit der Hypochondrie. Auch leiden die hysterischen Frauenzimmer an der Einbildungskraft eben so sehr, als die Hypochondristen (§. 1337.).

Das weibliche Geschlecht leidet sehr häufig an der Hysterie.

§. 2576.

Ursache. Diese besteht in Schwäche.

§. 2577.

Ursächliche Momente. Leidenschaften, Traurigkeit, häufiges Gebären, anhaltender Ärger, zu häufiges Stillen, Verzärtelung in den Jugendjahren, unglückliche Liebe, unbefriedigte Wollust, u. s. w.

§. 2578.

Prognosis. Die Hysterie ist zwar an und für sich nicht bedenklich, kann aber zu andern Formen des Übelbefindens, als zu Convulsionen, Epilepsie, schweren Geburten, Ohnmachten, Kopfschmerzen, u. a. m. Anlafs geben.

Die Heilung schlägt sehr oft fehl, ist langweilig und erfordert viel Geduld.

§. 2579.

Curplan. Dieser besteht in dem Gebrauch der Reizmittel.

§. 2580.

Gewürzhafte und bittere Reizmittel sind hier vorzüglich zu empfehlen.

§. 2581.

Purgiermittel und Aderlässe sind hier gänzlich zu verwerfen.

§. 2582.

Zum Riechen dienen während dem Paroxysmus flüchtige und stark riechende Substanzen (§. 187.).

§. 2583.

Gegen Krämpfe, Ohnmachten und Herzklopfen sind innerlich ätherische Öle und versüfste Geister anzuwenden.

Die Behandlung der Beschwerden von Blähungen s. §. 2276.

§. 2584.

Gegen die Hysterie lobt man vorzüglich den stinkenden Asant, den Biebergeil und den Moschus. Ersterer ist aber zu übelriechend, und letzterer zu theuer, daher beide wenig brauchbar.

Kränkliches Monatliche.

§. 2585.

Im gesunden Zustande fängt der Monatsfluſs vom dreizehnten, vierzehnten, funfzehnten oder

sechzehnten Jahre an zu fliefsen, und hört mit dem fünf und vierzigsten, acht und vierzigsten oder funfzigsten Jahre auf.

Er dauert gewöhnlich drei bis fünf Tage, und kömmt alle vier Wochen wieder. Jedesmal gehen ungefähr sechs bis acht Unzen Blut ab.

§. 2586.

Jede Abweichung von dieser Ordnung ist als kränklich anzusehen.

§. 2587.

Der kränkliche Monatsfluſs wird daher eingetheilt:

1) in unordentliches Monatliche, wenn dasselbe nicht zu bestimmten Zeiten eintritt, und in Rücksicht seiner Dauer und Quantität des Blutes öfters verschieden ist, z. E. wenn dasselbe bald alle zwei, bald alle vier oder sechs Wochen eintritt, einmal drei, das anderemal sechs oder acht Tage dauert, zuweilen wenig, zuweilen viel Blut abgeht, im Durchschnitte zur gehörigen Zeit erscheint, zuweilen aber doch ausbleibt, u. s. w.

2) in verhaltenes Monatliche, wenn dasselbe bei gehörigem Alter nicht erscheint.

3) in zu früh erscheinendes Monatliche, wenn dasselbe vor dem zwölften Jahre, z. E. im achten oder neunten Jahre, eintritt.

4) in zu spät fortdauerndes Monatliche, wenn dasselbe noch nach dem funfzigsten Jahre fortdauert,

5) in zu sparsam fliefsendes Monatliche, wenn dasselbe nur ein oder zwei Tage dauert, oder während demselben nur einige Unzen Blut abgehen,

6) in zu stark fliefsendes Monatliche, wenn dasselbe sieben Tage und länger anhält, oder jedesmal ein bis zwei Pfund Blut abgehen, oder alle vierzehn Tage wieder kömmt.

7) in unterdrücktes Monatliche, wenn dasselbe zur gehörigen Zeit wegbleibt.

§. 2588.

Die Ursache des kränklichen Monatsflusses ist gemeiniglich Schwäche, und daher erfordert derselbe auch den reizenden Curplan.

§. 2589.

Dafs das unterdrückte Monatliche an andern Stellen des Körpers, z. E. durch die Ohren, Nase, Augen, Nabel, After, u. s. w. zum Vorschein kommen könne, ist irrig und precär. Denn es ist unerwiesen, dafs Blutflüsse aus andern Organen mit dem Monatlichen in Verbindung stehen, da auch oft bei übermäfsig fliefsendem Monatlichen Blutflüsse aus andern Theilen statt finden.

Verhaltenes Monatliche.

§. 2590.

Verhaltung oder **Ausbleiben des Monatlichen** (*retensio l. emansio fluxus menstrui*) dauert oft viele Jahre hindurch, und ist öfters mit kränklichen Zufällen verbunden.

§. 2591.

Ursache. Diese besteht in Schwäche des Körpers, vorzüglich der Blutgefäfse der Gebärmutter.

§. 2592.

Auch kann eine Verwachsung oder Verschliefsung des Muttermundes durch Häute oder Auswüchse, oder eine Verschliefsung der Mutterscheide durch ein undurchbohrtes Jungferhäutchen eine Verhaltung des Monatsflusses bewirken.

§. 2593.

Prognosis. Das Ausbleiben des Monatlichen ist mit mancherlei bedenklichen Zufällen verbunden, als mit der Bleichsucht, Kopfschmerzen, u. a. m.

§. 2594.

Curplan. Dieser ist reizend.

§. 2595.

Hier sind bittere Extracte, weinigte Aufgüsse gewürzhafter Pflanzen (s. Form. N. 10.) und Mohnsaft vorzüglich zu empfehlen.

§. 2596.

Sogenannte treibende Mittel, als Sadebaum, Aloe, schwarze Nieſswurz, Myrrhe, Safran, u. d. gl. sind mit groſser Vorsicht anzuwenden.

Unterdrücktes Monatliche.

§. 2597.

Unterdrückung des Monatsflusses (*suppressio fluxus menstrui*) **auſser der Schwangerschaft und dem Stillen ist jederzeit als Krankheit zu betrachten.**

§. 2598.

Ursache. Diese besteht in einer Schwäche der Blutgefäſse der Gebärmutter.

§. 2599.

Ursächliche Momente. Erkältung, Gemüthsaffecte und Leidenschaften, Traurigkeit, Schrekken, Ärger, Diätfehler, u. s. w.

§. 2600.

Curplan. Dieser besteht in dem innerlichen und äuſserlichen Gebrauch der Reizmittel.

§. 2601.

Innerlich sind Mohnsaft, weinigte Aufgüsse gewürzhafter Pflanzen, Pomeranzenschale, Calmus, u. d. gl. anzuwenden.

§. 2602.

Äufserlich sind warme Bäder, Dämpfe von einem Chamillen - Hollunder - Schafgarben - Pfeffermünzen - Polei - Krausemünzen, Majoran - oder Salbeiaufgufs an die Zeugungstheile gelassen, reizende Bähungen (§. 179.) auf den Unterleib, und Einspriz-zungen von einem Salbei - Pfeffermünzen - oder Poleiaufgufs in die Mutterscheide anzuwenden.

Übermäfsig fliefsendes Monatliche.

§. 2603.

Übermäfsig fliefsendes Monatliche darf nicht mit dem Mutterblutsturze (§. 2533.) verwechselt werden.

§. 2604.

Ursache. Diese besteht in Schwäche der der Gebärmutter Blut zuführenden Gefäfse.

§. 2605.

Ursächliche Momente. Öfteres Reiben der Geburtstheile, Tanzen, Reiten, zu häufiger Beischlaf, u. s. w.

§. 2606.

Curplan. Dieser besteht in der Anwendung der Reizmittel.

Weifser Flufs.

§. 2607.

Weifser Flufs (*Fluor albus, leucorrhoea, ca-*

tarrhus vulvae) besteht in einem ununterbrochenen Ausflusse eines Schleimes aus der Mutterscheide.

§. 2608.

Den weifsen Flufs theilt man ein:

1) in gewöhnlichen weifsen Flufs (*Fluor albus benignus*, gutartiger weifser Flufs), wenn derselbe nicht die Folge des venerischem Ansteckungsstoffes ist, sondern von andern Schädlichkeiten ist erzeugt worden.

2) in venerischen weifsen Flufs (*Fluor albus venereus*), wenn derselbe die Folge des venerischen Ansteckungsstoffes ist (§. 1108.).

§. 2609.

Der gewöhnliche weifse Flufs, obgleich er anfangs nur aus einem mehr oder weniger milderem Schleime besteht, wird doch oft so scharf, dafs er die benachbarten Theile wund macht.

§. 2610.

Ursache. Diese beruht auf Schwäche der Zeugungstheile.

§. 2611.

Ursächliche Momente. Zu häufiger Beischlaf, Onanie, schwere Geburten, häufige Abortus, Erkältung der Zeugungstheile, Diätfehler, schwächende Leidenschaften, Ärger, Traurigkeit, Sorgen, Unreinlichkeit der Geburtstheile, u. s. w.

§. 2612.

Prognosis. Der weifse Flufs ist nicht nur ein beschwerliches und unangenehmes Übel, sondern wird in der Folge auch bedenklich. Es gesellen sich mancherlei kränkliche Zufälle hinzu, als gläserne Augen mit blauen Ringen, Angst, Herzklopfen, gestörte Verdauung, unordentlicher Stuhlgang, unordentliches Monatliche, Lenden - Kreuz - und Rüchenschmerzen, Mattigkeit, Zittern, vorzüglich der Beine, Geschwulst des Gesichts, u. s. w.

Oft erfolgt dabei Unfruchtbarkeit, häufiges Mifsgebären, Abzehrung, hectisches Fieber.

Da der weifse Flufs den Körper allmählig entkräftet, so mufs endlich auch Abzehrung erfolgen.

Die Heilung ist oft sehr schwierig.

§. 2613.

Curplan. Dieser ist jederzeit reizend.

§. 2614.

Innerlich sind bittere Extracte, Naphte, versüfster Vitriol - Salpeter - oder Salzgeist, Pomeranzenschale, Calmus, Quafsie, Zimmt, Enzian, Mohnsaft, Calmus - Enzian - Pomeranzen - Wermuth - oder Bitterkleeessenz, Zimmttinctur, Salbei, geistiges Pfeffermünzen - oder Zimmtwasser, u. d. gl. zu empfehlen.

§. 2615.

Äufserlich sind Einspritzungen in die Mutterscheide von einem Salbei - Schafgarben - Pfeffermünzen-

Polei - Chamillen - Galgant - oder Pimpinellaufguſs, oder von Mohnsaft (s. Form. N. 28.), Bleiwasser, Kalkwasser, oder einer Auflösung des weiſsen Vitriols anzuwenden.

§. 2616.

Aderlässe und Purgiermittel sind hier gänzlich zu verwerfen.

Mutterwuth.

§. 2617.

Mutterwuth (*Nymphomania*, *Metromania*, *furor uterinus*) ist eine heftige Geilheit der Weibespersonen, die, wenn sie nicht befriediget wird, Wahnsinn erregen kann.

§. 2618.

Ursächliche Momente. Lebhafte Einbildungskraft, Beschäftigung mit wollüstigen Vorstellungen und Gegenständen, u. s. w.

§. 2619.

Curplan. Dieser ist reizend.

§. 2620.

Vorzüglich sind hier Mohnsaft, Campher und Bilsenkrautsextract zu empfehlen.

Unfruchtbarkeit.

§. 2621.

Unfruchtbarkeit (*Sterilitas*) ist bei mannbaren und jungen Frauenzimmern als kränklich anzusehen. Bei unmannbaren Mädchen und alten Weibspersonen findet sie aber jederzeit statt.

§. 2622.

Ursachen. Mangel des Monatsflusses, geschlossener Muttermund, Verhärtung der Eierstöcke, Zurückbringung der Gebärmutter, schiefe Lage der Gebärmutter, Mangel hinlänglicher Erregbarkeit der Gebärmutter, Verwachsung der Muttertrompeten, Verhärtung der Gebärmutter, u. a. m.

§. 2623.

Curplan. Das Übel ist oft unheilbar. Jederzeit muſs man suchen die Ursache des Übels aus dem Wege zu räumen.

Krankheiten der Schwangeren.

§. 2624.

Schwangere Personen (*gravidae*) sind wegen dem reizbaren Nervensysteme und wegen dem Druck der ausgedehnten Gebärmutter auf die benachbarten Theile mancherlei Formen des Übelbefindens unterworfen.

Ersterer Ursache wegen entstehen Kopf- Zahn- Leibesschmerzen, Erbrechen, Ekel, heftiger Appetit nach gewissen Sachen, u. s. w.

Letzterer Ursache wegen erfolgen Blutadergeschwülste an den Beinen, Verstopfung des Stuhlganges, Harnverhaltung, Fuſsgeschwulst, u. s. w.

§. 2625.

Weil bei der Schwangerschaft (*graviditas*) der Unterleib von dem in der Gebärmutter enthaltenen Foetus

sehr ausgedehnt ist, und bei manchen Formen des Übelbefindens ebenfalls auch eine Ausdehnung des Unterleibes statt findet, so kann folglich oft die Schwangerschaft mit manchen Formen des Übelbefindens verwechselt werden.

§. 2626.

Vorzüglich kann die schwangere Gebärmutter leicht mit Bauchwassersucht, Trommelsucht, Gebärmutterwassersucht, *Mola*, Mutterpolyp und Gebärmutterscirrhus verwechselt werden.

§. 2627.

Die schwangere Gebärmutter unterscheidet sich aber von der Bauchwassersucht, u. s. w. dadurch, dafs bei letzteren die Brüste mehr oder weniger welk und schlaff sind, der Muttermund entweder unverändert oder hart und verschlossen ist, und keine Bewegung von einer Frucht wahrgenommen wird.

§. 2628.

Mit dem Gebrauch der Brechmittel, drastischer Purgiermittel und Niefsmittel mufs man bei Schwangeren vorsichtig seyn, weil sie sonst leicht Abortus verursachen.

Auch müssen sich schwangere Personen vor heftiger Bewegung, Gemüthsaffecten, u. d. gl. hüten.

§. 2629.

Dafs bei Schwangeren jederzeit ein Überfluſs

von Blut statt finde, ist unerwiesen, da bei denselben oft ein Mangel an Blut existirt.

§. 2630.

Aderlässe stiften bei Schwangern im Ganzen genommen mehr Schaden, als Nutzen, entkräften dieselben unnützerweise, und geben leicht zu Abortus und schweren Geburten Anlafs.

§. 2631.

Die Diät mufs bei Schwangern wegen der Ernährung der Frucht beträchtlich nährend und reizend seyn.

Denselben aber Pflanzenkost und Wasser zu verordnen, aus Furcht, es möchte grofse Vollblütigkeit eintreten, ist sinnlos und absurd, und kann leicht zu Abortus Anlafs geben.

§. 2632.

Das Erbrechen und Kopf- oder Zahnschmerzen in den ersten Monaten der Schwangerschaft sind vorübergehend, und gemeiniglich von weniger Bedeutung.

§. 2633.

Die Sonnenflecken und Gelbsucht, welche oft während der Schwangerschaft eintreten, verschwinden wiederum nach Beendigung derselben.

§. 2634.

Nun will ich der den Schwangern jederzeit be-

denklichen Mutterblutflüsse erwähnen, und dann zum Mifsgebähren übergehen.

Mutterblutflüsse.

§. 2635.

Die Mutterblutflüsse (§. 2533.) sind den Schwangern jederzeit gefährlich, und verursachen leicht Abortus.

Daher müssen dieselben auch sobald als möglich gestillt werden.

Die Heilung derselben s. §. 2539.

§. 2636.

Der Monatsfluſs, der zuweilen bei manchen Schwangern noch fortdauert, darf nicht mit dem Mutterblutflusse verwechselt werden.

Mifsgebären.

§. 2637.

Mifsgebären (*Abortus*) ist der Abgang der Frucht aus der Gebärmutter vor der gehörigen Zeit.

§. 2638.

Am häufigsten entsteht der Abortus zwischen dem andern und dritten, und dem sechsten und siebenten Monate der Schwangerschaft.

§. 2639.

Blutflüsse aus der Gebärmutter verursachen leicht Abortus.

§. 2640.

Ursache. Diese besteht in Schwäche des Körpers, vorzüglich der Gebärmutter.

§. 2641.

Ursächliche Momente. Zu grofse Reizbarkeit der Gebärmutter, hysterische Disposition, starke Bewegung des Körpers, Reiten, heftiges Erbrechen, Niesen, starker Husten, zu häufiger Beischlaf, starker Fall oder Stofs auf den Unterleib, zu starke Aderlässe, Mutterblutflüsse, Mifsbrauch drastischer Purganzen, Gemüthsaffecte, Ärger, Schrecken, Stuhlzwang, vorhergegangene Formen des Übelbefindens, unvorsichtiger Sprung, unmäfsiges Tanzen, weifser Flufs.

§. 2642.

Zeichen des bevorstehenden Mifsgebährens: Starke Mutterblutflüsse, Abgang des Kindeswassers, Rücken- und Lendenschmerzen, Geburtswehen, Welkheit der Brüste, Angst.

§. 2643.

Zeichen der abgestorbenen Frucht: Mangel der Bewegung der Frucht, plötzliches Senken der Frucht, Schauer, öftere Ohnmachten, Welkseyn und Zusammenfallen der Brüste, Gefühl von Schwere im Becken, blasses Gesicht, kalte Schweifse, Kälte auf dem Unterleib, heftige Rücken- und Lendenschmerzen.

§. 2644.

Um den bevorstehenden Abortus zu verhüten, sind Reizmittel angezeigt. Vorzüglich sind hier Mohnsaft, Zimmttinctur, Pomeranzenessenz und Naphte zu empfehlen.

§. 2645.

Bei abgestorbener Frucht muſs man den Abgang derselben nach Umständen entweder der Natur überlassen, oder vermittelst der Kunst bewirken.

§. 2646.

Nach geschehenem Abgang der Frucht muſs man der Kranken eine nährende und reizende Diät und Wein verordnen. Auch sind hier bittere Extracte, weinigte Aufgüsse gewürzhafter Pflanzen (s. Form. N. 10.) und Mohnsaft anzuwenden.

Krankheiten der Gebärenden.

§. 2647.

Die Gebärenden (*Parturientes*) sind häufig falschen Wehen und schweren Geburten ausgesetzt.

§. 2648.

Die bevorstehende Geburt kündigen an ein Ausfluſs einer weiſslichten, serösen, bisweilen mit Blut vermischten Feuchtigkeit aus der Mutterscheide, Zittern der Hüften, Lendenschmerzen, erweiterter Muttermund und Röthe des Gesichtes.

Falsche Wehen.

§. 2649.

Die falschen Geburtswehen (*dolores spurii*) unterscheiden sich von den wahren Wehen dadurch, dafs bei ihnen der Muttermund mehr zusammengezogen, als erweitert wird.

§. 2650.

Ursache. Diese besteht in Schwäche.

§. 2651.

Ursächliche Momente. Hysterische Disposition, Ausleerung der Säfte durch Blutflüsse, Aderlässe, u. d. gl. Schrecken, Furcht, Blähungen, u. s. w.

§. 2652.

Curplan. Dieser ist reizend.

§. 2653.

Innerlich sind hier vorzüglich Mohnsaft und Naphte, und äufserlich flüchtige Linimente (s. Form. N. 7. 8.) in den Unterleib eingerieben, zu empfehlen.

Schwere Geburt.

§. 2654.

Schwere Geburt (*Dystocia, partus difficilis*) wird veranlafst:

1) durch Schwäche des ganzen Körpers sowohl, als auch vorzüglich der Gebärmutter, durch hysterische Disposition.

2) durch eine fehlerhafte Bildung des Beckens, welche oft Folge der englischen Krankheit ist.

3) durch eine ungewöhnliche Gröfse des Foetus.

§. 2655.

Bei Schwäche ist der reizende Curplan angezeigt. Vorzüglich sind hier Mohnsaft, Wein, Zimmttinctur, Naphte und versüfster Vitriolgeist zu empfehlen.

Äufserlich sind flüchtige Linimente in den Unterleib einzureiben, und Dämpfe von einem Pfeffermünzen - Salbei oder Poleiaufgufs an die Geburtstheile gelassen, anzuwenden.

§. 2656.

Bei einer fehlerhaften Bildung des Beckens ist die Geburt auf dem gewöhnlichen Wege unmöglich. In diesem Fall ist dann der Foetus vermittelst des Kaiserschnitts (*sectio caesarea*) zur Welt zu bringen. Der Schamknorpelschnitt (*Synchrondotomia*) ist zu schmerzhaft, und folglich zu verwerfen.

§. 2657.

Bei einer ungewöhnlichen Gröfse des Foetus ist derselbe vermittelst der Geburtszange u. d. gl. zur Welt zu bringen.

§. 2658.

Um die Geburt zu erleichtern, ist kurz zuvor Stuhlgang und Harnabfluss zu bewirken.

Umkehrung der Gebärmutter.

§. 2659.

Die Umkehrung der Gebärmutter (*Inversio uteri*) entsteht von einem unvorsichtigen Ziehen an der Nabelschnur der noch fest sitzenden Nachgeburt gleich nach der Entbindung.

§. 2660.

Diagnosis. Die umgekehrte Gebärmutter hat das Ansehen eines grofsen, röthlichen und blutigen Fleischklumpens, der aus der Mutterscheide heraus hängt.

§. 2661.

Prognosis. Das Übel ist gemeiniglich tödlich. Es ereignet sich aber äufserst selten.

§. 2662.

Curplan. Dieser besteht in der schleunigen Zurückbringung der Gebärmutter.

Krankheiten der Kindbetterinnen.

§. 2663.

Die Kindbetterinnen oder Wöchnerinnen (*Puerperae*) sind wegen der starken Anstrengung der Geburt mancherlei Formen des Übelbefindens ausgesetzt.

§. 2664.

Die Ursache hierzu beruht auf Schwäche, welche durch mancherlei Schädlichkeiten bewirkt wird. Diese sind:

1) hysterische Disposition.

2) vor der Geburt eingewirkte Schädlichkeiten, z. E. Ärger, Schrecken, Kummer, unzeitige Aderlässe, starke Blutflüsse, u. s. w.

3) während der Geburt zu heftige Anstrengung, Mifshandlung der Gebärmutter von der Hebamme oder dem Geburtshelfer, gewaltsame Trennung der Nachgeburt, unzeitig angestelltes Aderlafs, Mifsbrauch des Mohnsaftes, u. s. w.

4) nach der Geburt eingewirkte Schädlichkeiten, z. B. Erkältung, Schrecken, Ärger, Angst, zu frühzeitige Anstrengung des Körpers, u. s. w.

§. 2665.

Die Diät mufs bei Kindbetterinnen reizend und nährend seyn. Blofse vegetabilische Kost und Purganzen müssen vermieden werden.

§. 2666.

Am zweiten oder dritten Tage nach der Geburt, auch wohl später, treten bei der Wöchnerinn Schauer mit Hitze abwechselnd, und Kopf- und Rückenschmerzen ein, welche achtzehn bis vier und zwanzig Stunden, auch wohl einige Tage anhalten, und wobei sich Milch in den Brüsten ansammelt. Diesen Zustand nennt man Milchfieber (*Febris lactea*).

§. 2667.

Bei dem Eintritt des Milchfiebers entsteht auch

noch Druck, Spannung und Schmerz in den Brüsten, und der Kindbetterinnfluſs ist weiſs und flieſst sparsam.

§. 2668.

Bei dem Milchfieber sind Arzeneimittel unnöthig.

§. 2669.

Nach dem Milchfieber wird der Kindbetterinnfluſs wiederum stärker.

§. 2670.

Zuweilen sammelt sich Milch in den Brüsten ohne Fieber.

§. 2671.

Wenn sich aber keine Milch anhäuft, der Kindbetterinnfluſs ganz aufgehört hat, und nicht wiederum zum Vorschein kömmt, das Fieber (Milchfieber) aber demungeachtet noch fortdauert, so ist das sogenannte Kindbetterinnfieber zu befürchten.

§. 2672.

Von den Fehlern der Brüste und deren Warzen, s. Krankh. der Säugend.

§. 2673.

Daſs sich die in den Brüsten angehäufte Milch auf andere Organe werfen könne (*Metastases lactis*), z. E. auf das Gehirn, die Brust, u. s. w. oder zuweilen durch den Stuhlgang, Urinabfluſs, Schweiſs, Mund, u. d. gl. ausgeführt würde, ist irrig und precär.

§. 2674.

Will eine Frau ihr Kind nicht selbst stillen, so dienen äufserlich zur Vertreibung der Milch Umschläge von Erlenblättern, Körbel oder Petersilie, Wallrathspflaster mit Campher vermischt, Schierlingspflaster, Bilsenkrautspflaster, Dämpfe von einem Chamillen- oder Hollunderaufgufs an die Brüste gelassen, und das Waschen der Brüste mit verdünntem Weingeist oder verdünntem Bleiwasser.

Die Diät mufs nicht sehr reizend seyn. Zu sehr darf sie aber auch nicht eingeschränkt werden, weil die dadurch erzeugte Schwäche der Wöchnerinn nachtheilig werden kann. Auch ist hier der Gebrauch der Mittelsalze nicht zu empfehlen.

Überdiefs lobt man noch gewärmte und durchräucherte Kompressen auf die Brüste zu legen, das Handschuhtragen, Kleider mit langen und engen Ermeln, u. s. w.

§. 2675.

Dafs der Kindbetterinnfluss zurücktreten, sich auf andere Theile werfen, und mancherlei Formen des Übelbefindens, vorzüglich Kindbetterinnfieber und Gebärmutterentzündung hervorbringen könne, ist irrig und grundlos.

§. 2676.

Denn warum will man annehmen, dafs das Kindbetterinnfieber und die Gebärmutterentzündung eine Folge des unterdrückten Kindbetterinnflusses sey, da man vielmehr behaupten kann, dafs der unterdrückte

Kindbetterinnfluſs eine Folge des eingetretenen Kindbetterinnfiebers ist.

§. 2677.

Wie irrig und ungereimt ist der Schluſs: daſs, da bei dem Kinbbetterinnfieber der Kindbetterinnfluſs aufgehört hat zu flieſsen, das Fieber daher eine Folge des gestörten Kindbetterinnflusses sey.

§. 2678.

Die richtige Erklärung hiervon ist aber: daſs die nemliche Ursache, welche das Kindbetterinnfieber erzeugt, auch den Kindbetterinnfluſs stört und unterdrückt, und daſs keines die Folge des andern ist.

§. 2679.

Die Behandlung der Schmerzen nach der Geburt s. §. 1139. 1141. 1142.

§. 2680.

Die Kindbetterinnen sind öfters der Melancholie, Zuckungen, der Rose an den Brüsten und Händen, u. a. m. unterworfen.

§. 2681.

Die Melancholie ist hier gemeiniglich vorübergehend.

Die Behandlung der Zuckungen s. §. 1181 — 1184.

Die Behandlung der Rose s. §. 694.

Gebärmutterentzündung.

s. §. 649 — 654.

Kindbetterinnfluſs.

§. 2682.

Im gesunden Zustande dauert der Kindbetterinnfluſs (*Fluxus Lochiorum*) gewöhnlich neun bis ein und zwanzig Tage. Hört er sehr früh auf, oder dauert er länger, als gewöhnlich, so ist er dann als krankhaft anzusehen.

§. 2683.

Gleich nach der Entbindung gehen gewöhnlich ein bis anderthalb Pfund Blut ab; hierauf vermindert sich der Ausfluſs, so daſs täglich nur einige Unzen Blut abgehen; bis endlich bloſs eine weiſse Feuchtigkeit (weiſse Lochien, *Lochia alba*) aus den Geburtstheilen ausflieſst.

§ 2684.

Der kränkliche Kindbetterinnfluſs wird daher eingetheilt:

1) in unterdrückten Kindbetterinnfluſs, wenn derselbe vor der gehörigen Zeit zu flieſsen aufhört.

2) in übermäſsig flieſsenden Kindbetterinnfluſs, wenn er allzu stark oder allzu lang flieſst.

§. 2685.

Die Ursache des kränklichen Kindbetterinnflusses ist Schwäche, und deswegen erfordert derselbe auch den reizenden Curplan.

Unterdrückter Kindbetterinnfluſs.

§. 2686.

Unterdrückung des Kindbetterinnflusses (*Suppressio fluxus lochiorum*), wenn sie schon am ersten oder zweiten Tage nach der Entbindung eintritt, und nicht wiederum zurückkehrt, ist als kränklich anzusehen, und verdient daher auch berücksichtigt zu werden.

§. 2687.

Bei dem Eintritt des Milchfiebers hört der Kindbetterinnfluſs auf zu flieſsen, oder flieſst wenigstens sehr sparsam, kehrt aber nach Endigung desselben wiederum zurück.

§. 2688.

Ursache. Diese besteht in Schwäche der Gebärmutter.

§. 2689.

Ursächliche Momente. Erkältung, Gemüthsaffecte, Ärger, Schrecken, Furcht, u. s. w.

§. 2690.

Curplan. Dieser besteht in dem Gebrauch der Reizmittel.

§. 2691.

Innerlich sind wäſsrige oder weinigte Aufgüsse von Salbei, Pfeffermünze, Polei, Schafgarbe, Rosmarin oder Pomeranzenschale, und Mohnsaft zu empfehlen.

§. 2692.

Äufserlich sind Dämpfe von einem Hollunder- Schafgarben - oder Chamillenaufgufs, an die Geburtstheile gelassen, anzuwenden.

Übermäfsig fliefsender Kindbetterinnfluss.

§. 2693.

Übermäfsig fliefsender Kindbetterinnfluss (*fluxus lochiorum nimius*) darf nicht mit dem Mutterblutsturze (§. 2533.) verwechselt werden.

§. 2694.

Ursache. Diese besteht in Schwäche der Blutgefäfse der Gebärmutter.

§. 2695.

Ursächliche Momente. Gewaltsame Trennung des Mutterkuchens, gewaltsame Entbindung, hysterische Disposition, u. s. w.

§. 2696.

Curplan. Dieser ist reizend.

§. 2697.

Innerlich sind Mohnsaft und Zimmttinctur zu empfehlen.

§. 2698.

Äufserlich kann man sich der Einspritzungen von einer Alaunauflösung oder von einem Salbei- oder Schafgarbenaufgufs in die Mutterscheide bedienen.

Kindbetterinnfieber.

§. 2699.

Kindbetterinnfieber, Wochenfieber (*Febris puerperarum*) ist ein Fieber, welches die Kindbetterinnen häufig befällt, und bald mehr, bald weniger heftig ist.

§. 2700.

Das Kindbetterinnfieber kann schon den zweiten, dritten oder vierten Tag, aber auch erst den neunten, zwölften oder vierzehnten Tag nach der Entbindung eintreten. Dabei sind Schmerzen im Unterleibe mit Geschwulst desselben verbunden. Der Kindbetterinnfluss ist hier gemeiniglich gestört und unterdrückt.

§. 2701.

Ehemals hat man das Kindbetterinnfieber für ein Fieber eigener Art gehalten *), und auch darnach behandelt. Dieſs ist aber irrig, da es von dem gewöhnlichen Fieber nicht verschieden ist.

§. 2702.

Den Sitz und die Veranlassung zu diesem Fieber hat man von jeher verschieden angegeben.

---

*) Der Menschheit hat es von jeher zum Schaden gereicht, dafs man so verschiedene Arten von Fieber angenommen, nnd dieselben auch so verschieden behandelt hat; da es im Grunde doch nur ein Fieber giebt, welches unter sich blofs in Rücksicht der Heftigkeit differirt, und auch nur einerlei Curplan, nemlich den reizenden Curplan, erfordert.

Einige leiten es von verstopftem Kindbetterinnfluſs (wie z. E. Hippocrates, Boerhave, Astruc, u. a. m.), Andere von einer Versetzung der Milch (wie Puzos, van Swieten, Selle, u. a.), oder von unterdrückter Ausdünstung (wie Zeller), u. s. w. her.

Der Sitz des Übels besteht nach Einigen in einer Entzündung der Eingeweide (wie z. B. nach Hulme, u. a.), nach Anderen in einer Entzündung der Gebärmutter (wie nach Tissot), oder in einer Entzündung des Bauchfells (nach Hunter, Frank, u. a.), u. s. w.

§. 2703.

Ursache. Diese besteht in Schwäche, vorzüglich der Eingeweide des Unterleibes.

§. 2704.

Ursächliche Momente. Schwere Geburt, heftige Gemüthsaffecte und Leidenschaften, Kummer, Ärger, starke Erkältung, heftige Blutflüsse, unzeitig angestellte Aderlässe, u. s. w.

§. 2705.

Prognosis. Die Dauer des Übelbefindens sowohl, als die Gefahr, sind unbestimmt. Besteht das Fieber in Typhus, so ist grofse Gefahr vorhanden.

Die Erscheinung eines Friesels macht das Übel sehr bedenklich.

Zeichen der Besserung sind: wenn das Gesicht heiterer wird, der Kindbetterinnfluſs wiederum zu

fliefsen anfängt, völliges Bewufstseyn eintritt, die Angst abnimmt, das Athemholen freier wird, der Schmerz und die Spannung des Leibes nachlassen, u. s. w.

§. 2706.

Curplan. Dieser ist reizend (§. 320. 321. 339. 340.).

Krankheiten der Säugenden.

§. 2707.

Bei Säugenden oder stillenden Weibspersonen (*Lactantes*) mufs man sein Augenmerk vorzüglich auf die Brüste, und deren Verrichtnng, nemlich die Milchabsonderung, richten.

§. 2708.

Aber nicht jedes Frauenzimmer ist zum Säugen geschickt, sondern blofs solche, welche gute und hinlängliche Milch, und gesunde Brüste und Brustwarzen haben, und an keiner gefährlichen Krankheit leiden.

§. 2709.

Frauenzimmern hingegen, welche hysterisch, cachectisch oder schwindsüchtig sind, oder sonst an einer gefährlichen Form des Übelbefindens leiden, zu kurze Brustwarzen, verdorbene oder zu wenig Milch haben, mufs das Stillen untersagt werden.

Auch sind solche, welche sehr zornig sind, oder während dem Stillen ihr Monatliches behalten, zum Säugen wenig geschickt.

§. 2710.

Die Milch der Säugenden darf nicht blaulicht, sondern muſs weiſs seyn, und jeder Tropfen derselben muſs durchsichtig seyn.

§. 2711.

Nach Schrecken oder Ärger ist der Mutter oder Amme nicht erlaubt, ihrem Kinde die Brust zu reichen. Der Säugenden kann man hier etwas Mohnsaft oder versüſsten Vitriolgeist nehmen lassen.

§. 2712.

Bei Säugenden sind bittere Extracte, Säuren, Obst, stinkender Asant, u. a. m. nicht anzuwenden (§. 196.).

§. 2713.

Die Diät muſs bei Säugenden beträchtlich reizend seyn. Vorzüglich sind hier Fleischspeisen zu empfehlen. Die Pflanzenkost hingegen ist einzuschränken.

§. 2714.

Überdieſs muſs sich die säugende Person für Diätfehlern, heftigen Leidenschaften und Gemüthsaffecten, Wollust, Erkältung, u. d. gl. hüten.

§. 2715.

Die Säugenden mit Arzeneien zu überhäufen, ist unschicklich. Will man denselben aber ja etwas reichen, so sind, statt aller andern, oft unnützen, Mittel, gewürzhafte Reizmittel, vorzüglich Fenchel und Pomeranzenschale, zu empfehlen.

§. 2716.

Nun will ich zu den Krankheiten, denen die Säugenden vorzüglich unterworfen sind, übergehen. Diese sind:

1) Anhäufung von Milch (§. 2721.).
2) Mangel an Milch (§. 2722).
3) Entzündung der Brüste (§. 1730.).
4) Abscefs der Brüste (§. 2732.).
5) Milchknoten (§. 2728.).
6) Spalten an den Brustwarzen (§. 2734.).
7) Milchausfluſs (§. 2717.).

Milchausfluſs.

§. 2717.

Milchausfluſs (*Galactorrhoea*), wenn zu viel Milch aus den Brüsten ausfliefst, ist vorzüglich schwachen und cachectischen Perscnen nachtheilig, und entkräftet oft den Körper allzu sehr. Deswegen muſs ihm auch Einhalt gethan werden.

§. 2718.

Ursache. Diese beruht auf Schwäche der Milchgefäfse.

§. 2719.

Curplan. Dieser ist reizend.

§. 2720.

Äuſserlich ist das Waschen der Brüste mit Wein, Branntwein, Lavendel - oder Rosmaringeist, oder einem Salbei - Pfeffermünzen - Polei - Krausemünzen - oder Schafgarbenaufguſs zu empfehlen.

Anhäufung von Milch.

§. 2721.

Bei einer Anhäufung von Milch in den Brüsten ist die Milchpumpe (*antlia lactea*) anzuwenden. Die Diät darf hier nicht sehr reizend seyn.

Mangel an Milch.

§. 2722.

Mangel an Milch (*Agalactia*) tritt entweder schon gleich anfangs nach der Entbindung ein, oder ist erst in der Folge entstanden.

§. 2723.

Ursache. Diese beruht auf Schwäche.

§. 2724.

Ursächliche Momente. Erkältung der Brüste, Mangel der Nahrungsmittel, Verengerung der Milchkanäle in den Brüsten, Blutflüsse aus der Gebärmutter oder andern Theilen des Körpers, Durchfälle, heftige Gemüthsaffecte, Ärger, Schrecken, u. s. w.

§. 2725.

Curplan. Dieser besteht in dem innerlichen und äufserlichen Gebrauch der Reizmittel.

§. 2726.

Innerlich sind Pomeranzenschale, Pfeffermünze, Dill, Fenchel, Zimmt, u. d. gl. anzuwenden. Dabei mufs die Diät sehr reizend seyn.

§. 2727.

Äuſserlich sind reizende Bähungen (§. 179.) auf die Brust gelegt, anzuwenden.

Milchknoten.

§. 2728.

Die Milchknoten (*Nodi mammarum*) entstehen von gehindertem Ausflusse der Milch. Sie sind ohne Gefahr, und haben keine Anlage zum Krebse. Sie lassen sich leicht vertreiben.

§. 2729.

Die Cur besteht in Seifenumschlägen auf die Brüste mit oder ohne Campher, in der Auflegung des Melilottenpflasters mit Campher oder Safran vermischt, des Schierlingspflasters, eines reizenden Linimentes (s. Form. N. 8.), in Breiumschlägen aus Schierling, Bilsenkraut, Leinsamen und Safran, und in dem Gebrauch des Wallrathspflasters mit flüchtigem Hirschhornsalz versetzt.

Entzündung der Brüste.

§. 2730.

Die Entzündung der Brüste (*Inflammatio mammarum*) kann auch aufserdem bei Frauenzimmern, und zwar nach Quetschung, u. d. gl. vorkommen. Sie ist ohne Gefahr.

§. 2731.

Äufserlich sind Bähungen von Bleiwasser mit Semmelkrume vermischt, Bleicerat und Breiumschläge von Chamillen, oder Hollunderaufgufs mit Semmelkrume verbunden, auf die Brüste gelegt, anzuwenden.

Abscefs der Brüste.

§. 2732.

Bei eintretender Eiterung der Brüste sind Breiumschläge von Eibischkraut (s. Form. N. 18.), u. d. gl. auf die Brüste zu legen.

§. 2733.

Die Öffnung des Abscesses ist der Natur zu überlassen, oder wenigstens spät zu öffnen.

Aufspringen der Brustwarzen.

§. 2734.

Gegen Aufspringen oder Spalten der Brustwarzen (*Fissurae papillarum*) sind äufserlich Quittenschleim, Mandelöl, Eieröl, Wachsöl, Schleim von arabischem Gummi, Tragantschleim, und Kakaubutter zu empfehlen.

Dabei sind die Brustwarzen mit Warzendeckeln zu dedecken.

Allzu kurze Brustwarzen.

§. 2735.

Zur Hervorziehung allzu kurzer und tief steckender Warzen kann man sich der Milchpumpe (*antlia lactea*) bedienen.

Krankheiten

der Kinder.

Гдѣ пѣснь будетъ?

Krankheiten der Kinder.

§. 2736

Die Kinder sind Krankheiten unterworfen, an denen Erwachsene nie leiden, wie z. E. die englische Krankheit, Rückenspalte, innerer Wasserkopf, u. a. m. sind.

§. 2737.

Die Kinder sind manchen Krankheiten vorzüglich und häufig unterworfen, an denen Erwachsene seltener leiden, wie z. B. die Gehirnwassersucht, Würmer im Darmkanale, häutige Bräune, Schwämmchen, Wachsgrind, Keichhusten, Nabelbrüche, u. a. m. sind.

§. 2738.

Die Kinder haben einen zarten Körperbau und ein reizbares Nervensystem; daher sind dieselben auch so häufig den Zuckungen unterworfen.

§. 2739.

Bei Abhandlung der Krankheiten der Kinder nimmt man vorzüglich auf die Krankheiten Rücksicht, welche die Kinder in ihren ersten Lebensjahren befallen, nicht auf diejenigen, welchen sie späterhin ausgesetzt sind.

§. 2740.

Eine grofse Schwierigkeit bei der Behandlung der Krankheiten der Kinder besteht aber in dem Mangel der Sprache der Kinder, wozu noch die vielen, oft höchst widersinnigen und abgeschmackten Vorurtheile, der Mütter, Ammen und Wärterinnen gehören.

§. 2741.

Bei der Erforschung der Krankheiten der Kinder nehme man auf die Stellen am Körper Rücksicht, welche von denselben öfters befühlt werden; weil dieses Schmerz in diesen Theilen anzeigt.

§. 2742.

Die Kleidung der Kinder sey einfach, leicht, und nicht fest anliegend.

§. 2743.

Verzärtelung ist den Kindern sehr nachtheilig, indem sie dadurch zu Schwächlingen werden, und für zukünftige Krankheiten mehr empfänglich.

§. 2744.

Von der Anwendung der Arzeneimittel bei Kindern s. die §§. 86 — 88. 131. 189 — 192. 230. 261.

§. 2745.

Bei Kindern sind vorzüglich laue Bäder und das Waschen mit Seifenwasser zu empfehlen.

§. 2746.

Der Mifsbrauch der Purganzen bei Kin-

dern ist sehr grofs. Denn schon gleich nach der Geburt wird dem Kinde ein Laxiertränkchen unter dem Namen Mannasäftchen, Rhabarbersyrup, u. d. gl. gereicht. Einige Tage darauf wird ihm ein zweites gegeben. Und so fährt man alle ein oder zwei Wochen fort das Kind zu laxiren, unter dem nichtigen Vorwande, Schärfe und Unreinigkeiten auszuführen.

§. 2747.

Man glaubt freilich, dafs der Unterleib der Kinder von Schleim und Würmern strotze, und dafs diese zu entfernen, das vorzüglichste Augenmerk des Arztes sey.

Hier frage ich aber, was hat zu der Anhäufung von Schleim und Würmern Anlafs gegeben? Ist diese nicht in dem zu häufigen Gebrauche der Purgiermittel zu suchen?

Denn durch den zu öftern Gebrauch der Abführungsmittel wird der Darmkanal geschwächt, wodurch denn die Anhäufung von Schleim und Würmern erzeugt und begünstigt wird.

§. 2748.

Dafs Schwäche des Darmkanals bei Kindern von Natur statt finde, ist schwerlich zu glauben; wohl aber anzunehmen, dafs dieselbe durch Mifsbrauch der Purgiermittel, durch die Anwendung sehr fetter und öligter Speisen, u. s. w. hervorgebracht werde.

§. 2749.

Die Purganzen schwächen aber nicht nur den Darmkanal, sondern auch den ganzen Körper, entziehen demselben seine besten Säfte, entkräften ihn, und sind als die Quelle so mancher in der Folge entstandenen Form des Übelbefindens anzusehen.

§. 2750.

Daher schränke man den Gebrauch der Purganzen ein.

§. 2751.

Die Kinder dürfen auch nicht, wie es gewöhnlich ist, mit Arzeneien überhäuft werden. Denn nichts ist schädlicher, als diefs. Besser ist es, denselben nicht eher Arzenei zu reichen, als bis sie sich übel befinden.

§. 2752.

Aderlässe finden bei Kindern gar nicht statt.

Behandlung der Neugebornen.

§. 2753.

Bei Neugebornen sind laue Bäder und das Waschen mit Seifenwasser zu empfehlen.

§. 2754.

Gleich nach der Geburt untersucht man, nach vorhergegangenem Bade, ob der Rückgrat gespalten ist, der After verschlossen, die Eichel des männlichen Gliedes oder die weibliche Scham verwachsen, der äufsere Gehörgang mit einer dünnen Haut über-

zogen, der Kopf lang und spitzig gedrückt, Kopfgeschwulst oder Gehirnbruch, oder irgend eine Verrenkung vorhanden, u. s. w.

§. 2755.

Die Dosis der Arzeneimittel bei neugebornen Kindern muſs klein seyn, s. §. 190.

§. 2756.

Vorurtheil ist es, das Kind von dem sogenannten Mutterpeche (*meconium*) durch die erste Muttermilch (*colostrum*), oder durch Purganzen, als durch Manna- oder Rhabarbersäftchen, zu reinigen.

Besser ist es, dieses der Natur zu überlassen, oder einen Fenchelaufguſs mit Syrup vermischt zu geben.

§. 2757.

Wenn der Nabel nicht geheilt ist, so sind Compressen, mit warmen Wein befeuchtet, aufzulegen.

§. 2758.

Der Krankheiten, denen neugeborne Kinder ausgesetzt sind, sind mehrere, als Kinnbackenkrampf, Schälblasen, Eiterung der Augenlieder, Kopfgeschwulst, u. s. w.

Scheintod.

s. §. 1815 — 1819.

Schwäche.

§. 2759.

Bei Schwäche neugeborner Kinder sind

laue, mit Wein oder Branntwein vermischte, Bäder, Kräuterbäder (§. 178) und Malzbäder zu empfehlen.

Innerlich ist versüfster Vitriol-, Salpeter- oder Salzgeist, Mohnsaftstinctur, Salmiakgeist, geistiges Zimmt- oder Pfeffermünzenwasser, u. d. gl. anzuwenden.

Erdrückung.

s. §. — 1820 — 1822.

Vorkopf.

§. 2760.

Vorkopf besteht in einer Geschwulst der Bedeckungen des Kopfes, und rührt von einem, bei der Geburt erlittenen, Drucke her.

§. 2761.

Hier sind Bähungen von Aufgüssen gewürzhafter Kräuter (§. 179) zu empfehlen.

Zusammendrückung des Kopfes.

§. 2762.

Wenn der Kopf in der Geburt lang und spitzig gedrückt ist, so sind Bähungen von warmen Wein zu gebrauchen.

Gehirnbruch.

§. 2763.

Gehirnbruch (*Encephalocele*, *hernia cerebri*) besteht in dem Hervortreten des Gehirns und seiner

Häute durch eine ungewöhnliche Öffnung in einem Knochen des Hirnschädels, wodurch eine Geschwulst der äufseren Bedeckungen des Kopfes entsteht, die unschmerzhaft, weich und teigigt ist, dem Drucke nachgiebt, nach Entfernung desselben aber sogleich wieder ihre vorige Stelle einnimmt.

§. 2764.

Wenn man die Geschwulst läfst hängen und kalt werden, so entstehen heftige Schmerzen, ja sogar Zuckungen, welche sich bei Aufhebung der Geschwulst und gelinder Erwärmung sogleich verlieren.

§. 2765.

Prognosis. Das Übel ist sehr gefährlich, gemeiniglich unheilbar, und in kurzer Zeit tödlich.

§. 2766.

Curplan. Dieser besteht in allmähliger Zurückdrückung der Geschwulst.

Verwachsung gewöhnlicher Öffnungen.

§. 2767.

Bei Verwachsung des Afters, der Mutterscheide, des äufseren Gehörganges, der Eichel, u. d. gl. ist die Trennung vermittelst der Scheere oder des Messers zu bewirken.

Kinnbackenkrampf.

§. 2768.

Kinnbackenkrampf oder Wangenschörgen (*spasmus maxillae inferioris*) s. §. 1236.

§. 2769.

Verlauf. Anfänglich dumpfes, mit Angst und Unruhe verknüpftes, Geschrei.

Hierauf wird die untere Kinnlade steif und unbeweglich, und der Mund ganz verschlossen. Zuweilen bleibt der Mund aber auch offen.

Endlich wird das Schlingen unmöglich, und der Starrkrampf erstreckt sich über den Körper.

§. 2770.

Ursächliche Momente. Erkältung, zu nahes Unterbinden der Nabelschnur, u. s. w.

§. 2771.

Curplan s. §. 1245. 1246. Doch müssen die Gaben der Arzeneimittel beträchtlich kleiner seyn.

Augenentzündung.

§. 2772.

Die Augenentzündung bei neugebornen Kindern entsteht zwischen dem zweiten und vierzehnten Tage nach der Geburt.

§. 2773.

Verlauf. Geschwulst, Entzündung, Röthe und Schmerz der Augenlieder.

Hierauf erfolgt Eiterung der Meipbbomischen Drüsen, wobei die Augenlieder im Schlafe zusammenkleben.

Die Eiterung nimmt täglich zu, und die Hornhaut wird welk und trübe.

Endlich tritt Fieber ein, und es erfolgt zuletzt Blindheit oder der Tod.

§. 2774.

Ursächliche Momente. Erkältung, Rauch, kalte Luft, u. s. w.

§. 2775.

Curplan s. §. 467 — 472.

Schälblasen.

§. 2776.

Die Schälblasen bei neugebornen Kindern sind grofse Blasen, welche mit einem rothen und entzündeten Rande umgeben sind, eine gelbe Feuchtigkeit enthalten, zuerst an den Weichen, dann um den Nabel herum entstehen, und nach drei oder vier Tagen abtrocknen.

§. 2777.

Prognosis. Der Ausschlag ist ohne Gefahr.

§. 2778.

Die Blasen können aufgeschnitten werden.

Schluchzen.

§. 2779.

Bei neugebornen Kindern entsteht der Schluchzen von Erkältung oder Überladung des Magens,

und erfordert den Gebrauch erwärmter Tücher auf den Unterleib.

Behandlung der säugenden Kinder.

§. 2780.

Bei säugenden Kindern ist Reinlichkeit das vorzüglichste. Daher sind hier das öftere Waschen mit Seifenwasser und laue Bäder sehr zu empfehlen.

§. 2781.

Hindernisse, welche beim Säugen eintreten, sind:

1) von Seiten der Mutter, z. E. zu kurze oder aufgesprungene Brustwarzen, Mangel an Milch, u. a. m.

2) von Seiten des Kindes, z. B. zu kurzes Zungenband, u. s. w.

§. 2782.

Das Säugen mufs nicht beständig statt finden, sondern nur zu gewissen Zeiten, z. E. alle drei Stunden geschehen.

§. 2783.

Nach Ärger, Schrecken, u. d. gl. ist dem Kinde die Brust zu verweigern.

§. 2784.

Das heftige Schreien der Kinder zeigt selten Durst an, sondern gemeiniglich Schmerzen, Verunreinigung, Druck von Kleidungsstücken, u. s. w.

Irrig und höchst schädlich ist es daher, dem Kinde bei jedem Schreien die Brust zu reichen, weil der Magen dadurch unnütz überladen wird, und Zukkungen, englische Krankheit, Erbrechen, u. s. w. die Folgen davon sind.

§. 2785.

Kann oder will die Mutter ihr Kind nicht selbst stillen, so ist dasselbe entweder durch eine Amme zu säugen, oder ohne Muttermilch aufzuziehen.

§. 2786.

Bei Erwählung einer Amme sey man vorsichtig (§. 2708 — 2710.).

§. 2787.

Bei Aufziehung des Kindes ohne Muttermilch, dienen zur Ernährung desselben Hafer- oder Gerstendecoct mit Milch versetzt, Esels- Ziegen- oder Kuhmilch, zu Brei gestofsener und mit Wasser und Milch gekochter Zwieback, eine Eierdotter in einem Nösel Wasser zerrührt, leichte Bouillons, u. s. w.

§. 2788.

Die Entwöhnung des Kindes geschieht am besten zwischen dem achten und zwölften Monate.

§. 2789.

Der Säugling darf nicht stark eingewickelt werden, weil sonst durch den Druck mancherlei bedenkliche Zufälle entstehen können.

§. 2790.

Beim Tragen des Kindes mufs die Lage desselben öfters gewechselt werden; was auch beim Anlegen desselben an die Brust zu beobachten ist.

§. 2791.

Um das Schielen zu verhüten, legt man das Kind so, dafs das Licht gleichmäfsig von vorne in die Augen fällt.

Behandlung der Kinderkrankheiten.

§. 2792.

Alle Krankheiten, denen die Kinder unterworfen sind, hier abzuhandeln, würde zu weitläuftig seyn, und dem Zwecke dieses Handbuches nicht entsprechen, da dieses schon gröfstentheils an andern Orten dieses Werkes geschehen ist.

§. 2793.

Nun zu den vorzüglichsten Krankheiten der Kinder.

Verhärtung des Zellgewebes.

§. 2794.

Verhärtuug des Zellgewebes (*induratio telae cellulosae*) kommt bei Kindern gewöhnlich gleich nach der Geburt vor, und wird am häufigsten in Lazarethen bemerkt.

§. 2795.

Diagnosis. Harte, kalte, gespannte und fest

anliegende Haut, vorzüglich an den äufsern Gliedmafsen, Wangen und der Schamgegend; Röthe der Fufssohlen, welche, statt hohl zu seyn, erhaben sind; die äufsern Gliedmafsen sind gebogen und mifsfarbig; das Kind schreit nicht, sondern wimmert nur.

§. 2796.

Prognosis. Das Übel ist sehr gefährlich, und gemeiniglich tödlich.

§. 2797.

Curplan. Dieser besteht in dem Gebrauch der Reizmittel und der Ätzmittel.

§. 2798.

Innerlich sind Sublimat, Mohnsaft, Campher, und Naphte anzuwenden.

§. 2799.

Äufserlich sind warme Bäder, Kräuterbäder und Frictionen zu empfehlen.

Pocken.

s. §. 759 — 771.

Masern.

s. §. 772 — 780.

Schwämmchen.

§. 2800.

Schwämmchen (*Aphthae*) sind kleine und weifse Blasen an den innern Theilen des Mundes,

als an den Lippen, der Zunge, dem Gaumen, dem Rachen, u. s. w. welche sich mit einer gelben Feuchtigkeit füllen, dann eine Kruste bilden, die endlich abfällt.

§. 2801.

Verlauf. Anfangs weifse und schmerzhafte Flecken, von verschiedener Gröfse und Figur, von der Gröfse einer Nadelspitze bis zu der einer Linse, die an den inneren Theilen des Mundes, an den Lippen, der Zunge, dem Zahnfleische, Gaumen und Zapfen zum Vorscheine kommen, und sich bisweilen bis zu dem Schlunde, Magen, Darmkanal und After verbreiten. Denselben gehen Hitze im Munde und Halse vorher. Zuweilen ist kein Fieber vorhanden. Gemeiniglich tritt aber ein Fieber ein, welches mit Hitze, Unruhe, Leibesschmerzen, heifsem und beschwerlichem Athemholen, u. s. w. verbunden ist.

Die Flecken werden allmählig, oft aber auch schnell, gröfser, und bilden Bläschen, welche sich mit einer weifsen, bald hellen, bald dicklichen, Feuchtigkeit füllen.

Die Bläschen springen nun entweder bald auf, und die Feuchtigkeit in denselben fliefst heraus, oder sie trocknen aus, fallen zusammen, und bilden eine Kruste.

Nach kürzerer oder längerer Zeit fällt die Kruste ab, worauf eine Feuchtigkeit ausfliefst, welche die wunden Stellen bedeckt.

Werden die leidenden Stellen aber nicht bald mit einem neuen Oberhäutchen überzogen, so entsteht in

denselben ein heftiger Schmerz, worauf eine zweite Kruste gebildet wird; und wenn dieselbe abfällt, eine dritte, u. s. w.

§. 2802.

Die Schwämmchen sind bald idiopatisch, bald symptomatisch. Bald erscheinen sie einzeln, bald fliefsen sie zusammen.

Bei neugebornen Kindern kommen sie oft schon nach vier und zwanzig oder sechs und dreifsig Stunden, oft aber auch später, zum Vorscheine.

Die Schwämmchen fliefsen oft so zusammen, dafs sie eine weifse Kruste bilden, welche die innere Fläche des Mundes bedeckt; wodurch das Schlingen beschwerlich, ja unmöglich wird.

§. 2803.

Bei neugebornen Kindern sind die Schwämmchen ein Übel für sich; aber nicht so bei Erwachsenen; denn bei letzteren gesellen sie sich zu anderen Formen des Übelbefindens, als zum Typhus, Wechselfiebern, Ruhr, u. a. m.

§. 2804.

Ursache. Diese besteht in Schwäche, wozu sich auch ein Fehler der Mischung und Form hinzugesellt.

§. 2805.

Ursächliche Momente. Erkältung, u. s. w.

§. 2806.

Prognosis. Die Dauer des Übelbefindens so-

wohl, als die Gefahr, sind unbestimmt. Oft währt es nur einige Tage, oft aber auch Wochen, ja Monate lang. Oft verschwinden sie, oft kommen sie aber auch wieder. Öfters sind sie ohne Gefahr, oft aber auch sehr gefährlich. Die weifsen Schwämmchen sind selten bedenklich, wohl aber die aschgrauen, bleifarbigen und schwarzen. Gesellen sie sich zu dem Typhus, so zeigen sie grofse Gefahr an. Flieſsen die Schwämmchen zusammen, so sind sie bedenklich. Bei alten Personen sind sie gefährlich.

§. 2807.

Curplan. Dieser ist reizend.

§. 2808.

Äufserlich sind weifser Vitriol, Borax, Alaun oder Catechuerde mit Honig vermischt (s. Form. N. 35.) zum Pinseln der innern Theile des Mundes zu gebrauchen. Auch kann man sich einer Mischung der Vitriolsäure oder Salzsäure mit Honig zum Pinseln bedienen.

Scharlachausschlag.

s. §. 785 — 793.

Ausgeschlagener Kopf.

§. 2809.

Ausgeschlagener Kopf, böser Kopf, Grindkopf (*Achores*) besteht in kleinen, sehr juckenden Geschwüren der behaarten Theile des Kop-

fes, die zusammenfliefsen, eine zähe Feuchtigkeit von sich geben, und eine dicke und gelbe Kruste bilden.

§. 2810.

Der ausgeschlagene Kopf unterscheidet sich vom Grinde (*Tinea*, §. 867. 868.) dadurch, dafs letzterer weifs, ansteckend, heftig stinkend und erblich ist, und vom Wachsgrinde, dafs dieser eine dicke, honigartige Feuchtigkeit von sich läfst.

§. 2811.

Dafs der ausgeschlagene Kopf bei Kindern zur Gesundheit dienen, und dieselben für manche gefährliche Form des Übelbefindens schützen könne, ist blofses Vorurtheil.

§. 2812.

Ursache. Diese besteht in einer fehlerhaften Beschaffenheit der Mischung und Form der behaarten Theile des Kopfes.

§. 2813.

Prognosis. Das Übel ist ohne Gefahr.

§. 2814.

Curplan. Dieser besteht vorzüglich in dem äufseren Gebrauch ätzender Mittel.

§. 2815.

Vorzüglich sind hier Reinlichkeit des Kopfes, Tödtung des Ungeziefers (§. 1962.), Waschen des Kopfes mit Seifenwasser, und öfteres Auskämmen und Abschneiden der Haare zu empfehlen.

§. 2816.

Bei grofser Hartnäckigkeit des Übels ist innerlich Sublimat oder versüfstes Quecksilber, und äufserlich der weifse Präcipitat (s. Form. N. 25.) oder eine Sublimatauflösung (s. Form. N. 29.) zu empfehlen.

Wachsgrind.

§. 2817.

Wachsgrind (*Favus*) nennt man den ausgeschlagenen Kopf (§. 2809.), wenn derselbe eine dicke, honigartige Feuchtigkeit von sich giebt, und die ganze Oberfläche des Kopfes, wie ein Honigkuchen aussieht.

§. 2818.

Ursache und Curplan, wie bei dem ausgeschlagenen Kopfe (§. 2812 — 2816.).

Krätze.

s. §. 830 — 843.

Milchkruste.

§. 2819.

Milchkruste, Milchborke, Ansprung (*Crusta lactea*) ist ein Ausschlag im Gesichte, ohne Fieber, welcher in kleinen und rothen Erhabenheiten der Haut besteht, die in Eiterung übergehen, in kurzem platzen, und eine gelbe, klebrige Feuchtigkeit von sich geben, aus der sich dann eine dicke, weifslichgelbliche Kruste bildet, die bald abfällt, und wiederum von neuem entsteht.

§. 2820.

Der Ausschlag befällt vorzüglich säugende Kinder. Er besteht in kleinen Geschwüren, von der Gröfse einer Linse, die anfangs einzeln stehen, dann aber zusammenfliefsen. Er befällt vorzüglich die Wangen, Lippen und die Stirn. Jucken des Ausschlages wird hier nicht bemerkt. Der Urin riecht hier wie Katzenurin. Zuweilen wird dadurch die Hornhaut trübe, und die Kranken scheuen das Licht, so dafs sie beständig mit geschlossenen Augen auf dem Gesichte liegen. Oft erstreckt sich der Ausschlag sogar über den Hals, die Brust, ja sogar über den Unterleib.

§. 2821.

Der Anfang nimmt zuweilen einen andern Verlauf an, der von dem eben beschriebenen in einigen Stücken verschieden ist. Man kann denselben in diesem Fall den hartnäckigen Ansprung nennen. Herr Wichmann nennt ihn *crusta serpiginosa.*

§. 2822.

Der hartnäckige Ansprung unterscheidet sich von dem gewöhnlichen dadurch, dafs derselbe sehr juckt, eine scharfe Feuchtigkeit von sich giebt, oft Jahre lang fortdauert, und die Kranken endlich abzehrt. Der Ausschlag befällt sehr gern die Gegend um das Ohr herum, schont aber gewöhnlich den Augapfel.

§. 2823.

Prognosis. Die gewöhnliche Milchkruste ist ohne Gefahr, und verliert sich endlich von selbst. Der hartnäckige Ansprung erfordert aber den Gebrauch von Arzeneimitteln. Bei dem gewöhnlichen Ansprung bleiben die Kinder übrigens gesund, bei dem hartnäckigen Ansprung aber zehren sie sich allmählig ab.

§. 2824.

Curplan. Dieser besteht in dem äufseren Gebrauch ätzender Mittel.

§. 2825.

Die gewöhnliche Milchkruste erfordert selten Arzeneimittel, die hartnäckige aber jederzeit.

§. 2826.

Äufserlich ist der weifse Präcipitat (s. Form. N. 25.), und eine Sublimatauflösung (s. Form. N. 29.) zu empfehlen.

Überdiefs lobt man innerlich noch das Stiefmütterchen (*viola tricolor*), die Bittersalzerde, u. a. m.

Muttermäler.

s. Krankh. der Haut.

Mitesser.

§. 2827.

Mitesser (*Comedones, Crinones*) ist eine Krankheit der Haut, wobei eine fette und klebrige Mate-

rie, welche die Gestalt eines Wurmes hat, aus der Haut gedrückt werden kann.

§. 2828.

Dieses Übel gesellt sich bei Kindern oft zur Auszehrung (*Atrophia*).

In diesem Fall ist die Haut sehr trocken, schmuzig und gelb.

§. 2829.

Die Materie, welche aus der Haut gedrückt werden kann, ist weiter nichts, als verdickter Schleim aus den Talgdrüsen, welcher durch den Schmuz auf der Haut eine besondere Farbe erhält.

§. 2830.

Ursache. Diese besteht in einer fehlerhaften Beschaffenheit der Mischung und Form der Hautorgane.

§. 2831.

Curplan. Dieser besteht in der Anwendung lauer Bäder, Malz - Kleien - und Kräuterbäder (§. 178.).

Wundwerden.

§. 2832.

Das Wundwerden der Haut oder Frattseyn (*Intertrigo*) entsteht bei Kindern vorzüglich um den After herum, zwischen den Schenkeln, im Nacken und hinter den Ohren.

§. 2833.

Äufserlich ist vorzüglich das Aufstreuen des Hexenmehles (*Farina l. semen lycopodii*) zu empfehlen. Auch ist das Waschen mit lauem Wasser, Milch oder Kalkwasser sehr nützlich.

Beschwerliches Zahnen.

§. 2834.

Beschwerliches Zahnen (*Dentitio difficilis*), d. i. mancherlei Beschwerden, welche beim Ausbruche der Zähne entstehen, ist schlechterdings als Krankheit zu betrachten.

§. 2835.

Die Beschwerden, welche beim Durchbruche der Zähne entstehen, werden durch eine kränkliche Beschaffenheit des Zahnfleisches, aber nicht der Zähne, verursacht. Das beschwerliche Zahnen ist daher als eine Krankheit des Zahnfleisches zu betrachten.

§. 2836.

Die zu grofse Reizbarkeit des Zahnfleisches bei manchen Kindern, welche jederzeit auf Schwäche beruht, erschwert den Durchbruch der Zähne. Denn beim Ausbruche derselben wird das Zahnfleisch gedrückt, und daher schmerzhaft und entzündet. Das Übelbefinden erstreckt sich bald über den ganzen Körper, wodurch Speichelfluſs, Fieber, u. s. w. entsteht.

§. 2837.

Irrig und precär ist es aber, diejenigen Formen des Übelbefindens, welche während dem Verlauf des beschwerlichen Zahnens eintreten, als abhängig von demselben anzusehen, da sie doch von andern Schädlichkeiten erzeugt seyn können, z. E. von Erkältung, u. d. gl.

§. 2838.

Diagnosis. Geschwulst, Schmerz und Röthe des Zahnfleisches, Speichelflufs, Röthe und Geschwulst der Augen.

Das Kind scheuet sich etwas in den Mund zu nehmen, und schreiet, wenn es auf etwas hartes beifst.

Hierzu gesellen sich mehr oder weniger heftiges Fieber, Erbrechen, Durchfall, Unruhe, Schlaflosigkeit, Zuckungen, u. s. w.

§. 2839.

Der Ausbruch der Zähne (oder vielmehr der Milchzähne, weil diese keine Wurzeln haben, und im siebenten Jahre wiederum durch andere, welche mit Wurzeln versehen sind, und die ganze Lebenszeit hindurch stehen bleiben, verdrängt werden) fängt gemeiniglich im siebenten Monate nach der Geburt an, bei einigen aber früher, als im dritten oder vierten Monate, bei andern später, und dauert bis zum funfzehnten und zwanzigsten Monate.

§. 2840.

Zuerst brechen die Schneidezähne aus, dann die Backenzähne und endlich die Augenzähne.

§. 2841.

Bei Kindern, welche gesund und stark sind, geht das Zahngeschäft leicht vorüber. Bei schwächlichen und kränklichen Kindern aber entstehen während dem Ausbruch der Zähne mancherlei Beschwerden.

§. 2842.

Ursache. Diese besteht in Schwäche, vorzüglich des Zahnfleisches.

§. 2843.

Ursächliche Momente. Erkältung, fehlerhafte Erziehung, u. s. w.

§. 2844.

Proguosis. Die Gefahr ist unbestimmt. Bei sehr schwächlichen Kindern kann sogar der Tod erfolgen.

§. 2845.

Curplan. Dieser besteht in dem Gebrauch der Reizmittel.

§. 2846.

Innerlich sind Mohnsaft, versüfster Vitriol- Salpeter- oder Salzgeist, Bilsenkrautsextract, Cajeputöl, u. d. gl. anzuwenden.

§. 2847.

Die Durchschneidung des Zahnfleisches stiftet oft mehr Schaden, als Nutzen.

Englische Krankheit.

§. 2848.

Englische Krankheit, doppelte Glieder (*Rhachitis*) ist eine Krankheit sowohl der harten, als der weichen Theile, wobei alle Knochen des Körpers weich, und mehr oder weniger gekrümmt werden, und Auftreibung des Unterleibes, des Kopfes und der Knocheneuden mit Abzehrung der übrigen Theile des Körpers verbunden ist.

§. 2849.

Verlauf. Zeichen von Schwäche, so dafs das Kind weder gehen noch stehen kann, Auftreibung des Unterleibes, der Kopf ist von ungewöhnlicher Gröfse; die Enden der Knochen, vorzüglich der der Extremitäten, schwellen an, da hingegen der mittlere Theil derselben abnimmt, die Knochen werden weich; das Fleisch schlaff, die Farbe der Haut blafs; die Zähne cariös und schwarz; gemeiniglich ist Heifshunger vorhanden; die Kinder sind entweder sehr dumm, oder sehr klug.

In der Folge werden alle Knochen so weich, dafs sie der Wirkung der Muskeln nachgeben, und mehr oder weniger verunstaltet und gekrümmt werden. Die Brust wird durch Verunstaltung der Rip-

pen, des Brustbeines, der Schultern und des Schlüsselbeines verengert, woher Engbrüstigkeit und Husten entstehen. Gemeiniglich ist die Brust in der Mitte sehr erhaben, zu beiden Seiten aber zusammengedrückt.

Endlich entstehen Lähmungen, hectisches Fieber, Knochengeschwülste, u. s. w. bis zuletzt der Tod erfolgt.

§. 2850.

Die englische Krankheit greift blofs Kinder zwischen dem sechsten Monate nach der Geburt und dem zehnten Jahre an. Sie ist erblich und endemisch, und befällt das weibliche Geschlecht häufiger, als das männliche.

§. 2851.

Die englische Krankheit wurde in England zwischen den Jahren 1612 und 1620 bekannt, woher sie auch den Namen erhalten hat.

§. 2852.

Ursache. Diese besteht in Schwäche, verbunden mit einer fehlerhaften Beschaffenheit der Mischung und Form.

§. 2853.

Ursächliche Momente. Unreinlichkeit, schlechte Muttermilch, allzu fette Speisen, Mangel an Bewegung, feuchte Wohnstuben, u. s. w.

§. 2854.

Prognosis. Die Dauer des Übels sowohl, als die Gefahr sind unbestimmt. Das Übelbefinden hält

oft mehrere Jahre an. Jederzeit ist es bedenklich. Die Knochen erhalten oft ihre gewöhnliche Lage und Richtung wieder, oft bleiben sie aber auch ungestaltet, und legen somit den Grund zu mancherlei Formen des Übelbefindens. Verunstaltungen der Beckenknochen geben beim weiblichen Geschlechte zu schweren Geburten Anlafs.

§. 2855.

Curplan. Dieser besteht in dem innerlichen und äufserlichen Gebrauch der Reizmittel.

§. 2856.

Innerlich sind bittere Extracte, Calmus, Zimmt, Wein, Serpentaria, Pomeranzenschale, u. d. gl. anzuwenden.

Überdiefs lobt man die Färberröthe, Wasserampfer, Phosphorsäure, u. a. m.

§. 2857.

Äufserlich sind laue Bäder, Kräuterbäder (§. 178.) Malzbäder, Waschen mit Wein, Kräuterwein, oder Branntwein, und Reiben des ganzen Körpers mit gewärmten und durchräucherten Tüchern zu empfehlen.

§. 2858.

Überdiefs sind noch Reinlichkeit, Bewegung des Körpers, trockne Wohnzimmer, der Aufenthalt in einer reinen Luft, und eine gehörige Auswahl der Speisen zu empfehlen.

Pädarthrocace.

§. 2859.

Pädarthrocace nennt man eine besondere Art des Winddorns (§. 960.), welche langsam und mit unbedeutenden Schmerzen anfängt, sehr gefährlich ist, und blofs Kinder befällt.

§. 2860.

Verlauf. Die Kinder klagen anfangs über Schmerzen und Steifigkeit an irgend einer Stelle des Körpers, an welcher äufserlich nichts bemerkt wird; die Bewegung des Gliedes ist etwas gehindert.

Einige Zeit hernach entsteht eine Geschwulst, welche etwas gespannt und elastisch ist, und sich beinahe wie eine mit Wasser gefüllte Blase anfühlen läfst. Die Geschwulst liegt unter der Haut und ist deutlich auf dem Knochen zu fühlen. Die äussere Haut hat hier noch ihre gewöhnliche Farbe behalten.

Drei oder vier Wochen darauf hat die Geschwulst an Gröfse zugenommen, und ist schmerzhafter, wobei die äufsere Haut roth und dann blaulicht wird.

Hierauf entsteht in der Mitte der Geschwulst ein weifser Fleck, an dessen Stelle dieselbe aufbricht, und einen dünnen, oft mit Blutstriemen gefärbten, und mit kleinen weifsen Klümpchen vermischten, Eiter herausläfst. In der aufgebrochenen Geschwulst bemerkt man eine röthliche, einem Schwamme ähnliche, Substanz. Das Geschwür selbst geht bis auf

den Knochen, welcher gemeiniglich mit angegriffen, aufgetrieben und cariös ist.

Endlich erfolgt Abmagerung, und zuletzt hectisches Fieber.

§. 2861.

Das Übel befällt vorzüglich Kinder, die an der englischen Krankheit leiden, oder derselben zuvor ausgesetzt waren. Doch kann es auch nach Pocken, u. d. gl. entstehen.

Es erscheint blofs an Theilen, welche mit Röhrenknochen versehen sind, vorzüglich am Vorderarme und am Unterschenkel.

§. 2862.

Ursache. Diese besteht in einem Fehler der Mischung und Form.

§. 2863.

Curplan. Dieser besteht in dem innerlichen und äufserlichen Gebrauch ätzender Mittel.

§. 2864.

Vorzüglich ist hier der Sublimat, sowohl innerlich, als äufserlich (s. Form. N. 29.), zu empfehlen.

Scropheln.

s. §. 1003 — 1019.

Darrsucht.

§. 2865.

Darrsucht oder Auszehrung der Kinder (*Atrophia, Paedatrophia*) hielt man sonst für eine

Folge der sogenannten Mitesser (*comedones*, §. 2827.); welches aber irrig ist, da jedes dieser Übel als eine Krankheit für sich zu betrachten ist.

§. 2866.

Diagnosis. Abmagerung des Körpers, vorzüglich der äufsern Gliedmafsen, der Unterleib ist meistentheils hart und aufgetrieben, Colikschmerzen, mehrentheils Gefräfsigkeit.

Endlich tritt ein hectisches Fieber (§. 361.) ein, welches zuletzt den Tod verursacht.

§. 2867.

Die Darrsucht lassen mehrere Ärzte von einer Verstopfung der Gekrösdrüsen, andere von Würmern, u. s. w. entstehen.

§. 2868.

Ursache. Diese besteht in Schwäche.

§. 2869.

Ursächliche Momente. Zu starker Genufs fetter Speisen, Mangel an Bewegung, Unreinlichkeit, ungesunde Milch, u. s. w.

§. 2870.

Prognosis. Das Übel ist jederzeit bedenklich, und beim weitern Fortgange tödlich.

§. 2871.

Curplan. Dieser besteht in der Anwendung der Reizmittel.

§. 2872.

Innerlich sind bittere Extracte, Calmus, Pomeranzenschale, u. a. m. anzuwenden.

§. 2873.

Äufserlich sind warme Bäder, Kräuterbäder, Malzbäder und Waschen mit Wein zu empfehlen.

§. 2874.

Überdiefs sind noch mäfsige Bewegung des Körpers, Reinlichkeit und eine gehörige Auswahl der Speisen zu empfehlen.

Wurmbeschwerden.

§. 2875.

Die Kinder sind den Würmern weit häufiger unterworfen, als Erwachsene.

Die Erkenntnifs sowohl, als die Behandlung derselben, s. §. 2282. u. f.

Lustseuche.

§. 2876.

Viele Ärzte glauben, dafs die Kinder schon im Mutterleibe mit der Lustseuche behaftet seyn können, welches aber irrig und ungegründet ist.

§. 2877.

Bei neugebornen Kindern geschieht die Ansteckung während dem Durchgange derselben durch die Mutterscheide.

§. 2878.

Bei Kindern, die an der Lustseuche (§. 1043.) leiden, ist ebenfalls auch der Sublimat oder das versüfste Quecksilber anzuwenden.

§. 2879.

Bei säugenden Kindern, mit der Lustseuche behaftet, müssen die Mercurialmittel den Kindern selbst gegeben werden, und nicht der Mutter oder Amme.

Zuckungen.

§. 2880.

Den Zuckungen oder Jammer (*Eclampsia*) sind die Kinder häufig ausgesetzt. Die Veranlassung hierzu ist vorzüglich in ihrem zarten Körperbau und reizbaren Nervensysteme zu suchen.

§. 2881.

Ursache. Diese besteht in Schwäche.

§. 2882.

Ursächliche Momente. Erkältung, ungesunde Muttermilch, verdorbene Nahrungsmittel, u. s. w.

§. 2883.

Curplan. Dieser ist reizend.

§. 2884.

Vorzüglich sind hier Mohnsaft, Bilsenkrautsextract, Naphte, versüfster Vitriolgeist, Chamille, und warme Bäder zu empfehlen.

Überdiefs lobt man hier noch den Zinkkalk, Safran, Moschus, vegetabilisches Laugensalz, u. a. m.

Leibesschmerzen.

§. 2885.

Leibesschmerzen, Bauchschmerzen, Bauchgrimmen, Bauchweh (*Tormina*) kommen bei Kindern häufig vor, und gehen leicht in Zuckungen über.

§. 2886.

Prognosis. Unruhiges Hin- und Herwerfen, häufiges und heftiges Schreien, Schlaflosigkeit, starkes Anziehen der Schenkel an den Unterleib, Lächeln im Schlafe, begieriges Saugen oder Verabscheuung der Brüste, fehlerhafte Farbe und Geruch der Excremente, Auftreibung des Unterleibes.

§. 2887.

Ursache. Diese besteht in Schwäche, vorzüglich des Darmkanals.

§. 2888.

Ursächliche Momente. Erkältung, Blähungen, zu häufiger Genufs von Mehlbrei, fehlerhafte Muttermilch, u. s. w.

§. 2889.

Curplan. Dieser besteht in dem Gebrauch der Reizmittel.

§. 2890.

Innerlich sind Pomeranzenschale, Mohnsaft,

Zimmt, versüfster Vitriol- Salpeter - oder Salzgeist, u. a. m. anzuwenden.

§. 2891.

Äufserlich sind Muskatennufsöl oder Cajeputöl in den Unterleib einzureiben, und Kräutersäckchen (§. 181.) aufzulegen.

Erbrechen.

§. 2892.

Ursache. Diese besteht in Schwäche des Magens.

§. 2893.

Ursächliche Momente. Erkältung, Überladung des Magens, verdorbene oder saure Milch, u. s. w.

§. 2894.

Curplan. Dieser ist reizend.

Vorzüglich sind innerlich Mohnsaft, Zimmttinctur, Pfeffermünze, Muskatennufs, u. d. gl. anzuwenden.

Äufserlich sind Muskatennufsöl, Cajeputöl, Pfeffermünzenöl, u. a. in die Magengegend einzureiben.

Durchfall.

§. 2895.

Bei Kindern ist während dem Durchfall der Stuhlgang wäfsrig, grün, oder hat das Ansehen von gehacktem Ei.

Er entsteht von Erkältung, ungesunder Milch, u. s. w.

§. 2896.

Curplan. Dieser ist reizend.

Innerlich sind Muskatennufs, Zimmt, Pomeranzenschale, u. d. gl. zu gebrauchen.

Äufserlich sind Kräutersäckchen (§. 181.) auf den Unterleib zu legen, oder Muskatennufsöl einzureiben.

Vorfall des Mastdarms.

s. §. 2326.

Nächtlicher Urinabgang.

§. 2897.

Der nächtliche Abgang des Urins (*Enuresis nocturna*) bei Kindern entsteht entweder von einer üblen Gewohnheit, oder aus Schwäche. Im ersteren Fall ist diefs denselben abzugewöhnen; im letzteren Fall hingegen erfordert das Übel den innerlichen und äufserlichen Gebrauch der Reizmittel,

Nabelbruch.

§. 2898.

Die Kinder sind öfters Nabelbrüchen (§. 1703.) ausgesetzt, wozu heftiges Schreien häufig die Veranlassung ist.

Das Übel wird durch das Tragen eines Nabelbruchbandes gehoben.

Stickfluſs.

§. 2899.

Stickfluſs (*Catarrhus suffocativus*), welcher in

gehindertem Athemholen, mit Fieber und Erstickungsgefahr verbunden, besteht, befällt vorzüglich Kinder von der Geburt an, bis in das sechste Jahr.

§. 2900.

Verlauf. Das Übel erscheint plötzlich, vorzüglich des Nachts. Es äufsert sich durch Druck in der Brust und der Herzgrube, mit Husten, Röcheln, Beklemmung und Fieber verbunden.

In der Folge nehmen die krankhaften Erscheinungen, als die Beängstigung, das Fieber, u. s. w. zu, die Augen werden trübe und die äufseren Gliedmafsen kalt.

Endlich erfolgt der Tod, und zwar ohne Zukkungen und bei vollem Bewufstseyn.

§. 2901.

Ursache. Diese besteht in Schwäche, vorzüglich der Respirationsorgane.

§. 2902.

Ursächliche Momente. Erkältung, heftige Anstrengung der Brust, u. s. w.

§. 2903.

Prognosis. Die Dauer des Übelbefindens ist unbestimmt, und oft erfolgt der Tod in kurzer Zeit. Die Gefahr ist hier sehr grofs, und gemeiniglich nimmt das Übel einen tödlichen Ausgang. Blofs im Anfange des Übels ist Hülfe möglich.

§. 2904.

Curplan. Dieser besteht in der Anwendung der Reizmittel.

§. 2905.

Vorzüglich sind hier Naphte, versüfster Vitriol- Salpeter- oder Salzgeist, flüchtige Laugensalze, Campher, Belladonna und Mohnsaft zu empfehlen.

Keichhusten.

§. 2906.

Keichhusten, Stickhusten, Krampfhusten (*Tussis ferina l. convulsiva*) ist ein heftiger Husten, mit grofser Anstrengung und Geräusch beim Athemholen verbunden, welcher mit Gefahr verknüpft ist, und gemeiniglich nur Kinder befällt.

§. 2907.

Verlauf. Anfangs zeigt er sich als ein gewöhnlicher Catarrh, mit Husten, Schnupfen und Fieber verbunden. Dieses dauert von einigen Tagen bis zu drei Wochen.

Hierauf wird der Husten stärker, und beim Athemholen wird ein eigner pfeifender Laut wahrgenommen. Das Übel kommt nur anfallsweise. Dieses dauert von vier bis zwölf Wochen, und länger.

Endlich wird das Fieber sehr heftig, es entstehen Zuckungen und Abmagerung, und zuletzt erfolgt allmählig oder plötzlich der Tod.

§. 2908.

Die Anfälle hommen hier bald bei Tage, bald bei Nacht. Sie halten gemeiniglich nur eine kurze Zeit an. Je leichter der Schleim kann aufgehustet werden, desto kürzer sind sie.

Jedem Anfall geht gewöhnlich Unruhe, Angst und ein Kitzeln in der Luftröhre vorher.

Während dem Anfall wird das Gesicht roth, blau und geschwollen, die Augen treten hervor, die Kranken scheinen in Gefahr der Erstickung zu seyn, welche doch keinesweges erfolgt, sie können sich nicht aufrecht halten, sondern fallen entweder zu Boden, oder halten sich an etwas an.

Ist der Anfall sehr heftig, so entstehen Zuckungen, Zittern, Ohnmachten, unwillkührlicher Abgang des Urins und der Excremente, Nasenbluten, kalte Schweifse, kalte Extremitäten, u. s. w.

Der Anfall endigt sich mit Würgen oder Erbrechen eines zähen Schleimes.

§. 2909.

Aufser den Anfällen sind die Kranken munter, und das Athemholen ist nicht gehindert.

§. 2910.

Das Übel herrscht gewöhnlich epidemisch. Zuweilen erscheint es ohne Fieber.

§. 2911.

Die sogenannte Millarsche Engbrüstigkeit (*Asthma Millari*, *Asthma spasticum*) unterschei-

det sich dadurch von dem Keichhusten, dafs dieselbe sich im Anfange zwar auch wie ein gemeiner Catarrh äufsert, aber mit wenig Husten und vielmehr mit einer heisern Stimme verbunden ist.

§. 2912.

Ursache. Diese besteht in Schwäche des Körpers, vorzüglich der Respirationsorgane.

§. 2913.

Ursächliche Momente. Erkältung, Genufs verdorbener Nahrungsmittel, u. s. w.

§. 2914.

Prognosis. Die Dauer des Übelbefindens sowohl, als die Gefahr, sind unbestimmt. Es kann vier Wochen, aber auch mehrere Monate lang währen. Jederzeit ist es bedenklich. Oft ist es tödlich. Leicht veranlafst dasselbe Brüche, Höcker, Lähmung, u. d. gl.

Sehr gefährlich ist das Übel: wenn es mit Typhus, grofser Engbrüstigkeit, schwarzen Schwämmchen, oder hectischem Fieber verbunden ist.

Zeichen der Besserung sind: wenn das Fieber allmählig verschwindet, der Appetit zurückkehrt, die Anfälle seltener wieder kommen, und kürzere Zeit dauern, die Kranken ruhig schlafen, u. s. w.

§. 2915.

Curplan. Dieser besteht in dem Gebrauch der Reizmittel.

§. 2916.

Vorzüglich sind hier Mohnsaft, Campher, Bilsenkrautsextract, und Tollkirsche zu empfehlen.

Überdiefs lobt man noch den Zinkkalk, Moschus, Ipecacuanha in kleinen Dosen, Meerzwiebel, Schierling, Tabaksextract, Büchsenflechte, wilden Rosmarin, Eichenmistel, Cantharidentinctur, u. a. m.

Hautige Bräune.

§. 2917.

Häutige Bräune (*Angina membranacea l. polyposa*), Engl. *Croup*, besteht in einer Entzündung der Luftröhre, mit Auswurf eines häutigen, röhrigen Wesens verbunden (§. 524.).

§. 2918.

Verlauf. Im Anfange hat das Übel das Ansehen eines gewöhnlichen Catarrhs. Es ist Fieber vorhanden. Es zeigt sich eine Hitze und ein rother Ausschlag im Gesichte. Die Kranken klagen über eine unangenehme Empfindung oder einen stumpfen Schmerz im Halse; die Mandeln schwellen an.

Hierauf wird das Athemholen beschwerlich, weniger das Schlingen; es entsteht Heiserkeit und Husten; das Athemholen ist mit einem ganz eigenen, zischenden, heisern, pfeifenden Tone, der beinahe dem Krähen eines jungen Hahnes ähnlich ist, verbunden.

Dann wird mit dem Husten ein häutiges, röhriges Wesen, welches oft die Gestalt der Luftröhre

und ihrer Äste völlig nachahmet, ausgeworfen. Das Athemholen ist äufserst mühsam und beschwerlich. Endlich erfolgt Erstickung.

§. 2919.

Prognosis. Die Dauer des Übelbefindens ist zwei bis fünf Tage. Die Gefahr ist hier sehr grofs, und gemeiniglich erfolgt der Tod. Alle Zufälle nehmen äufserst schnell zu. Nach 24, höchstens 36 Stunden ist gemeiniglich alle Hülfe zu spät.

§. 2920.

Curplan. Dieser besteht in der Anwendung reizender Mittel.

§. 2921.

Vorzüglich wird das Einreiben der weifsen Präcipitatsalbe (s. Form. N. 25.) in den Hals empfohlen.

§. 2922.

Auch wird der innerliche Gebrauch der Queckbermittel vorzüglich gepriesen.

§. 2923.

Die Öffnung der Luftröhre (Luftröhrenschnitt, (*tracheotomia*) ist hier von wenigem Nutzen.

Angewachsene Zunge.

§. 2924.

Anwachsung der Zunge (*Ancyloglossum*) nennt man den Zustand, wenn die Spitze der Zunge durch das Zungenband unbeweglich gemacht wird.

Dieses geschieht dadurch, dafs das Zungenband entweder zu kurz ist, oder sich zu weit nach vorne, d. i. bis an die äufserste Zungenspitze erstreckt.

§. 2925.

Verhindert dieser Zustand das Saugen, so ist die Durchschneidung des Zungenbändchens vermittelst einer Scheere angezeigt.

Zungengeschwür.

§. 2926.

Gegen unbedeutende Geschwüre der Zunge ist Eieröl äufserlich anzuwenden.

§. 2927.

Bei beifsender Hitze der Zunge kann man sich des Milchrahms bedienen.

Fröschleingeschwulst.

§. 2928.

Fröschleingeschwulst, Zungenfrosch (*Ranula*, *Hypoglossis*, *Batrachus*) ist eine wäfsrige Geschwulst unter der Zunge.

§. 2929.

Die Fröschleingeschwulst hat die Gestalt eines Froschmaules, und die Gröfse einer Erbse bis zur Gröfse eines Hühnereies.

Zuweilen verhindert sie das Athemholen, Sprechen und Schlingen.

Die Geschwulst ist bald schmerzhaft, bald schmerzlos.

Gemeiniglich befällt sie blofs Kinder.

§. 2930.

Prognosis. Die Dauer des Übelbefindens ist unbestimmt. Das Übel ist ohne Gefahr. Leicht erfolgen Recidive.

§. 2931.

Curplan. Dieser besteht in der Operation. Arzeneimittel sind hier unnütz.

Lippengeschwulst.

§. 2932.

Lippengeschwulst oder Wasserkrebs der Lippen (*Cheilocace, Labrisulcium*) befällt vorzüglich Kinder.

Die Oberlippe ist hier vorzüglich geschwollen, hart und dicke, und mit einem klebrigen Schleime bedeckt.

§. 2933.

Curplan. Dieser besteht in dem Gebrauch der Reizmittel.

Hasenscharte.

s. Krankh. d. Lippen.

Höcker.

§. 2934.

Gegen einen anfangenden Höcker sind äufserlich flüchtige Reizmittel, als flüchtige Linimente

(s. Form. N. 7. 8.), Lavendel - Rosmarin - und Melissengeist, Campherspiritus, u. s. w. schickliche Binden und Maschinen anzuwenden.

Wasserkopf.

§. 2935.

Wasserkopf, Kopfwassersucht (*Hydrocephalus*) besteht in einer Auftreibung des Kopfes von wäfsrigen Feuchtigkeiten.

§. 2936.

Man theilt den Wasserkopf in den äufseren und in den inneren.

Äufserer Wassserkopf.

§. 2937.

Äufserer Wasserkopf (*Hydrocephalus externus*) ist eine Anhäufung des Wassers zwischen der Hirnschale und den Kopfbedeckungen.

§. 2938.

Das Wasser befindet sich hier aber:

1) entweder im Zellgewebe der Kopfbedeckungen. Hier ist die Geschwulst weich, grofs, ohne Schmerzen, und mehr oder weniger durchscheinend, und man kann die Knochen unter ihr nicht fühlen. Dabei sind die Augenlieder geschwollen. Die äufsere Haut ist unverändert. Beim Druck bleibt keine Grube zurück.

2) oder unter der Beinhaut der Hirnschale. Hier ist die Geschwulst hart, gespannt, wie

eine Wasserblase mit Schwappung anzufühlen, und etwas schmerzhaft. Dabei sind die Augenlieder nicht geschwollen. Beim Druck bleibt keine Grube zurück.

§. 2939.

Bei dem äufseren Wasserkopfe erstreckt sich die Geschwulst gemeiniglich über den ganzen Kopf, zuweilen nimmt sie aber auch nur eine kleine Stelle am Kopfe ein.

§. 2940.

Das Übel befällt vorzüglich Kinder, gleich nach der Geburt, oder auch später hin.

§. 2941.

Ursächliche Momente. Quetschung, heftige Erkältung, u. s. w.

§. 2942.

Prognosis. Die Gefahr ist unbestimmt. Bei neugebornen Kindern ist das Übel oft tödlich.

§. 2943.

Curplan. Dieser besteht in dem innerlichen und äufserlichen Gebrauch reizender Mittel.

§. 2944.

Äufserlich sind reizende Bähungen (§. 179.) auf den Kopf zu legen; der Kopf ist mit Campherspiritus, Melissen - Rosmarin - Münzen - oder Lavendelgeist oder mit Wein oder Branntwein zu waschen, oder mit durchräucherten Tüchern zu reiben; flüchtige Linimente (s. Form. N. 7. 8.) sind einzu-

reiben; Compressen, mit Kalkwasser oder Campherspiritus befeuchtet, sind aufzulegen.

§. 2945.

Im Nothfall kann man das Wasser vermittelst einiger kleinen Einschnitte in die Haut ausleeren.

Innerer Wasserkopf.

§. 2946.

Kopfwassersucht oder innerer Wasserkopf (*Hydrocephalus internus*) ist eine Anhäufung des Wassers zwischen dem Gehirn und dem Schädel.

§. 2947.

Diagnosis. Ungewöhnliche Gröfse und Ausdehnung des Schädels mit getrennten Nähten. Dummheit und Schläfrigkeit.

§. 2948.

Verlauf. Das Übel giebt sich gleich anfangs durch Erbrechen, Husten und Beängstigung bei Aufrechthaltung des Kopfes zu erkennen.

Der Augapfel ist bis zur Hälfte von dem untern Augenliede bedeckt, der Augenstern ist erweitert, und die Augen thränen beständig.

Dann nehmen die innern und äufsern Sinne ab, es tritt Dummheit und Schläfrigkeit ein, das Gesicht und Gehör sind sehr geschwächt, die Sprache vergeht, das Kind läfst dann den Kopf auf den Schultern hängen, der Mund ist gemeiniglich voll Speichel,

die Füfse schwellen an, werden kalt, und endlich gelähmt.

Endlich treten Wassersucht, Lähmung oder Zukkungen ein, und es erfolgt der Tod.

§. 2949.

Ist nur eine Seite des Kopfes aufgeschwollen, so nennt man das Übel halben Wasserkopf.

§. 2950.

Das Übel kann nur bei Kindern statt finden, so lange die Knochen des Kopfes noch weich und nachgebend sind.

Die Kinder können das Ubel gleich mit auf die Welt bringen, oder es entsteht später hin.

§. 2951.

Öfters ist der innere Wasserkopf mit dem äufseren verbunden, welchen Zustand man den vermischten Wasserkopf (*Hydrocephalus mixtus*) nennt.

§. 2952.

Ursächliche Momente. Äufsere Gewaltthätigkeiten, Druck, Quetschung, u. s. w.

§. 2953.

Prognosis. Die Dauer des Ubelbefindens ist unbestimmt. Es kann zuweilen mehrere Jahre hindurch währen. Die Gefahr ist grofs, und gemeiniglich erfolgt der Tod. Die Heilung ist äufserst schwer.

§. 2954.

Curplan. Dieser besteht in der Anwendung reizender und ätzender Mittel.

§. 2955.

Innerlich werden vorzüglich Quecksilbermittel empfohlen.

§. 2956.

Äufserlich sind reizende Bähungen (§. 179.) und Compressen auf den Kopf zu legen.

§. 2957.

Die Herauslassung des Wassers ist fast immer tödlich gewesen.

Gehirnwassersucht.

§. 2958.

Gehirnwassersucht (*Hydrops cerebri*) ist eine Ansammlung des Wassers in den Hirnkammern.

§. 2959.

Diagnosis. Diese ist sehr schwer. Der Kopf ist nicht ungewöhnlich ausgedehnt, sondern hat seine gewöhnliche Gröfse. Dummheit, Schläfrigkeit und Kopfschmerzen sind vorhanden. Beim Aufrechtsitzen entstehen Beängstigung und Husten.

§. 2960.

Verlauf. Anfangs Kopfschmerzen, Erbrechen, Lichtscheu, Erweiterung des Augensterns, Jucken in der Nase, convulsivische Bewegung des Augapfels, Schmerzen in den Schläfen. Beängstigung und Husten beim Aufrechtsitzen.

Dann entsteht Dummheit, Schläfrigkeit und Steifigkeit des Halses.

Endlich treten Lähmung, Zuckungen oder Schlafsucht ein, und es erfolgt der Tod.

§. 2961.

Die Gehirnwassersucht unterscheidet sich von dem inneren Wasserkopfe durch den Sitz des Wassers und durch die fehlende Ausdehnung des Kopfes.

§. 2962.

Das Übel greift vorzüglich Kinder an, doch befällt es auch Erwachsene.

§. 2963.

Ursächliche Momente. Starke Erkältung, Schlag, Stofs oder Fall auf den Kopf, Schrecken, u. s. w.

§. 2964.

Prognosis. Die Dauer des Übelbefindens ist vierzehn Tage bis einige Monate. Die Gefahr ist jederzeit grofs, und gemeiniglich erfolgt der Tod. Das Übel ist äufserst schwer zu heben. Die Gehirnwassersucht ist gemeiniglich schneller tödlich, als der innere Wasserkopf.

§. 2965.

Curplan. Dieser besteht in dem Gebrauch reizender und ätzender Mittel.

§. 2966.

Vorzüglich werden hier Quecksilbermittel, sowohl innerlich, als äufserlich, empfohlen.

Rückgratswassersucht.

§. 2967.

Wassersucht des Rückgrats, Rückenspalte (*Spina bifida, Hydrorachitis*) ist eine Ansammlung des Wassers in dem innern Theile des Rückgrats.

§. 2968.

Diagnosis. Spalte der Lendenwirbelbeine, wodurch eine weiche Geschwulst, welche beim Druck schmerzt, sich vermindert, ja gänzlich verschwindet, beim Nachlassen desselben aber sogleich wieder erscheint, hervorgedrängt wird. Die Kinder können nicht ohne Schmerzen auf dem Rücken liegen.

Gewöhnlich gesellt sich noch Lähmung der untern Extremitäten hinzu.

§. 2969.

Die Geschwulst ist hier oft sehr klein, oft hat sie aber auch die Gröfse einer Faust.

§. 2970.

Die Rückenspalte ist oft mit Gehirnwassersucht oder dem innern Wasserkopfe verbunden.

§. 2971.

Das Übel wird blofs bei neugebornen Kindern angetroffen.

§. 2972.

Prognosis. Die Dauer des Übelbefindens ist unbestimmt. Gemeiniglich ist es schnell tödlich; selten währt es Wochen und Monate lang. Die Gefahr ist hier sehr grofs, da das Übel unheilbar ist.

§. 2973.

Die Herauslassung des Wassers vermittelst einer künstlichen Öffnung ist unnütz, und zieht gemeiniglich den Tod nach sich.

Krankheiten

der Greise.

Krankheiten alter Personen.

§. 2974.

Alte Personen sind zwar ausschliefslich keiner Form des Übelbefindens ausgesetzt, an denen jüngere Personen nicht auch leiden könnten; doch sind sie einigen Formen des Übelbefindens häufiger unterworfen, denn diese.

Hierzu gehören schweres Gehör, Triefaugen, örtliche Absterbung der Zehen, Beschwerden beim Urinlassen, u. a. m.

§. 2975.

Die Prognose ist bei den Krankheiten alter Personen übel zu stellen. Viele Formen des Übelbefindens sind bei Greisen sehr oft unheilbar, welche bei jungen Personen leichter zu heilen sind, wie z. E. Geschwüre, fieberlose Hautausschläge, Wassersucht, u. a. m. Wegen Sprödigkeit der Knochen sind die Greise sehr leicht den Beinbrüchen ausgesetzt. Sehr leicht entstehen unheilbare Verhärtungen.

§. 2976.

Die Diät mufs bei alten Personen beträchtlich reizend seyn. Vorzüglich sind denselben täglich einige Gläser guter Wein zu empfehlen.

§. 2977.

Hypersthenie findet bei alten Personen fast nie statt; sehr häufig aber indirecte Asthenie.

§. 2978.

Daher sind Aderlässe gewifs auch äufserst selten angezeigt. Eben so auch Abführungsmittel.

§. 2979.

Nun will ich zu einigen Krankheiten, denen alte Personen häufig unterworfen sind, übergehen.

Abzehrung.

§. 2980.

Abzehrung der Greise (*Marasmus senilis*) ist jederzeit bedenklich, und erfordert die schleunigste Hülfe.

Die Kranken zehren sich hier zusehends ab, und sterben ganz unvermuthet.

Das Übel ist gemeiniglich unheilbar.

§. 2981.

Hier ist nichts weiteres zu thun, als, so viel als möglich ist, den Tod zu verzögern.

§. 2982.

Dieses geschieht durch den Gebrauch flüchtiger Reizmittel, vorzüglich des Weines, des Camphers, der Zimmttinctur, u. a. m.

Örtliche Absterbung der Zehen.

§. 2983.

Örtliche Absterbung der Zehen (*Gangraena senilis, Melasma*) befällt meistentheils nur alte Personen.

§. 2984.

Verlauf. Zuerst entsteht an der innern Seite der kleinen Zehe ein bleifarbiger oder schwarzer Fleck,

von welchem jederzeit die Oberhaut abgeht, und unter welcher die Haut eine dunkelrothe Farbe hat.

Hierauf schwillt der leidende Fuſs an, und die Zehen sterben ab.

Dann verbreitet sich das Übel auch über den ganzen Fuſs.

§. 2985.

Ursache. Diese besteht in Schwäche.

§. 2986.

Prognosis. Das Übel nimmt bald langsam, bald schnell zu, ist sehr gefährlich, und erfordert die schleunigste Hülfe.

§. 2987.

Curplan. Dieser ist reizend.

---

§. 2988.

Vorzüglich ist hier der Mohnsaft, sowohl innerlich, als äuſserlich in Breiumschlägen, zu empfehlen.

§. 2989.

Die Amputation des leidenden Fuſses ist hier von keinem Nutzen.

Triefaugen.

§. 2990.

Dem Augentriefen, Triefaugen (*Lippitudo*) sind sehr häufig alte Weiber ausgesetzt.

---

§. 2991.

Das Übel erfordert vorzüglich den äuſserlichen Gebrauch des Mohnsaftes (s. Form. N. 23.).

Schwerhörigkeit.

§. 2992.

Schwerhörigkeit und Taubheit ist bei alten Personen gemeiniglich unheilbar.

Schlagfluſs.

s. §. 1299 — 1311.

Beschwerliches Urinlassen.

§. 2993.

Gegen beschwerliches Urinlassen sind vorzüglich flüchtige Linimente (s. Form. N. 7. 8.) in die Urinblasengegend einzureiben und warme Bäder zu gebrauchen.

Arzneiformeln.

N. 35.

℞. Vitriol. alb. scrupulum unum.
(l. Borac. venet. Drachmam unam.)
(l. Alumin. crud. Drachm. unam.)
(l. Terrae Catechu Drachm. unam.)
Mell. pur. (l. mell. rosar.) Unciam unam.
M. D. S. Öfters den Mund zu pinseln.

Register

zur

allgemeinen Heilkunst.

A.

	Seite
Aderlassen	100
Ätzmittel, deren Auswahl	29. 115
— Cautelen bei Anwendung derselben	120
Ätzstein	119
Asthenie, deren Behandlung	30
— — Zeichen	— 17
— directe, deren Behandlung	62
— — — Zeichen	19
— gemischte, Behandlung derselben	78
— — Zeichen derselben	24
— indirecte, Behandlung derselben	72
— — Zeichen derselben	20

B.

Bäder, warme	90
Bähungen	91
Baldrian	45
Bittere Extracte	47
Bitterklee	47
— Essenz	39
Bleimittel	128
Blutigel	103
Breiumschläge	92

C.

	Seite
Cajeputöl	39
Calmus	45
— Essenz	39
Campher	37
Chamille	46
Clystiere	92

D.

Diät bei Asthenie	59
— Hypersthenie	109

E.

Eichenrinde	129
Ekelcur	94
Enzian	47
— Essenz	40
Erschlaffende Mittel	29. 129

F.

Flüchtige Linimente	39. 92
Form, kränkliche, deren Behandlung	126
— — Zeichen	13

G.

Gewürznelke	46
Gurgelwasser	93

H.

Hirschhornsalz	38
Hypersthenie, deren Behandlung	99
— Zeichen	14

I.

Ingwer	46

K.

Kälte	107
Krankenexamen	6

Seite

Kräuterbäder . . . 91
Kräutersäckchen . . . 92

L.

Laugensalze, flüchtige . . 38

M.

Mischung, kränkliche, Behandlung derselben 115
— — Zeichen derselben 10
Mohnsaft . . . 33
Muskatennufs . . . 46

N.

Naphte . . . 37

O.

Öle, ätherische . . 39
— fette . . . 130
Opium . . . 33

P.

Pfeffermünze . . . 45
— Öl . . . 39
— Wasser, geistiges . 39
Pflanzennahrung . 110
Polei . . . 46
Pomeranze . . . 45
— Essenz . . 39
Präcipitat . . . 119
Purganzen . . . 104

Q.

Quafsie . . . 47
Quecksilber, s. Sublimat.

R.

Reizmittel, Cautelen bei Anwendung derselben 83
— anhaltende, Anzeige derselben 56. 87

		Seite
Reizmittel, anhaltende,	Auswahl derselben	28. 45
— — ,	Cautelen bei Anwendung derselben	47
— bittere,	Anzeige derselben	57. 89
— —	Auswahl derselben	28. 47
— flüchtige,	Anzeige derselben	54. 84
— —	Auswahl derselben	27. 33
— —	Cautelen bei Anwendung derselben	41
— —	Wirkung derselben	26
— gewürzhafte,	Auswahl derselben	28. 45
— —	Cautelen bei Anwendung derselben	48
Riechmittel		94

S.

Salbei		46
Salmiakgeist		38
Schwächende Mittel,	Auswahl derselben	28
— —	Cautelen bei Anwendung derselben	111
Serpentaria		45
Sublimat		116

V.

Versüfste Geister		38
Virginische Schlangenwurzel		45

W.

Wärme		40
Wein		40
Wermuth		47
—	Essenz	40

Z.

Zimmt		46
—	Tinctur	39
—	Wasser, geistiges	39
Zusammenziehende Mittel		29. 128

Register
zur
speciellen Heilkunst.

NB. Die römischen Zahlen: I, II, III, zeigen jedesmal den Theil an; die gewöhnlichen Zahlen hingegen die Seite.

A.

Abfallen der Nägel . . III, 176
Abortus . . III, 201
Abscefs . . I, 185
Achillessehne zerrissen . . III, 177
Aderbruch . . II, 222
Ätzende Gifte . . II, 290
Alp, Alpdrücken . . III, 82
Anasarca . . II, 205
Anchylosis . . III, 15
Aneurisma . . II, 220
Angewachsene Zunge . . III, 265
Angina parotidea . . I, 198
Angst . . III, 81
Ansprung . . III, 242
Apoplexia . . II, 130
Appetit, mangelnder . . III, 99
— verdorbener . . III, 100
Arsenikvergiftung . . II, 292
Ascites . . II, 209
Asphyxia . . II, 121. 268

Aufspringen der Haut . III, 7
— — Lippen . III, 66
— — Warzen der Brüste III, 221
Aufstofsen . . III, 98
Auftreibung des Magens von Blähungen III, 98
Augenblinzen . . III, 45
Augenentzündung . . I, 192
— — bei neugebornen Kindern III, 232
Augenfell . . III, 50
Augenkrankheiten . . III, 37
Augenkrebs . . III, 45
Augentriefen . . III, 47
— alter Weiber . III, 279
Augenwassersucht . . III, 46
Ausgeschlagener Kopf . III, 240
Ausschläge . . I, 254. III, 5
Aussatz . . I, 286
Auswüchse der *Conjunctiva* . III, 52
— — Harnröhre . III, 144
— — Hornhaut . III, 52
Auszehrendes Fieber . I, 165
Auszehrung . . II, 49
— — der Greise . III, 278
— — der Kinder . III, 253

B.

Balggeschwulst . . II, 190
Bandwurm . III, 110. 112. 114
Bauchbruch . . II 231
Bauerwetzel . . I, 198
Bauchfellsentzündung . . I, 226
Bauchfellswassersucht . . II, 212
Bauchfluss . . II, 180
Bauchflüsse . . III, 107
Bauchgrimmen . . III, 114
— — bei Kindern . III, 257
Bauchwassersucht . . II, 209
Beinbruch . . II, 252. III, 179
— des Brustbeins . III, 86
— der Rippen . III, 86
— des Schlüsselbeins . III, 179

Beinbruch des Schulterblatts . III, 179
Beinfrafs . . II, 26
— der Wirbelbeine . III, 91
— der Zähne . . III, 69
Beschwerliches Kauen . III, 63
— — Schlingen . III, 76
— — Urinlassen . III, 138. 280
— — Zahnen . III, 246
Betäubende Gifte . . II, 298
Betäubung von schädlichen Dünsten II, 278
Bienenstich . . II, 308
Blähungen . . III, 98. 105
Blätterchen . . I, 292
Blasenausschlag . . I, 274
Blattern . . I, 256
Bleichsucht . . II, 50
Bleicolik . . II, 297
Bleivergiftung . . II, 296
Blepharoptosis . . III, 43
Blitz, Betäubung verursachend . II, 282
Blütchen . . I, 292
Blutader-Geschwulst . . II, 222
— Knoten . . II, 222
— Verletzung . . III, 16
Blutauge . . III, 45
Blutbrechen . . II, 160
Blutbruch . . III, 164
Blutergiefsung in die Brusthöhle III, 80
— — unter der Hirnschale III, 29. 30
Blutfluſs . . II, 152
— aus der Gebärmutter . III, 172
— aus dem männlichen Gliede II, 163
Blutgeschwulst . . II, 220
— — des Hodensacks . III, 164
Blutharnen . . II, 162
Bluthusten . . II, 158
Blutigel, verschluckte . . II, 300
Blutnabelbruch . . III, 92
Blutschwären . . I, 247
Blutspeien . . II, 159
Blutspucken . . II, 157

Blutunterlaufung des Auges . III, 45
Böser Kopf . . . . III, 240
Böses Wesen . . . . I, 102
Bräune . . . . I, 200
Brand . . . . I, 186
— der Gedärme . . I, 220
— am Zahnfleische . . III, 71
— der Zehen . . III, 178. 278
Brandbeule . . . . I, 248
Brechen . . III, 101
— bei Kindern . III, 258
Breigeschwulst . . II, 191
Brennen beim Urinlassen . II, 77. III, 136
Bruch . . . II, 227
Brustfellsentzündung . I, 211
Brustkrankheiten . . . III, 80
Brustwarzen, aufgesprungene . III, 221
— — allzu kurze . III, 222
Brustwassersucht . . II, 213
Bubo . . . I, 245. II, 80. III, 94
Buckel . . III, 91. 267

C.

Cachexie . . II, 34
Callus der Geschwüre . . II, 6. 12
— an Händen oder Füfsen . III, 174
Carfunculus . . I, 148
Caries . . . II, 26
Carunkeln der *Conjunctiva* . III, 52
— der Harnröhre . III, 144
— der Hornhaut . III, 52
Catalepsis . . . II, 134
Catarrh . . . I, 250
Catochus . . II, 134
Chanker . . II, 58. 68. III, 155
Chiragra . . II, 89
Cholera . . II, 174
Colik . . III, 114
— bei Kindern . III, 257
Convulsionen . . II, 95
— — bei Kindern . III, 256

Contusio . . . . II, 251
Crowp . . . . . III, 264
Crystallblasen . . . . III, 148

D.

Dammfistel . . . . III, 146
Dampf . . . . . III, 84
Darmentzündung . . . I, 219
Darmgicht . . . . III, 116
Darmschmerz . . . . III, 114
Darrsucht . . . . III, 253
Delirium . . . . II, 146
Diarrhoea . . . . II, 172
— bei Kindern . . . III, 258
Dohlfüfse . . . . III, 177
Doppelte Glieder . . . III, 249
Doppeltsehen . . . . III, 53
Drüsenentzündung . . . I, 244
Dünste, schädliche . . . II, 278
Durchfall . . . . II, 172
— bei Kindern . . . III, 258
Durchliegen . . . . I, 161. 187
Dysuria . . . . III, 138

E.

Ectropium . . . III, 42
Einklemmung der Eichel . III, 156
Eiterauge . . . . I, 194
Eiterbruch . . . . III, 162
Eiterbrust . . . . I, 212
Eiterung . . . . I, 181
— der Augen . . . I, 194
— der Brüste . . . III, 221
— der Gebärmutter . . III, 167
— des Gehirns . . III, 29. 30
— des Hodensacks . . III, 162
— der Leber . . . III, 127
— der Lunge . . . I, 212
— der Mandeln . . I, 205
— der Milz . . . III, 131

Eiterung der Nieren . I, 232. III, 133
— des Zahnfleisches . . I, 202
Ekel . . . III, 102
Elephantiasis . . . I, 287
Empyema . . . I, 212
Encanthis . . III, 47
Engbrüstigkeit . . III, 84
Englische Krankheit . . III, 249
— Schweifs . . III, 10
Entropium . . III, 42
Entzückung . . II, 147
Entzündung . . I, 175
— der Augen . . I, 192
— des Bauchfells . I, 126
— der Brüste . . III, 220
— der Drüsen . I, 244
— der Finger . . . I, 239
— der Gebärmutter . . I, 234
— der Gedärme . I, 219
— des Gehirns . . I, 189
— des Gekröses . I, 229
— der Harnblase . I, 233
— der Harnröhre . I, 236
— der Haut . . I, 240
— des Herzbeutels . I, 216
— des Herzens . . I, 215
— der Hoden . . I, 238
— des Hodensacks . III, 162
— der Knochen . I, 243
— der Leber . I, 222. III, 127
— der Leistendrüsen . I, 245
— des Lendenmuskels I, 229. III, 194
— der Luftröhre . I, 206
— der Lunge . . I, 210
— der Magendrüse . I, 226
— des Magens . I, 218. III, 96
— der Mandeln . I, 205
— der Milz . . I, 225
— der Mutterscheide . . I, 235
— des Netzes . . I, 228
— der Nieren . I, 231. III, 132

Entzündung der Ohren . . I, 197
— der Ohrendrüsen . . I, 245
— des Rückenmarks . . I, 191
— der Schamlippen . . III, 165
— der Speiseröhre . . I, 209
— der Urinblase . . I, 233
— der Vorhaut . . III, 155
— der Vorsteherdrüse . . I, 237
— des Zahnfleisches . . I, 201
— des Zapfens . . I, 203
— der Zunge . . I, 202
— des Zwergfells . . I, 216
Entzündungsfieber . . I, 173
Epilepsia . . II, 102
Erbrechen . . III, 101
— bei Kindern . III, 258
Erbsenblattern . . I, 293
Erdrückung der Kinder . II, 273
Erfrieren . I, 69. 246. II, 274
Erhängen . . II, 276
Erschlaffung des Hodensacks . III, 162
Erstickung . . II, 276
— von schädlichen Dünsten II, 278
— von verschluckten Sachen II, 283
Ertrinken . . II, 276
Erwürgen . . II, 276
Erysipelas . . I, 176. 240
Erythema . . III, 9
Eustachische Röhre, verstopfte III, 37
Exostosis . . III, 17
Extravasation unter dem Hirnschädel III, 29. 30

F.

Fallsucht . . II, 102
Falsche Wehen . . III, 204
Faulfieber . . I, 156
Feigwarzen . . III, 119
Felle der Hornhaut . . III, 49
Fersensehne, zerrissene . III, 177
Fettbruch . . III, 159
Fettgeschwulst . . II, 191

Fieber . . . I, 147
— aussetzendes . . . I, 168
— auszehrendes . . . I, 165
— bösartiges . . . I, 156
— gelbes . . . I, 163
— hectisches . . . I, 165
— kaltes . . . I, 168
— schleichendes . . . I, 165
Finnen . . . I, 292
Fingerwurm . . . I, 239
Fistel . . . II, 16
— der Gallenblase . . . III, 129
— der Harnröhre . . . III, 145
— der Hornhaut . . . III, 49
— der Kinnlade . . . III, 70
— des Mastdarms . . . III, 121
— des Mittelfleisches . . . III, 146
— der Speicheldrüsen . . . III, 72
Flechsenspringen . . . III, 174
Flechten . . . I, 283
Flecken der Hornhaut . . . III, 49
Fleischbruch . . . III, 159
Fleischgewächs . . . II, 191
Fluxus coeliacus . . . II, 180
— *hepaticus* . . . II, 171
Fractura . . . II, 252
Franzosen . . . II, 57
— bei Kindern . . . III, 255
Frattseyn . . . III, 8. 245
Friesel . . . I, 268
Fröschleingeschwulst . . . III, 266
Frostbeule . . . I, 246
Furunkel . . . I, 247
Fulsgeschwulst . . . II, 207
Fulsweh . . . II, 92

G.

Galanteriebeulen . . . III, 148
Gallenblasen - Fistel . . . III, 129
— Stein . . . III, 130
Gallenruhr . . . II, 174
Gangraena . . . I, 187

Gangraena senilis . III. 178. 278
Gebärmutterentzündung . I, 234
Gebärmutterkrebs . . III, 169
Gebärmuttervorfall . III, 168. 171
Gefräfsigkeit . . III, 99
Gehirnbruch . . III, 32. 230
Gehirnentzündung . . I, 189
Gehirnerschütterung . III, 29. 30
Gehirnschwamm . . III, 32
Gehirnwassersucht . III, 30. 272
Gelbes Fieber . . I, 163
Gelbsucht . . . II, 35
Gekrösentzündung . . I, 229
Gelenkgeschwulst . III, 12
Gelenkschmerz . . II, 88
Gelenkwassersucht . . III, 14
Gerstenkorn . . I, 192. III, 44
Geruchlosigkeit . . III, 62
Gesäfsfistel . . III, 121
Geschwür . . II, 3.
— der Harnröhre II, 77. III, 143
— der Hornhaut . III, 48
— der Knochen . . II, 26
— der Nase . . III, 62
— der Zunge . III, 266
Geschwulst . . II, 189
— der Drüsen . . II, 202
— der Gelenke . . III, 12
— der Hoden . III, 158
— des Hodensacks . III, 162
— der Hornhaut . III, 49
— der Knochen . . III, 17
— der Leber . III, 128
— der Lippen bei Kindern III, 267
— der Milz . . III, 131
— der innern Theile des Mundes vom Insectenstich III, 65
— des Samenstrangs . III, 159
— der Thränencarunkel III, 47
— wäfsrige . . II, 203
— weifse . . III, 12

Gesichtsschmerz . . II, 89
Gicht . . . . II, 88
Gifte . . . . II, 287
Gliederreifsen . . . II, 88
Gliedschwamm . . . III, 12
Goldene Ader . . . II, 165
Gonagra . . . . II, 89
Gonorrhoea . . . II, 71. III, 149
Grauer Staar . . . III, 55
Grind . . . . I, 289
Grindkopf . . . III, 240
Grüner Staar . . . III, 58
Grünspanvergiftung . . II, 293
Gürtel . . . . I, 275
Gutta rosacea . . . III, 33

H.

Haarausfallen . . . III, 28
Haarwurm . . . II, 309
Haemorrhagia . . . II, 152
Hämorrhoidalfluſs . . II, 165. III, 120
Hämorrhoidalknoten . . II, 165
Häutige Bräune . . I, 207. III, 264
Hagelkorn . . . I, 193. III, 44
Halbsichtigkeit . . . III, 54
Hals, krummer oder steifer . III, 77
Halsentzündung . . . I, 200
Handweh . . . II, 89
Harnblasenentzündung . . I, 233
Harnblasenstein . . . III, 136
Harnblasenvorfall . . III, 136
Harnabfluſs, unwillkührlicher . III, 141
Harnbrennen . . II, 77. III, 136
Harnfistel . . . III, 145
Harnröhrenentzündung . I, 236
Harnröhrengeschwür . II, 77. III, 143
Harnruhr . . . II, 184
Harnstrenge . . . III, 138
Harnverhaltung . . III, 138
Harnwinde . . . III, 138
Hasenauge . . . III, 44
Hasenlippe . . . III, 66

Hasenscharte . . III, 66
Hautausschläge . . I, 254. III, 5
Hautkrankheiten . . . III, 3
Hautröthe . . . III, 9
Hautschrunden . . . III, 7
Hautspalten . . III, 7
Hautwassersucht . II, 205
Hectisches Fieber . . I, 165
Heiserkeit . . . III, 82
Herzbeutelsentzündung . I, 216
Hernia . . . II, 227
Herzentzündung . . I, 215
Herzklopfen . . III, 88
— hysterisches . . III, 189
Herzpolyp . . III, 88
Herzzittern . . III, 88
Himbeerwarze . . III, 5
Hirnbruch . . . III, 32
Hirnentzündung . . I, 189
Hirnhautsschwamm . III, 31
Hirnschaleneindrücke . III, 29. 30
Hirnschwamm . . III, 32
Hirnwassersucht . . III, 30. 272
Hirnwuth . . I, 189
Hirsenkorn . . III, 44
Hitzblätterchen . . I, 292
Hodenentzündung . . I, 238
Hodengeschwulst . . III, 158
Hodensack, erschlaffter . III, 162
Hodensackbruch . II, 231. 239
Hodensackentzündung . III, 162
Hodensackgeschwulst . . III, 162
Hodensackkrebs . . III, 163
Hodensackwassersucht . . III, 163
Hodenwassersucht . III, 159. 160. 161
Höcker . . III, 91. 267
Hohlgeschwür . . II, 14
Honigflecken . . III, 6
Honiggeschwulst . . II, 191
Hornhautfistel . . III, 49
Hornhautgeschwür . . III, 48

Hüftweh . . . II, 89
Hühnerauge . . . II, 201
Hundsblattern . . . I, 293
Hundshunger . . . III, 99
Hundskrampf . . . II, 109
Hundswuth . . . II, 301
Husten . . . III, 83
Hypochondrie . . . II, 139
Hysterie . . II, 140. III, 187

I.

Ileus . . . III, 116
Incontinentia Urinae . . . III, 141
Ineinanderschiebung der Gedärme III, 106
Inflammatio . . . I, 175
Insecten im Ohre . . . III, 37
— in den Stirnhölen . . III, 34
Insectenstich . . II, 308. III, 65
Intermittirende Fieber . . I, 568
Irrereden . . . II, 146
Ischuria . . . III, 138
— *renalis* . . . III, 139

J.

Jammer der Kinder . . III, 256
Jucken des Afters . . . III, 121
— des Augenlieds . . . III, 43
— der Haut . . . III. 7

K.

Kachexie . . . II, 34
Kallus der Geschwüre . . II, 6. 12
— an Händen und Füfsen III, 174
Karunkeln der *Conjunctiva* . III, 52
— der Harnröhre . . III, 144
— der Hornhaut . . III, 52
Katarrh . . . I, 250
Kauen, beschwerliches . III, 63
Keichhusten . . III, 261
Kindbetterinnfieber . . III, 214

Kindbetterinnfluſs . . III, 211
— — übermäſsig flieſsender III, 213
— — unterdrückter III, 212
Kinderkrankheiten . III, 225. 229. 236
Kindsader . . II, 222
Kinnbackenzwang oder Kinnbackenkrampf II, 111
— — bei neugebornen Kindern III, 231
Kinnflechte . . I, 284
Kleiengrind . . I, 291
Klumpfüſse . . III, 177
Kniegelenksknorpel . . III, 14
Knieweh . . II, 89
Knochenauswuchs . III, 18
Knochenentzündung . . I, 243
Knochenfraſs . . I, 26
Knochengeschwür . II, 26
Knochengeschwulst . III, 17
Knochenkrankheiten . . III, 17
Knochenschmerz . . III, 21
Knochenspeckgeschwulst . III, 18
Knochenwassersucht . . III, 18
Knoten an den Lippen . III, 66
Kohlendampf . . II, 279
Kolik . . . . III, 114
— bei Kindern . . III, 257
Konvulsionen . . II, 95
— — bei Kindern . III, 257
Kopf, zusammengedrückter, bei neugebornen Kindern III, 230
Kopfschmerz . . III, 21
Kopfwassersucht . III, 30. 268. 270
Kopfweh . . III, 21
Kopfwindsucht . . III, 25
Kopfwunden . . III, 24
Kothbrechen . . III, 116
Kothfistel . . . III, 104
Krätze . . I, 278
Krampf . . II, 95
— hysterischer . III, 189
— der Harnblase . . III, 135
— der männlichen Ruthe III, 147

Krampf der Speiseröhre . . III, 76
— der Urinblase . . . III, 135
Krampfader . . . . II, 222
Krampfaderbruch . . . III, 159
Krampfschlagadergeschwulst . . II, 226
Krankheiten der äufsern Gliedmafsen . III, 174
— alter Personen . . III 277
— der Augen . . . III, 37
— des Augapfels . . . III, 45
— der Augenlieder . . . III, 41
— des Augensterns . . . III, 52
— der Blutgefäfse . . III, 16
— der Brüste . . III, 87. 218
— der Brust . . . III, 80
— des Brustbeins . . . III, 86
— des Darmkanals . . III, 103
— der Drüsen . . . III, 11
— der Eierstöcke . . III, 173
— der Finger . . . III, 175
— der Frauenzimmer . . III, 185. 186
— der Füfse . . . III, 176
— der Gallenblase . . III, 129
— des Gaumens . . . III, 74
— der Gebärenden . . III, 203
— der Gebärmutter . . . III, 167
— der Gedärme . . . III, 103
— des Gehirns . . . III, 31
— der Gehörorgane . . III, 34
— der Gelenke . . . III, 12
— der Geschlechtstheile III, 146
— — männlichen III, 146
— — weiblichen III, 164
— des Gesichts . . III, 33. 53
— der Greise . . . III, 277
— der Haare . . . II, 27
— der Hände . . III, 174
— des Halses . . . III, 77
— der Harnblase . . III, 135
— der Harnröhre . . . III, 143
— der Haut . . . III, 3
— des Herzbeutels . . III, 88

Krankheiten des Herzens . . . III, 88
— der Hirnhäute . . III, 28
— der Hirnschale . . III, 28
— der Hoden . . . III, 158
— des Hodensacks . III, 161
— der Hornhaut . . III, 48
— der Kindbetterinnen III, 206
— der Kinder III, 225. 229. 236
— der Kinnlade . . III, 63
— des Kitzlers . . III, 165
— der Knochen . . III, 17
— der Kopfbedeckungen . III, 24
— des Kopfes . . III, 21
— der Leber . . . III, 127
— der Lippen . . III, 65
— der Luftröhre . III, 79
— der Lunge . . . III, 87
— der männlichen Geschlechtstheile III, 146
— — — Ruthe . III, 146
— des Magens . . III, 95
— der Mandeln . . III, 75
— des Mastdarms . III, 118
— der Milz . . . III, 131
— des Mittelfleisches . III, 145
— des Mundes . . III, 64
— der Mutterscheide . III, 166
— der Nägel . . . III, 175
— der Nase . . . III, 61
— der Nasenknochen . . III, 62
— der Nerven . . . III, 17
— der Nieren . . III, 132
— der Ohrdrüse . . III, 61
— der Ohren . . . III, 34
— des *Penis* . . . III, 146
— des Rachens . . III, 75
— der Respirationsorgane . III, 81
— der Rippen . . . III, 86
— des Rückgrats . III, 89
— der säugenden Weibespersonen III, 216
— der Schamlippen . . III, 165
— der Schwangern . III, 198

Krankheiten der Speicheldrüsen . III, 72
— der Speiseröhre . . III, 179
— der stillenden Weibespersonen III, 216
— der Thränenwege . III, 60
— des Unterleibes . . III, 92
— der Urinblase . III, 135
— der Vorsteherdrüse . III, 157
— der Weiber . III, 185. 186
— des weiblichen Geschlechts III, 185
— der — Geschlechtstheile III, 164
— der Wöchnerinnen . III, 206
— der Zähne . . III, 67
— des Zahnfleisches . III, 70
— des Zapfens . . III, 75
— der Zehen . . III, 178
— der Zeugungstheile . III, 146
— — — männlichen III, 146
— — — weiblichen III, 164
— der Zunge . . III, 73
— des Zwergfells . III, 89
Krebs . . . II, 18
— der Augen . . III, 45
— der Gebärmutter . . III, 169
— des Hodensacks . . III, 163
— des Mundes . . III, 65
— des männlichen Gliedes . III, 147
— der Schorsteinfeger . . . III, 163
— der Zunge . . III, 74
Krebsschwamm . . . III, 18
Kreuzschmerz . . . II, 89
Kriebelkrankheit . . II, 107
Kropf . . . III, 78
Krummer Hals . . III, 77
Krümmung der Füfse . . III, 177
— des Rückgrats . III, 91
Krystallblasen . . . III, 148
Künstlicher After . . III, 104
Kupferhandel . . . III, 33
Kurzsichtigkeit . . III, 54

L.

Läbmung . . . II, 125

Lähmung der Augenlieder . III, 45
— der Harnblase . . III, 135
— des Mastdarms . III, 120
— der Speiseröhre . . III, 76
— der Urinblase . III, 135
— der Zunge . . III, 74
Läusesucht . . II, 311
Leberabscefs . . III, 127
Leberentzündung . I, 222. III, 127
Leberflecken . . . I, 294
Leberfluſs . . II, 171. III, 108
Lebergeschwulst . . III, 128
Leberkrankheiten . . III, 127
Leberverhärtung . . I, 223
Leibesschaden . . . II, 227
Leibesschmerz, Leibesschneiden . III, 114
— — bei Kindern . III, 257
Leichdorn . . . II, 201
Leistenbeule . I, 245. II, 80. III, 94
Leistenbruch . II, 230. 239. III, 94
Lendenmuskelsentzündung . I, 229. III, 94
Lendenweh . . . II, 89
Leucophlegmatia . . . II, 205
Lichtscheu . . . III, 53
Lichtsehen . . III, 54
Liebesblümchen . . I, 292
Lienterie . . II, 179
Lippen, aufgesprungene . III, 66
Lippengeschwulst . . III, 267
Lüsternheit . . . III, 100
Luft, verdorbene . . II, 281
Luftgeschwulst . . II, 216
Luftröhrenentzündung . . I, 206
Lungenentzündung . . I, 210
Lungenkrankheiten . III, 87
Lungensucht . . II, 52
Lustseuche . . . II, 57
— bei Kindern . III, 255
Luxatio . . . III, 257

M.

Männliches Unvermögen . III, 153
Magen, aufgetriebener . . III, 98
Magendrücken von Unverdaulichkeit . III, 98
Magendrüsenentzündung . I, 226
Magenentzündung . . . I, 218. III, 96
Magenkrampf . . III, 100
Magenkrankheiten . . III, 95
Magenruhr . . . II, 179
Magenschmerz . . III, 100
Magenschwäche . . III, 96
Magenverhärtung . I, 218. III, 96
Malacia . . III, 100
Malum mortuum . . I, 291
Mandeln, verhärtete . III, 75
Mandelnentzündung . . I, 205
Mangel an Appetit . . III, 99
— — Milch . . III, 219
Manie . . . II, 146
Masern . . I, 261
Marasmus senilis . . III, 278
Mastdarmfistel . . III, 121
Mastdarmschmerz . . III, 120
Mastdarmvorfall . . III, 120
Maulwurfsgeschwulst . II, 191
Melancholie . . . II, 143
Melonauge . . III, 49
Mentagra . . . I, 284
Milch zu vertreiben . III, 209
Milchanhäufung . . III, 219
Milchausfluſs . . III, 218
Milchborke . . III, 242
Milchfieber . . III, 207
Milchknoten . . III, 220
Milchkruste . . III, 242
Milchmangel . . III, 219
Millarsche Engbrüstigkeit . III, 262
Milzentzündung . . I, 225
Miserere mei . . III, 116
Miſsgebären . . III, 201
Mitesser . . III, 244

Mittelfleischbruch . . . II, 231
Mittelfleischfistel . . . III, 146
Mola . . . III, 167
Monatliche, ausgebliebenes . III, 192
— kränkliches . III, 189
— übermäfsig fliefsendes III, 194
— unterdrücktes . III, 193
— verhaltenes . . III, 192
Mückensauge . . . III, 49
Mundfäule . . II, 40. III, 65
Mundklemme . . . II, 112
Mundkrebs . . . III, 65
Mundsperre . . II, 112
Mutterblutfluſs, Mutterblutsturz . III, 172
Mutterflecken . . III, 9
Muttermal . . . III, 9
Mutterpolyp . . III, 170
Mutterscheidenbruch . . II, 281
Mutterscheidenentzündung . I, 235
Mutterscheidenvorfall . . III, 166
Muttervorfall . . III, 168. 171
Mutterwuth . . III, 197
Mydriasis . . . III, 52
Myopia . . . III, 54.
Myosis . . . III, 53

N.

Nabelbruch . . II, 231
— bei Kindern . . III, 259
Nabelfleischgewächs . . III, 93
Nachtblattern . . I 293
Nachtblindheit . . III, 54
Nachtwandeln . . II, 137
Nächtlicher Urinabgang bei Kindern III, 259
Nasenbluten . . II, 155
Nasengeschwür . . III, 62
Nasenpolyp . . II, 195
Necrose . . . II, 29
Nervenfieber . . I, 156
Nervenverletzung . . III, 17
Nesselausschlag . . I, 272

Netzbruch . . . . . II, 228
Netzentzündnng . . . . I, 228
Nierenabscefs . . . . III, 133
Nierenentzündung . . I, 231. III, 132
Nierenschmerz . . . . III, 133
Nierenstein . . . . III, 133
Nierenweh . . . . III, 133
Niesen . . . . . III, 82
Nietnagel . . . . . III, 176

O.

Ochsenauge . . . . III, 46
Ochsenhunger . . . . III, 99
Oedema . . . . II, 207
Öffnung, fehlende, in der Harnröhre III, 145
— ungewöhnliche, in der Harnröhre III, 145
Örtliche Absterbung . . . I, 186
— — der Gedärme . . I, 220
— — des Zahnfleisches III, 71
— — der Zehen . III, 178. 278
Ohnmacht . . . . II, 120
Ohrenbrausen . . . . III, 35
Ohrendrüsenentzündung . . . I, 245
Ohrenentzündung . . . I, 197
Ohrenklingen . . . . III, 35
Ohrenkrankheiten . . . III, 34
Ohrenschmalz, verhärteter . III, 36
Ophthalmia . . . . I, 192

P.

Paedarthrocace . . . III, 252
Panaritium . . . . I, 239
Paraphimosis . . . III, 156
Pelagra . . . . III, 6
Pemphygus . . . . I, 274
Peripneumonia . . . I, 211
Pest . . . . . I, 161
Pferdefüfse . . . . III, 177
Phimosis . . . . III, 154
Pians . . . . III, 5

Pica . . . III, 108
Pleuritis . . . I, 211
Pneumonia . . . I, 210
Pocken . . . I, 256
Podagra . . . II, 92
Pollution . . . III, 148
Polyp . . . II, 194
— der Gebärmutter . . III, 170
— der Nase . . II, 195
Porzellänausschlag . . II, 274
Presbyopia . . . III, 55
Priapismus . . . III, 152
Pulsadergeschwulst . . II, 220
Pulsaderverletzung . . III, 16
Pyrexie . . . I, 173

Q.

Quetschung . . . II, 251

R.

Raphania . . . II, 107
Raserei . . . II, 146
Rheumatismus . . . II, 88
Rötheln . . . I, 264
Rose . . . I, 176. 240
Rothlauf . . . I, 240
Rückendarre . . . II, 50
Rückengewächs . . III, 92
Rückenmarksentzündung . I, 191
Rückenspalte . . III, 273
Rückgrat, gekrümmtes . III, 91
Rückgratswassersucht . . III, 273
Ruhr . . II, 176. III, 107

S.

Sackgeschwulst . . . II, 190
Salzfluſs . . . II, 7. 14
Samenbruch . . III, 159
Samenergufs ohne Beischlaf . III, 148
Samenstrangsgeschwulst . . III, 159
Sandklofs . . III, 159
Sardonisches Lachen . . II, 109

Satyriasis . . III, 152
Schälblasen . . I, 293
— bei neugebornen Kindern III, 233
Schamlippenentzündung . . III, 165
Schanker . . II, 58. 68. III, 155
Scharbock . . II, 39
— des Zahnfleisches . II, 43. III 71
Scharlachausschlag . . I, 265
Scheintod . . II, 121. 268
— neugeborner Kinder . II, 272
Schenkelbruch . . II, 231
Schenkelschmerz . . II, 89
Schildkrötengeschwulst . II, 192
Schlaflosigkeit . . II, 136
Schlafsucht . . . II, 123
Schlafwandeln . . II, 137
Schlagfluſs . . . II, 130
Schlangenbiſs . . II, 307
Schleichendes Fieber . I, 165
Schleimpfropf . . II, 194
Schlingen, beschwerliches . III, 76
Schluchzen . . III, 83
— bei neugebornen Kindern III, 233
Schlucken, gehindertes . III, 76
Schmerz . . II, 84
Schnupfen . . I, 252
Schornsteinfegerkrebs . III, 163
Schrunden . . III, 7
Schwaches Gesicht . . III, 53
— Magen . . III, 96
— Verdauung . III, 98
Schwäche neugeborner Kinder . III, 229
Schwämmchen . . III, 237
Schwamm des Gehirns . III, 32
— der harten Hirnhaut . III, 31
Schwarze Krankheit . . III, 106
— Staar . . III, 58
Schweiſs, blutiger . . III, 10
— heftiger . II, 186. III, 10
Schwere Geburt . . III, 204
Schwerharnen . . III, 138

Schwerhörigkeit . . III, 35
Schwielen an Händen oder Füfsen . III, 174
Schwinde . . I, 283
Schwindel . . II, 117
Schwindflecken . . I, 286
Schwindsucht . . II, 52
Schwitzfieber . . III, 10
Scirrhus . . II, 19
Scorbut . . . II, 39
— des Zahnfleisches . II, 43. III, 71
Scorpionstich . . II, 308
Scropheln . . II, 44
Seitenstechen . . I, 211
Sinus . . . II, 14
Sirones . . III, 6
Sodbrennen . . III, 97
Sommerflecken . . I, 293
Sonnenbrand . . III, 6
Sopor . . II, 123
Spanischer Kragen . . III, 156
Speckgeschwulst . . II, 191
Speckhodengeschwulst . . III, 159
Speichelfistel . . III, 72
Speichelfluss . . II, 182. III, 72
Speiseröhrenentzündung . I, 209
Spinnen, verschluckte . II, 300
Staar, grauer . . III, 55
— grüner . . III, 58
— schwarzer . . III, 58
Starrkrampf . . II, 111
Starrsucht . . II, 134
Steifer Hals . . III, 77
Steifigkeit der Gelenke . III, 15
Steinbruch . . III, 159
Steine der Gallenblase . III, 130
— der Harnblase . . III, 136
— der Harngänge . . III, 134
— der Harnröhre . III, 144
— der Nieren . . III, 133
— der Urinblase . . III, 136
Steifsfistel . . III, 121

Stickfluſs . . . III, 83
— bei Kindern . . III, 259
Stickhusten . . III, 261
Stranguria . . III, 138
Stuhlgang, verstopfter . . III, 125
Stuhlzwang . . III, 124
Stumpfwerden der Zähne . . III, 69
Suppuratio . . I, 181
Synocha . . I, 173

T.

Tagblindheit . . III, 54
Taubheit . . III, 35
Tetanus . . II, 111
Thränenauge . . III, 47
Thränenfistel . . III, 60
Thränenfluſs . . III, 47
Tod, dessen Zeichen . . II, 268
Todtenbruch . . I, 291
Todtenkrampf . . II, 111
Tölpel . . I, 198
Traubenauge . . III, 49
Trichiasis . . III, 41
Triefaugen . . III, 47
— alter Weiber . . III, 279
Tripper . . II, 71. III, 149
Trockenheit der Gehörorgane . III, 36
Trommelsucht . . II, 217
Tumor cysticus . . II, 190
Tympanitis . . II, 217
Typhus . . I, 156

U.

Überbein . . II, 200
Umkehrung der Gebärmutter . III, 168. 206
Unfruchtbarkeit . . III, 197
Unverdaulichkeit . . III, 98
Unwillkührlicher Urinabfluſs . III, 141
— — nächtlicher bei Kindern III, 259
— — unwillkührlicher . III, 141
Urinblasenentzündung . . I, 233

Urinblasenstein . . . III, 136
Urinblasenvorfall . . . III, 136
Urinfistel . . . III, 145
Urinlassen, beschwerliches . III, 138. 280
Urinverhaltung . . III, 138

V.

Vapeurs . . III, 98
Veitstanz . . II, 105
Venerische Geschwüre . II, 4. 13. 58. 68
— Hautausschläge . II, 59. 83
— Krankheit . . II, 57
— — bei Kindern III, 255
Venusbogen . . II, 73. 77. III, 147
Verbrennung . . I, 249
Verdauung, geschwächte . III, 98
Verdorbener Appetit . . III, 100
Verdrehung . . II, 258
Verdunklung der Hornhaut . III, 51
Verengerung des Augensterns . . III, 52
— der Harnröhre . III, 144
— des Mastdarms . . III, 119
— der Nasenlöcher . III, 62
— der Speiseröhre . III, 76
— der Vorhaut . III, 154
Vergessenheit . . II, 148
Vergiftung . . II, 287
Verhärtung . . . I, 189
— der Gedärme . I, 221
— der Harnblase . III, 135
— der Leber . . I, 223
— des Magens . I, 218. III, 96
— der Mandeln . III, 75
— des Mastdarms . III, 118
— der Nieren . . I, 232
— der Urinblase . III, 135
— der Vorsteherdrüse . III, 158
— des Zellgewebes . III, 236
Verhungern . . I, 69
Verrenkung . . II, 257. III, 179
— der Halswirbelbeine . III, 90

Verrenkung des Oberarms . III, 180
— des Schenkels . III, 181
— des Schwanzbeins . III, 90
— des Unterarms oder Vorderarms III, 180
— der Unterkinnlade . III, 63
— der Wirbelbeine des Rückgrats III, 90
— der Zähne . III, 69
— des Zungenbeins . III, 74
Verschluckte, in der Luftröhre oder dem Schlunde stecken gebliebene Sachen II, 283
Verstauchung . II, 259
Verstopfung des Stuhlganges . III, 125
Verunstaltung . II, 263
Verwachsung . II, 261. III, 231
— der Augenlieder . III, 41
— der Finger . III, 175
— der Harnröhrenöffnung . III, 145
— des Jungferhäutchens III, 166
— der Mutterscheide . III, 166
— der Regenbogenhaut . III, 48
— der Zehen . III, 175
Vielfräfsigkeit . III, 99
Vipernbifs . II, 307
Volvulus . III, 106
Vomica . I, 212
Vorfall . II, 242
— der Augapfel . III, 46
— der Gebärmutter . III, 168. 171
— der Harnblase . III, 136
— der Hornhaut . III, 49
— des Mastdarms . III, 120
— der Mutterscheide . III, 166
— der Regenbogenhaut . III, 48
— der Urinblase . III, 136
Vorkopf . III, 230
Vorsteherdrüsenentzündung . I, 237

W.

Wachsgrind . III, 242
Wadenkrampf . II, 110

Wahnsinn . . . II, 146
Wangenschürgen . . . III, 231
Warze . . . II, 198
Wasserbläschen der Augenlieder . III, 45
Wasserbruch . . III, 159
Wasserdarmbruch . . III, 164
Wasserfleischbruch . . III, 159
Wasserkopf . . III, 30. 268
— äufserer . . III, 30. 268
— innerer . III 30. 270
— vermischter . III, 271
Wasserkrampfaderbruch . III, 160
Wasserkrebs der Lippen . . III, 267
Wassersackgeschwulst . II, 191
Wasserscheu . II, 303. III, 76
Wassersucht . . II, 203
— der Augen . III, 46
— des Bauchfells . II, 212
— der Brust . . II, 213
— der Eierstöcke . III, 173
— der Gebärmutter . III, 168
— des Gehirns . III, 30 272
— der Gelenke . . III, 14
— der Haut . . II, 205
— des Herzbeutels . II, 213
— der Hoden . III, 159. 160. 161
— des Hodensacks . III, 163
— der Knochen . . III, 18
— des Kopfes . III, 30. 268
— des Rückgrats . III, 273
— des Unterleibes . II, 209
Wechselfieber . . I, 168
Wehen, falsche . . III, 204
Weiberkrankheiten . . III, 185. 186
Weichselzopf . . III, 25
Weichwerden der Knochen . III, 19
Weinstein an den Zähnen . . III, 68
Weifse Flufs . . II, 78. 194
— Geschwulst . III, 12
Weitsichtigkeit . . III, 55
Wespenstich . . II, 308

Wildes Fleisch . . II, 6
Windcolik . . III, 105
Winddorn . . II, 26
Windgeschwulst . . II, 216
Windsucht . . II, 217
Wochenfieber . . III, 214
Wolf . . III, 8
Wolfsgeschwulst . . II, 191
Wolfshunger . . III, 99
Wollustkrampf . . III, 152
Würmer im Darmkanale . . III, 108
— in der Stirnhöhle . III, 34
Wunde . . II, 244
— der Gallenblase . III, 129
— der Gedärme . . III, 105
— des Gehirns . . III, 29
— der Harnblase . III, 136
— der Hirnhäute . . III, 29
— der Kopfbedeckungen . III, 24
— des Magens . III, 97
— des Unterleibes . III, 93
— der Urinblase . . III, 136
Wundwerden der Haut . III, 8. 245

Y.

Yaws . III, 5

Z.

Zahnen, beschwerliches . III, 246
Zahnfistel . . III, 70
Zahnfleisch, schwammiges und leicht blutendes . . II, 43. III, 71
Zahnfleischentzündung . I, 201
Zahnfleischgewächs . . III, 71
Zahnkrankheiten . . III, 67
Zahnschmerz, Zahnweh . III, 67
Zapfenentzündung . . I, 203
Zehrfieber . . I, 165
Zerreifsung der Fersensehne oder Achillessehne III, 177
Zittermal . . I, 286

Zittern . . . II, 100
Zuckungen . . . II, 95
— bei Kindern . . III, 256
Zunge, angewachsene . . III, 265
Zungenentzündung . . I, 202
Zungenfrosch . . III, 266
Zungengeschwür . . III, 266
Zungenkrebs . . III, 74
Zweikopf . . III, 25
Zwergfellsentzündung . . I, 216

Druckfehler.

Im ersten Theile.

Seite	13	Zeile 11	statt:	*herriae* lies *herniae*
—	107	— 28	—	da sich doch l. da sie doch
—	107	— 30	—	angesehen l. anzusehen
—	186	— 10	—	oper l. oder
—	189	— 2	—	Einschnitte. Der l. Einschnitte, wie auch
—	234	— 25	—	Stuhlgang l. Stuhlzwang
—	240	— 13	—	gewürshafter l. gewürzhafter
—	245	— 28	—	Quetsehung l. Quetschung
—	260	— 26	—	heftige l. flüchtige
—	293	— 5	—	Hundsplattern l. Hundsblattern

Im zweiten Theile.

Seite	75	Zeile 16	statt:	sind jederzeit l. sind nicht jederzeit
—	137	— 23	—	*Sonambulismus* l. *Somnambulismus*
—	155	— 1	—	*Sycoperdon* l. *Lycoperdon*
—	205	— 19	—	*Hydrops, Anasarca* l. *Hydrops Anasarca, Anasarca*
—	220	— 6	—	die Blutader l. der Blutader
—	240	— 2	—	Hodensack l. Hodensackbruch
—	271	— 23	—	Trobfbad l. Tropfbad
—	308	— 1	—	*Gspiritus* l. *spiritus*
—	312	— 9	—	begünzigt l. begünstigt

Im dritten Theile.

Seite	5	Zeile 16	statt:	Weichsezopf l. Weichselzopf
—	16	— 10	—	Verknöcherung l. Verknöcherung der Blutgefäfse
—	16	— 11	—	Wunden l. Verletzungen der Blutgefäfse
—	22	— 11	—	*Calvus* l. *Clavus*
—	67	— 16	—	*Otontalgia* l. *Odontalgia*
—	75	— 10	—	Schliefsen l. Schiefsen
—	93	— 5	—	*Embyomphalus* l. *Empyomphalus*
—	146	— 6	—	Darmfistel l. Dammfistel
—	221	— 23	—	dedecken l. bedecken
—	231	— 26	—	Wangenschörgen l. Wangenschürgen

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Oberreich, Christian Friedrich,

Handbuch der Heilkunst

Bd.: 3

Riga (1806)

Path. 895-3
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10473804-0